

OCUDOR DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE EYE DROPS 2% W/V

Dorzolamide Hydrochloride (2% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid
2. Bagaimana Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid berfungsi
3. Sebelum mengambil Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid
4. Cara menggunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid
5. Semasa menggunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid

Penyediaan ini adalah untuk rawatan

1. hipertensi ocular
2. 'Open-angle glaucoma'.

Bagaimana Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid berfungsi

Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid adalah perencat karbonik anhidrase mata yang mengurangkan tekanan tinggi dalam mata.

Sebelum mengambil Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid jika anda

- **alergi** (hipersensitif) kepada Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid atau mana-mana bahan-bahan lain dalam cecairn ini.

Mengandung dan menyusukan bayi

Tanya doctor atau ahli farmasi untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat. Beritahu doktor anda jika anda hamil atau merancang untuk hamil. Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid tidak boleh digunakan semasa hamil melainkan jika doktor anda mengesyorkannya.

Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid tidak boleh digunakan semasa menyusukan bayi.

- Sebelum mula mengambil

Sebelum rawatan dengan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid, beritahu doktor anda jika anda

- mempunyai atau mempunyai masalah **hati** di masa lalu
- telah diberitahu anda mempunyai **kecacatan kornea**
- mempunyai sebarang **alahan** kepada mana-mana ubat-ubatan
- telah, atau kira-kira akan menjalani **pembedahan** mata
- telah mengalami **kecederaan mata** atau **jangkitan mata**
- mempunyai sejarah **batu karang**
- mengambil ubat **perencat anhidrase karbonik lain seperti acetazolamide**
- **memakai kanta lekap**

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil apa-apa ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Khususnya, anda perlu memberitahu doktor anda jika anda mengambil perencat anhidrase karbonik lain seperti acetazolamide. Anda mungkin mengambil ubat jenis ini melalui mulut, sebagai ubat titis mata, atau melalui kaedah lain.

Cara menggunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid dengan betul seperti doktor anda memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Dos yang sesuai dan tempoh rawatan akan ditentukan oleh doktor anda.

Apabila Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid digunakan secara bersendirian, dos biasa adalah satu titis dalam mata berkenaan tiga kali sehari, contohnya di waktu pagi, pada waktu petang dan pada waktu malam.

Jika doktor anda mengesyorkan anda menggunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid dengan ubat titis mata beta-blocker (ubat-ubatan yang merendahkan tekanan mata), maka dos biasa adalah satu titis ubat Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid dalam mata yang berkenaan dua kali sehari, contohnya pada waktu pagi dan petang.

Jika anda menggunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid dengan ubat titis mata yang lain, jarakkan sekurang-kurangnya 10 minit di antara kedua ubat titis mata tersebut. Atau jika anda akan menggunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid untuk menggantikan ubat titis mata yang lain untuk merendahkan tekanan mata, anda perlu berhenti menggunakan ubat lain selepas menggunakan dos yang betul pada satu hari, dan memulakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid pada hari berikutnya.

- Bila perlu digunakan

Pada waktu pagi dan petang. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Jangan ubah dos ubat tanpa nasihat doktor. Jika anda perlu berhenti

rawatan, hubungi doktor anda dengan segera.

- Berapa lama perlu digunakan

Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid harus digunakan setiap hari untuk berkesan, jika anda perlu berhenti rawatan, hubungi doktor anda dengan segera.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa menggunakan

Adalah penting untuk menggunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid bagaimana yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika anda tertinggal satu dos, titiskan secepat mungkin. Walau bagaimanapun, jika ianya hampir pada masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan kembali kepada jadual dos biasa anda.

Jangan menggunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang lupa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan terlalu banyak titis dalam mata anda atau menelan apa-apa kandungan, anda perlu menghubungi doktor anda dengan segera.

Semasa menggunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid

- Perkara yang perlu dilakukan

Adalah disyorkan bahawa anda mencuci tangan anda sebelum memakai ubat titis mata anda.

Ia mungkin lebih mudah untuk menggunakan ubat titis mata anda di hadapan cermin.

Penutup Pasang (*Insert Cap*)

1. Patahkan penutup debu dengan memusingkan ia mengikut arah jam untuk memecahkan meterai. Tarik penutup debu (boleh dibuang).

2. Longgarkan penutup dalam (harus dikekalkan).
3. Dongakkan kepala ke belakang. Titiskan ubat dengan tekanan yang lembut. Jangan sentuh hujung penitis pada permukaan mata. Letakkan penutup dalam kembali pada botol selepas setiap kali menggunakan, ketatkan penutup pada muncung.

Penutup Jarum (*Spike Cap*)

1. Ketatkan penutup pada muncung.
2. Penutup jarum akan mencucuk muncung botol.
3. Titiskan ubat dengan tekanan lembut. Letakkan kembali penutup setiap kali selepas menggunakan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ubah dos ubat tanpa nasihat doktor. Jika anda perlu berhenti rawatan, hubungi doktor anda dengan segera.

Jangan biarkan hujung bekas menyentuh mata atau kawasan-kawasan di sekeliling mata anda. Ia boleh menjadi tercemar dengan bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan mata yang membawa kepada kerosakan mata yang serius, sehingga boleh kehilangan penglihatan. Untuk mengelakkan pencemaran jauhkan hujung bekas jauh daripada terkena mana-mana permukaan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- **Berhenti menggunakan** Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid dan hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengesyaki bahawa titisan mata menyebabkan reaksi alergi contoh, ruam kulit atau gatal-gatal, radang mata.
- **Memandu dan menggunakan ubat-ubatan**

Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid boleh menyebabkan pening dan gangguan penglihatan dalam beberapa pesakit. Jangan memandu atau menggunakan apa-apa alat atau jentera sehingga gejala-gejala telah hilang.

Maklumat penting tentang beberapa bahan-bahan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid

Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid mengandungi pengawet benzalkonium klorida.

- Benzalkonium klorida boleh menyebabkan kerengsaan mata
- Benzalkonium klorida diketahui boleh menghitamkan kanta sentuh lembut
- Elakkan sentuhan dengan kanta sentuh lembut

Keluarkan kanta lekap sebelum menggunakan dan tunggu sehingga 15 minit sebelum dipasang semula.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Jika anda mengalami reaksi alahan termasuk gatal-gatal, bengkak muka, bibir, lidah, dan / atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas atau menelan, anda perlu berhenti menggunakan ubat ini dan dapatkan nasihat perubatan dengan segera.

Kesan-kesan sampingan yang berikut boleh dilihat dengan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid:

Sangat biasa

- Rasa membakar dan pedih mata

Biasa

- penyakit lapisan permukaan mata dengan sakit mata dan penglihatan yang kabur, keradangan atau bengkak lapisan permukaan mata dan keradangan mungkin pada kelopak mata dan / atau kulit di sekeliling mata, berair atau gatal-gatal mata, penglihatan kabur, kesan di permukaan mata
- loya, rasa pahit
- lemah / keletihan
- sakit kepala

Luar biasa

- keradangan lapisan tengah mata

Jarang berlaku

- bengkak lapisan permukaan mata , pemisahan sebahagian daripada selaput mata disebabkan oleh bendalir yang terkumpul yang boleh diiringi dengan perubahan / gangguan penglihatan (selepas pembedahan mata), tekanan rendah di mata, kemerahan mata , sakit mata, kerak di kelopak mata , rabun jauh sementara (yang hilang apabila ubat dihentikan)
- kerengsaan tekak, mulut kering
- hipersensitiviti: tanda-tanda dan gejala-gejala tindak balas tempatan (pada kelopak mata) dan reaksi alahan seperti ruam, gatal-gatal, dalam kes-kes yang jarang berlaku mungkin bengkak pada bibir, mata dan mulut, sesak nafas dan lebih jarang berdehit
- pening, kebas / kesemutan
- pembentukan batu karang di dalam sistem kencing
- radang kulit

Jika mana-mana kesan-kesan sampingan yang semakin serius, atau jika anda notis apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web np.ra.moh.gov.my (*Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid

- Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Jangan gunakan Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan

pada label botol dan karton selepas EXP. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan botol dalam kotak luar untuk melindungi daripada cahaya. Simpan di bawah 30°C.

Ubat titis mata Dorzolamide Hidroklorid mesti digunakan dalam tempoh 28 hari selepas botol mula-mula dibuka. Oleh itu, anda mesti buang botol 4 minggu selepas pertama kali dibuka, walaupun masih ada baki lagi. Untuk membantu anda mengingati tulis tarikh anda buka atas kotak luar.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air kumbahan atau buangan isi rumah.

Tanya ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan.

Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair jernih, yang sedikit likat, bebas daripada zarah.

- Bahan-bahan kandungan
 - Bahan aktif
Dorzolamide Hydrochloride.
 - Bahan tidak aktif
Mannitol, hydroxyethyl selulosa, klorida benzalkonium (sebagai pengawet), natrium sitrat, natrium hidroksida dan air untuk suntikan
- Nombor MAL
MAL13125012AZ

Pengilang FDC Limited

Plot No.B-8, M.I.D.C. Industrial Area, Waluj, Aurangabad 431 136, Maharashtra State, India.

Pemegang Pendaftaran Produk UNIMED SDN BHD

No.53 Jalan Tembaga SD 5/2B, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur.

Nombor Siri

NPRA(R2/2)200117/336

Tarikh kemaskini RiMUP

21/01/2020