TABLET ARIAN

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Aripiprazole (10mg, 15mg, 20mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ARIAN
2. Bagaimana ARIAN berfungsi
3. Sebelum menggunakan ARIAN
4. Cara menggunakan ARIAN
5. Semasa menggunakan ARIAN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ARIAN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ARIAN

ARIAN digolongkan dalam kelas ubat yang dikenali sebagai antipsikotropik. Ia digunakan untuk merawat penyakit skizofrenia dan gangguan yang berkaitan dengan mania dalam kalangan pesakit yang menderita daripada penyakit yang disifatkan oleh simptom seperti pendengaran, melihat dan merasai sesuatu benda yang tidak wujud, kesangsian, kepercayaan yang salah, pertuturan dan tingkah laku yang sukar difahami serta kebosanan emosi. Pesakit yang tergolong dalam keadaan ini turut berkemungkinan menghadapi masalah kemurungan, perasaan rasa bersalah, cemas ataupun rasa tertekan.

Bagaimana ARIAN berfungsi

ARIAN bertindak pada pelbagai reseptor dalam otak, terutamanya reseptor dopamine dan serotonin (5HT). Dopamine dan serotonin adalah sebatian semula jadi yang dikenali sebagai neurotransmitter, dan terlibat dalam menghantar mesej di antara sel-sel otak. Penyakit psikotik dianggap disebabkan oleh gangguan dalam aktiviti neurotransmitter (terutamanya dopamin) di dalam otak. Fungsi utama ARIAN ialah untuk menstabilkan aktiviti dopamin di dalam otak.

Sebelum menggunakan ARIAN

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah kepada aripiprazole atau mana-mana bahan-bahan lain ubat ini (yang disenaraikan di bahagian 6).

- Sebelum menggunakan ARIAN

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil aripiprazole, jika anda mengalami atau telah mengalami pada masa lalu dari mana-mana syarat-syarat berikut. Beritahu doktor anda jika anda mengalami:

- Kandungan gula tinggi dalam darah (dicirikan oleh gejala-gejala seperti dahaga yang berlebihan, jumlah air kencing yang tinggi, peningkatan selera makan, rasa lemah) atau sejarah keluarga diabetes.
- Sawan.
- Pergerakan otot yang tidak boleh dikawal atau tidak menentu, terutama pada muka.
- Penyakit kardiovaskular, sejarah penyakit kardiovaskular dalam keluarga, strok atau "mini" strok, tekanan darah yang tidak normal.
- Darah beku, sejarah keluarga darah beku, dimana antipsikotropik telah dikaitkan dengan pembentukan darah beku.

Jika anda mendapati berat badan anda bertambah, mengalami apa-apa kesukaran menelan atau gejala-gejala alahan, sila beritahu doktor anda.

Jika anda seorang pesakit warga tua yang mengalami demensia (kehilangan memori dan lain-lain kebolehan mental), anda atau penjaga / saudara anda perlu memberitahu doktor anda jika anda pernah mengalami strok atau strok "mini".

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mempunyai apa-apa pemikiran atau perasaan tentang mencederakan diri anda. Pemikiran membunuh diri dan tingkah laku telah dilaporkan semasa rawatan ARIAN.

ARIAN mengandungi laktosa. Jika anda diberitahu oleh doktor anda bahawa anda mempunyai ketidak toleransi terhadap laktosa, beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika telah mengambil apa-apa ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Ubat pengurangkan tekanan darah: ARIAN boleh meningkatkan kesan ubat-ubatan yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Pastikan anda memberitahu doktor anda jika anda mengambil ubat untuk mengawal tekanan darah anda.

Mengambil ARIAN dengan beberapa ubat-ubatan mungkin perlu menukar dos ARIAN anda. Adalah amat penting untuk memeberitahu perkara-perkara berikut dengan doktor anda:

- Ubat-ubatan untuk membetulkan degupan jantung
- Antidepresan atau remedi herba yang digunakan untuk merawat kemurungan dan kebimbangan
- Agen antikulat
- Ubat-ubatan tertentu untuk merawat jangkitan HIV
- Antikonvulsant yang digunakan untuk merawat epilepsi

Cara menggunakan ARIAN

- *Berapa banyak harus digunakan*

Sentiasa mengambil ARIAN seperti yang doktor memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti

Skizofrenia: Dos yang disyorkan dan dos sasaran ialah 10mg atau 15mg sekali sehari, sebelum atau selepas makan. Walau bagaimanapun, doktor anda boleh menetapkan dos yang lebih rendah atau lebih tinggi kepada maksimum 30 mg sekali sehari.

Penyakit Mania Bipolar: Dos yang disyorkan ialah 15mg hingga 30mg sekali sehari, sebelum atau selepas makan. Walau bagaimanapun, doktor anda boleh menetapkan dos yang lebih rendah atau lebih tinggi kepada maksimum 30 mg sekali sehari.

ARIAN tidak digunakan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja di bawah 18 tahun. Tanya doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ARIAN.

- *Bila perlu digunakan*
  Ambil ubat anda sekali sehari sama ada di waktu pagi atau petang

- *Berapa lama perlu digunakan*
Jangan mengubah atau menghentikan dos harian ARIAN tanpa berbincang dahulu dengan doktor anda.

- *Jika terlupa menggunakan*
  - Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, tidak mengambil dos yang tertinggal itu. Hanya mengambil dos seterusnya pada masa yang tepat.
  - Jangan ambil dos yang berganda untuk membuat untuk dos yang terlupa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- Jika anda secara tidak sengaja mengambil terlalu banyak aripiprazole, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke jabatan kecemasan hospital yang berdekatan.

Semasa menggunakan ARIAN
- Perkara yang perlu dilakukan
Sentiasa mengambil tablet dengan air dan menelannya seluruh seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Sila beritahu doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang mengubati anda tentang pengambilan tablet ARIAN.

Pastikan anda memberitahu doktor anda dengan segera jika anda hamil, mungkin hamil, atau jika anda merancang untuk hamil.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*
  Jangan menghentikan pengambilan ubat kecuali dinasihati oleh doktor anda.

  Jangan mengambil sebarang ubat-ubatan baru tanpa berunding dengan doktor anda.
  Sebarang pengambilan alkohol harus dielakkan apabila mengambil ARIAN

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*
Seperti ubat-ubat lain, Arian boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan pada pesakit tertentu. Kekerapan kesan-kesan sampingan dibahagikan kepada:

Kesan-kesan sampingan yang biasa: pergerakan tanpa terkawal atau pergerakan secara mengejut, sakit kepala, keletihan, loya, muntah-muntah, perasaan yang tidak selesa pada perut, sembelit, peningkatkan pengeluaran air liur, pening kepala, masalah tidur, rasa keresahan,mengantuk, mengetar dan penglihatan kabur.

Kesan-kesan sampingan yang luar biasa: sesetengah orang mungkin merasa pening, terutamanya apabila bangun dari berbaring atau duduk, atau mengalami denyutan jantung yang cepat.
Sesetengah orang mungkin merasa tertekan.

Cara penyimpanan dan pelupusan ARIAN
Penyimpanan

Jauhi ubat ini daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 30 º C.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada blister dan pada karton tersebut.

- *Pelupusan*
Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau air isi rumah. Tanya ahli farmasi anda tentang cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan

Maklumat lanjut
- *Rupa dan warna produk*
Tablet ARIAN 10 mg berwarna putih, tidak bersalut, berbentuk bujur, pinggir berserong.

Tablet ARIAN 15 mg berwarna putih, tidak bersalut, berbentuk bulat, cembung, pinggir berserong.

Tablet ARIAN 20 mg berwarna putih, tidak bersalut, berbentuk bulat, cembung.
- *Bahan-bahan kandungan*
Bahan aktif
Aripiprazole.

Bahan tidak aktif
Maize Starch (Unipure F), Lactose monohydrate (Pharmatose 200M) Hydroxy propyl cellulose (Klucel EF) Microcrystalline Cellulose (Avicel pH101), Magnesium Stearate, purified water

- *Nombor MAL*

ARIAN 10MG:

ARIAN 15MG:

ARIAN 20MG:

Pengilang
Indoco Remedies Limited
L-14, Verna Industrial Estate,
Verna-Goa 403 722,
India.

Pemegang Pendaftaran Produk
UNIMED SDN BHD
No.53 Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur

Tarikh kemaskini RiMUP
22/01/ 2015