

TABLET GIAGRA

(Sildenafil Citrate bersamaan dengan Sildenafil 25mg, 50mg & 100 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **GIAGRA**
2. Bagaimana **GIAGRA** berfungsi
3. Sebelum mengambil **GIAGRA**
4. Cara menggunakan **GIAGRA**
5. Semasa menggunakan **GIAGRA**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **GIAGRA**
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan **GIAGRA**

GIAGRA digunakan untuk rawatan disfungsi erektile, yang merupakan ketidakupayaan untuk mencapai atau mengekalkan ereksi zakar yang mencukupi untuk prestasi seksual yang memuaskan. Untuk mendapatkan kesan **GIAGRA**, rangsangan seksual diperlukan.

Bagaimana **GIAGRA** berfungsi:

Ia berfungsi dengan membantu melonggarkan saluran darah di zakar anda, membolehkan darah mengalir ke dalam zakar anda apabila anda mendapat seksual teruja. **GIAGRA** hanya akan membantu anda untuk mendapatkan ereksi jika anda dirangsang secara seksual. Anda tidak perlu mengambil **GIAGRA** jika anda tidak mempunyai disfungsi erektile.

Sebelum mengambil **GIAGRA**

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil **GIAGRA**

- Jika anda mengambil ubat-ubatan yang dipanggil nitrat, sebagai kombinasi yang boleh menyebabkan penurunan dalam tekanan darah anda. Beritahu doktor anda jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan ini yang sering diberikan untuk melegakan angina pectoris (atau "sakit dada"). Jika anda tidak pasti, tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda.
- Jika anda menggunakan mana-mana ubat yang dikenali sebagai penderma nitrik oksida seperti nitrit amyl ('poppers') sebagai gabungan juga boleh membawa kepada penurunan tekanan darah anda yang berpotensi berbahaya.
- Jika anda alah (hipersensitif) **GIAGRA** atau mana-mana bahan-bahan lain **GIAGRA**.
- Jika anda mempunyai jantung yang teruk atau masalah hati
- Jika anda baru-baru ini mengalami strok atau serangan jantung, atau jika anda mempunyai tekanan darah rendah.
- Jika anda mempunyai penyakit mata tertentu yang diwarisi tetapi jarang berlaku (seperti pigmentosa Retinitis).

Jika anda pernah mempunyai kehilangan penglihatan disebabkan oleh **optik neuropati** iskemik anterior bukan arteritis (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION)

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda

- jika anda mempunyai anemia sel sabit (kelainan sel darah merah), leukemia (kanser sel-sel darah), multiple myeloma (kanser sum-sum tulang)
- Jika anda mempunyai kecacatan zakar atau penyakit Peyronie.
- jika anda mempunyai masalah dengan jantung anda. Doktor anda perlu dalam kes itu dengan berhati-hati memeriksa sama ada jantung anda boleh mengambil tekanan tambahan melakukan hubungan seks.
- jika anda ada ulser perut, atau masalah pendarahan (seperti penyakit darah).
- jika anda mengalami **penurunan atau kehilangan penglihatan secara tiba-tiba**, berhenti mengambil **GIAGRA** dan hubungi doktor anda dengan segera.
- Jika anda telah mengalami infarksi miokardium, strok, atau aritmia mengancam nyawa dalam tempoh 6 bulan yang lalu
- Jika anda mempunyai hipotensi berehat (BP <90/50) atau tekanan darah tinggi (BP >170/110)
- Jika anda mempunyai Retinitis pigmentosa (minoriti pesakit ini mempunyai gangguan genetik phosphodiesterases retina)

Anda tidak perlu menggunakan **GIAGRA** dengan mana-mana ubat lain secara oral atau rawatan tempatan yang lain untuk disfungsi erektile.

Pertimbangan khas untuk kanak-kanak dan remaja

GIAGRA tidak sepatutnya diberikan kepada individu di bawah umur 18 tahun .

Pertimbangan khas untuk pesakit-pesakit dengan masalah buah pinggang atau hati.

Anda perlu memberitahu doktor anda jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati. Doktor anda boleh mencadangkan dos yang lebih rendah untuk anda.

Kehamilan dan penyusuan

GIAGRA tidak disarankan untuk digunakan oleh wanita

- Jika mengambil ubat-ubut lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Tablet **GIAGRA** boleh mengganggu sesetengah ubat-ubatan, terutama yang digunakan untuk merawat sakit dada. Dalam keadaan kecemasan , anda perlu memberitahu mana-mana profesional kesihatan yang anda telah mengambil **GIAGRA**. Jangan mengambil **GIAGRA** dengan ubat-ubatan lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda bahawa anda boleh .

Anda tidak perlu mengambil **GIAGRA** jika anda mengambil ubat-ubatan yang dipanggil nitrat sebagai gabungan produk-produk ini boleh menyebabkan penurunan yang berpotensi berbahaya dalam tekanan darah anda. Sentiasa beritahu doktor atau ahli

farmasi jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan yang sering digunakan untuk melegakan angina pectoris (atau "sakit dada").

Anda tidak perlu mengambil **GIAGRA** jika anda menggunakan mana-mana dadah yang dikenali sebagai penderma nitrik oksida seperti nitrit amyl ("poppers") sebagai gabungan juga boleh membawa kepada penurunan tekanan darah anda yang berpotensi berbahaya .

Jika anda mengambil ubat-ubatan yang dikenali sebagai perencat protease, seperti untuk rawatan HIV, doktor anda mungkin mulakan anda pada dos yang paling rendah (25 mg) **GIAGRA**.

Sesetengah pesakit yang mengambil terapi alpha-blocker untuk rawatan tekanan darah tinggi atau pembesaran prostat mungkin mengalami pening yang mungkin disebabkan oleh tekanan darah rendah semasa duduk atau berdiri dengan cepat. Pesakit-pesakit tertentu telah mengalami gejala-gejala ini apabila mengambil **GIAGRA** dengan alpha-blockers. Ini adalah yang paling mungkin berlaku dalam tempoh 4 jam selepas mengambil **GIAGRA**. Bagi mengurangkan kemungkinan bahawa simptom-simptom ini berlaku, anda harus menggunakan dos harian tetap alpha-blocker anda sebelum memulakan **GIAGRA**. Doktor anda mungkin mulakan anda pada dos yang lebih rendah (25 mg) **GIAGRA**.

Cara menggunakan GIAGRA

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa mengambil **GIAGRA** tepat sebagai doktor anda memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau

ahli farmasi anda jika anda tidak pasti. Dos permulaan yang biasa ialah 50 mg.

- Bila perlu digunakan

Anda perlu mengambil **GIAGRA** kira-kira satu jam sebelum anda merancang untuk mengadakan hubungan seks. Telan keseluruhan tablet dengan segelas air.

- Berapa lama perlu digunakan

Produk ini tidak memerlukan dos yang tetap dan hanya perlu diambil sebelum melakukan hubungan seks.

Jika terlupa menggunakan

Tidak berkenaan

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Anda mungkin akan mengalami peningkatan dalam kesan-kesan sampingan dan tahap mereka. Dos melebihi 100 mg tidak meningkatkan keberkesanan.

Anda tidak perlu mengambil lebih daripada doktor anda memberitahu anda.

Hubungi doktor anda jika anda mengambil tablet yang lebih daripada anda harus .

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat-ubatan ini, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi.

Semasa menggunakan GIAGRA

- Perkara yang perlu dilakukan

- Jika **GIAGRA** tidak membantu anda untuk mendapatkan ereksi, atau jika ereksi anda tidak bertahan cukup lama bagi anda untuk menyelesaikan hubungan seks, anda

perlu memberitahu kepada doktor anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Anda tidak harus mengambil **GIAGRA** lebih dari satu kali sehari.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mempunyai tanggapan bahawa kesan **GIAGRA** adalah terlalu kuat atau terlalu lemah, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

GIAGRA hanya akan membantu anda untuk mendapatkan ereksi jika anda dirangsang secara seksual. Jumlah masa **GIAGRA** bertindak berbeza dari seorang ke seorang, tetapi ia biasanya mengambil masa antara setengah hingga satu jam. Anda mungkin mendapati bahawa **GIAGRA** mengambil masa yang lebih lama untuk bertindak jika anda mengambil dengan hidangan berat.

Jika **GIAGRA** tidak membantu anda untuk mendapatkan ereksi, atau jika ereksi anda tidak bertahan cukup lama untuk anda melakukan hubungan seks, anda perlu memberitahu doktor anda.

Memandu dan menggunakan mesin

GIAGRA boleh menyebabkan pening dan boleh menjejaskan penglihatan. Anda harus sedar bagaimana anda bertindak balas terhadap **GIAGRA** sebelum anda memandu atau menggunakan jentera

Mengambil **GIAGRA dengan makanan dan minuman**

GIAGRA boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

Walau bagaimanapun, anda mungkin mendapati bahawa **GIAGRA** mengambil masa yang lebih lama untuk bertindak jika anda mengambil dengan hidangan berat.

Minum arak boleh menjejaskan keupayaan anda untuk mendapatkan ereksi secara sementara. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimum daripada ubat anda, anda dinasihatkan supaya tidak minum alkohol yang berlebihan sebelum mengambil **GIAGRA**.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, **GIAGRA** boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan walaupun tidak semua orang mendapatnya. Kesan-kesan sampingan yang dilaporkan dengan penggunaan **GIAGRA** biasanya ringan hingga sederhana dan tempoh yang singkat.

Jika anda mempunyai sakit dada semasa atau selepas hubungan:

Duduk secara separa dan cuba untuk berehat

Jangan gunakan nitrat untuk merawat sakit dada anda

Hubungi doktor anda dengan segera

Semua ubat-ubatan termasuk **GIAGRA** boleh menyebabkan reaksi alahan. Anda perlu menghubungi doktor anda dengan segera.

Jika anda mengalami mana-mana gejala berikut selepas mengambil **GIAGRA**: nafas yang berdehrit secara tiba-tiba, kesukaran bernafas atau pening kepala, bengkak kelopak mata, muka, bibir atau tekak.

Ereksi yang berpanjangan dan kadang-kadang menyakitkan telah dilaporkan selepas

mengambil **GIAGRA**. Jika anda mempunyai ereksi yang berlangsung selama lebih daripada 4 jam, anda perlu menghubungi doktor dengan segera.

Jika anda mengalami penurunan secara tiba-tiba atau kehilangan penglihatan, berhenti mengambil **GIAGRA** dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan sampingan yang sangat biasa adalah sakit kepala.

Kesan sampingan biasa Pening, gangguan visual, herotan warna visual, muka merah, hidung tersumbat, kembung perut, cirit-birit, dan jangkitan saluran kencing..

Jika mana-mana kesan-kesan sampingan jadi serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting)".

Cara penyimpanan dan pelupusan **GIAGRA**

- Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan kurang daripada 30°C.

Simpan di dalam pakej asal, untuk melindungi daripada kelembapan.

Jangan menggunakan **GIAGRA** selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan di karton. Tarikh luput merujuk

kepada hari yang terakhir bulan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak perlu dilupuskan melalui air kumbahan atau pembuang isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet GIAGRA 25

Bulat berwarna biru, dwicembung, tablet bersalut filem, debossed dengan 124 pada sebelah dan huruf "J" di sebelah lain. Setiap tablet bersalut filem mengandungi Sildenafil Citrate 35.12mg bersamaan dengan Sildenafil 25mg.

Tablet GIAGRA 50

Bulat berwarna biru, dwicembung, tablet bersalut filem, debossed dengan 125 pada sebelah dan "J" di sebelah lain dengan garisan skor. Setiap tablet bersalut filem mengandungi Sildenafil Citrate 70.24mg bersamaan dengan Sildenafil 50mg.

Tablet GIAGRA 100

Bulat berwarna Biru, dwicembung, tablet filem bersalut, debossed dengan 126 pada sebelah dan "J" di sebelah lain dengan garisan skor. Setiap tablet bersalut filem mengandungi Sildenafil Citrate 140.48mg bersamaan dengan Sildenafil 100mg.

- Bahan-bahan kandungan
- Bahan aktif
Sildenafil Citrate
 - Bahan tidak aktif
cellulose,
microcrystalline,

calcium hydrogen
phosphate anhydrous,
croscarmellose sodium,
magnesium stearate,
opadry II blue, opadry
clear & purified water.

- Nombor MAL:

- **GIAGRA 25**- MALxxxxxxxA
- **GIAGRA 50**- MALxxxxxxxA
- **GIAGRA 100**-MALxxxxxxxA

Pengilang

Hetero Labs Limited

Unit V, Sy.No. 439, 440, 441
& 458, TSIIC SEZ, Polepally
Village, Jadcherla Mandal,
Mahaboobnagar District,
Telangana, India.

Pemegang Pendaftaran

Produk:

Unimed Sdn Bhd

No 53, Jalan Tembaga SD
5/2B, Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini RiMUP

- 13/11/2015