

MILLISPIRIN

Acetyl Salicylic Acid Soluble Tablet 300 mg (Aspirin)

Aspirin (300mg)

APA DALAM RISALAH INI?

1. Apakah kegunaan MILLISPIRIN
2. Bagaimana MILLISPIRIN berfungsi
3. Sebelum mengambil MILLISPIRIN
4. Cara menggunakan MILLISPIRIN
5. Semasa menggunakan MILLISPIRIN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MILLISPIRIN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini

1. APAKAH KEGUNAAN MILLISPIRIN

MILLISPIRIN boleh digunakan untuk:

- Melegakan kesakitan ringan dan sederhana seperti sakit sendi, sakit perut, sakit otot, sakit saraf dan sakit kepala
- Mengurangkan atau melegakan keradangan
- Melegakan demam

Di bawah nasihat oleh doktor, MILLISPIRIN juga boleh digunakan untuk mengelakkan pembekuan darah terutama selepas serangan jantung atau pada pesakit dengan angina tidak stabil (sakit dada) atau aliran darah berkurangan di dalam otak.

2. BAGAIMANA MILLISPIRIN BERFUNGSI

Aspirin tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai ubat anti-radang bukan steroid (NSAIDS) yang mempunyai kesan analgesik (melegakan kesakitan), anti-

inflamasi (keradangan mengurangkan) dan antipiretik (suhu mengurangkan).

Ia juga boleh digunakan untuk mengurangkan risiko pembekuan darah dan membantu untuk mengelakkan menyekat saluran darah yang boleh membawa kepada peristiwa-peristiwa seperti strok, serangan jantung atau kematian.

3. SEBELUM MENGAMBIL MILLISPIRIN

Apabila anda tidak boleh menggunakannya

Jangan gunakan MILLISPIRIN jika anda:

- Alah (hipersensitif) kepada aspirin, salisilat atau NSAID atau bahan-bahan lain dalam produk
- Terdedah kepada senak atau diketahui mempunyai ulser perut atau usus kecil
- Mempunyai masalah buah pinggang, jantung atau hati yang teruk
- Sedang menerima rawatan anti-koagulan (ubat yang digunakan untuk menghalang darah beku)
- Seorang pesakit dengan haemofilia atau gangguan pendarahan yang lain
- Seorang pesakit dengan gout

Mengandung dan menyusukan

Jangan gunakan MILLISPIRIN jika anda hamil atau cuba untuk hamil kecuali diarahkan oleh doktor anda.. MILLISPIRIN boleh memanjangkan sakit bersalin dan menjejaskan pembekuan darah dalam ibu atau bayi

Jika anda sedang menyusukan, anda tidak perlu mengambil MILLISPIRIN kerana ia dirembeskan ke dalam susu ibu dan boleh membahayakan bayi

anda. **Penggunaan pada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun**

Terdapat kaitan antara aspirin dan sindrom Reye apabila diberikan kepada kanak-kanak. Sindrom Reye biasanya berlaku selepas. jangkitan virus seperti cacar air atau selesema.

Atas sebab ini aspirin tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah 16 tahun, kecuali atas nasihat doktor.

Menggunakan aspirin untuk menghentikan pembekuan darah

Dos optimum untuk menghentikan pembekuan darah pada manusia tidak diketahui. Oleh itu, jangan gunakan aspirin untuk tanda-tanda yang berkaitan pemberhentian pembekuan darah kecuali diarahkan oleh doktor.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil ubat ini, rujuk kepada doktor anda.

Sebelum anda mula menggunakannya:

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan kepada mana-mana ubat-ubatan lain, makanan, bahan pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika:

- Anda merancang untuk menjalani pembedahan (termasuk pembedahan gigi) dalam tempoh dua minggu akan datang. Doktor anda akan menentukan sama ada atau tidak anda perlu berhenti MILLISPIRIN sebelum pembedahan.
- Jika anda mempunyai atau mempunyai sebarang masalah kesihatan, terutamanya yang berikut:

- gangguan atau masalah pembekuan darah pendarahan
- sebarang penyakit atau kecacatan yang disebabkan oleh pendarahan, sebagai contoh penglihatan terjejas atau penglihatan kerana pendarahan dalam mata
- kecederaan serius baru-baru ini pembedahan baru-baru ini (termasuk pembedahan gigi)
- sebarang bentuk penyakit hati
- mana-mana sejarah stok baru-baru ini
- sebarang bentuk penyakit buah pinggang
- sejarah ulser perut atau masalah-masalah lain dengan sistem penghadaman anda
- galactose intolerance penyakit keturunan menyebabkan sikap tidak bertoleransi galaktosa
- gout
- asma atau alahan

Jika anda tidak memberitahu doktor atau ahli farmasi anda tentang mana-mana di atas, beritahu dia / dia sebelum anda mula mengambil MILLISPIRIN.

Mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau jika anda baru-baru ini mengambil apa-apa ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat-ubatan dan MILLISPIRIN boleh mengganggu satu sama lain. Ia adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- Warfarin dan heparin - ubat-ubatan yang digunakan untuk menghalang darah beku.
- Acetazolamide - boleh membawa kepada kepekatan serum tinggi acetazolamide (dan keracunan).
- Phenytoin dan asid valproic, (untuk rawatan epilepsi). Aspirin boleh menyebabkan pengurangan dalam kepekatan jumlah phenytoin dan peningkatan dalam tahap asid valproic.

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

- Methotrexate yang boleh menyebabkan ketoksikan sumsum tulang, terutamanya pada orang tua atau buah pinggang terjejas.
- Ubat-ubatan untuk rawatan penyakit kencing manis - aspirin boleh meningkatkan kesan gula darah rendah.
- Penggunaan aspirin serentak dengan NSAID lain perlu dielakkan kerana ini boleh meningkatkan pendarahan atau menyebabkan fungsi buah pinggang berkurangan.

4. CARA MENGGUNAKAN MILLISPIRIN

MILLISPIRIN boleh digunakan untuk:

- Melegakan kesakitan ringan dan sederhana seperti sakit sendi, sakit perut, sakit otot, sakit saraf dan sakit kepala
- Mengurangkan atau melegakan keradangan
- Melegakan demam

Di bawah nasihat oleh doktor, MILLISPIRIN juga boleh digunakan untuk mengelakkan pembekuan darah terutama selepas serangan jantung atau pada pesakit dengan angina tidak stabil (sakit dada) atau aliran darah berkurangan di dalam otak.

Berapa banyak harus diambil

Dos yang diberikan oleh doktor anda mungkin berbeza daripada risalah ini.

Dos yang disyorkan untuk orang dewasa dan warga tua:

Dewasa

Untuk kesakitan ringan dan sederhana iaitu sakit kepala, sakit otot, sakit sendi dan demam. 300 - 900 mg (1 hingga 3 tablet) setiap 4 hingga 8 jam. Sehingga maksimum 12 tablet setiap hari (setiap 24 jam).

Untuk pintasan koronari, transluminal angioplasti, strok, serangan iskemia

sementara, angina tidak stabil. 150 (1/2 tablet) yang perlu diambil setiap hari, sebaik-baiknya pada masa yang sama setiap hari.

Nasihat doktor perlu dicari sebelum memulakan terapi untuk kali pertama. Dalam sesetengah keadaan dos yang lebih tinggi mungkin sesuai, dan sehingga 300 mg sehari boleh digunakan atas nasihat doktor.

Pesakit Tua

Secara umum, aspirin harus digunakan dengan berhati-hati di kalangan pesakit tua yang lebih cenderung kepada peristiwa-peristiwa yang buruk. Dos dewasa biasa adalah disyorkan jika tiada kekurangan buah pinggang atau hati yang teruk. regular. Rawatan perlu dikaji semula secara berkala.

Bila menggunakannya

Ambil MILLISPIRIN pada masa yang sama setiap hari. Mengambil tablet anda pada masa yang sama setiap hari akan mempunyai kesan yang terbaik. Ia juga akan membantu anda untuk ingat apabila mengambilnya.

Mengambil dengan atau tanpa makanan

MILLISPIRIN boleh diambil dengan atau tanpa makanan. Jika sakit perut berlaku, ambil selepas makan untuk mengurangkan kerengsaan perut.

Berapa lama untuk menggunakannya

Terus mengambil ubat-ubatan anda selagi doktor anda memberitahu anda.

Jangan gunakan MILLISPIRIN berterusan selama lebih daripada 10 hari untuk sakit atau lebih dari 3 hari untuk demam tanpa berunding dengan doktor.

Jika anda terlupa untuk mengambilnya

Ambil MILLISPIRIN sebaik sahaja anda ingat jika anda terlupa untuk mengambilnya. Walau bagaimanapun, jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan ambil dos seterusnya anda apabila anda adalah bertujuan untuk. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang anda terlepas.

Jika anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)

Jika anda (atau orang lain) sengaja mengambil terlalu banyak pil, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera. Menunjukkan risalah ini atau mana-mana bungkusan dengan doktor anda untuk memberitahu apa yang anda telah ambil.

Gejala berlebihan termasuk: -

- Keracunan ringan hingga sederhana (berlebihan)
 - pening,
 - tinnitus (deringan di telinga anda),
 - pekak,
 - berpeluh,
 - loya dan muntah,
 - sakit kepala dan
 - kekeliruan mental
- Keracunan yang teruk (berlebihan)
 - hyperventilation,
 - demam,
 - keresahan,
 - ketosis
 - alkalosis pernafasan
 - asidosis metabolik
 - Kemurungan sistem saraf pusat boleh membawa kepada keadaan koma; keruntuhan kardiovaskular dan kegagalan pernafasan mungkin berlaku.

5. SEMASA MENGGUNAKAN MILLISPIRIN

Perkara yang anda mesti lakukan

Jika anda hamil semasa mengambil MILLISPIRIN beritahu doktor anda dengan segera.

Jika anda kira-kira untuk memulakan mengambil apa-apa ubat baru beritahu doktor dan ahli farmasi bahawa anda mengambil MILLISPIRIN .

Memberitahu semua doktor, doktor gigi, dan ahli farmasi yang merawat bahawa anda mengambil / menggunakan MILLISPIRIN.

Jika anda akan menjalani pembedahan, beritahu doktor anda mengambil MILLISPIRIN.

Perkara yang anda tidak boleh lakukan

Jangan berikan MILLISPIRIN kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Jangan mengambil MILLISPIRIN untuk merawat sebarang penyakit lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Perkara yang harus berhati-hati

Berhati-hati memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana MILLISPIRIN memberi kesan kepada anda.

MILLISPIRIN mungkin menyebabkan pening atau awang pada sesetengah orang.

Pastikan anda tahu bagaimana anda bertindak balas kepada MILLISPIRIN sebelum anda memandu kereta, mengendalikan mesin, atau melakukan apa-apa lagi yang boleh membahayakan jika anda pening atau awang.

Jika anda minum alkohol, pening kepala atau awang mungkin lebih teruk.

6. KESAN-KESAN SAMPINGAN

Seperti semua ubat-ubatan, MILLISPIRIN boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda dapati kesan-kesan sampingan yang berikut dan mereka bimbang anda:

- **Sistem Saraf Pusat:** Meradang, pengumpulan air di dalam otak, koma, kekeliruan, pening, sakit kepala, pendarahan dalam otak, keletihan dan sawan.
- **Kardiovaskular:** degupan jantung yang tidak teratur (**Dysrhythmia**), tekanan darah rendah, kadar jantung yang cepat (tachycardia).
- **Cecair dan elektrolit:** Dehidrasi, kalsium yang tinggi dalam darah, terlalu banyak asid dalam cecair badan (asidosis metabolik), tahap rendah karbon dioksida dalam darah (alkalosis pernafasan).
- **Gastrosus:** Ketidakhadaman,, pendarahan GI, ulser dan penembusan, loya, muntah, peningkatan sementara dalam enzim hati, hepatitis, sindrom Reye, (kerosakan otak yang teruk dan masalah fungsi hati), radang pankreas.
- **Pernafasan:** pernafasan dalam (**Hyperpnea**), edema pulmonari, pernafasan yang cepat (tachypnea).
- **Urogenital:** masalah buah pinggang dan gangguan (**nefritis** celahan dan nekrosis papillary), protein yang tinggi dalam air kencing, masalah dan kerosakan kepada buah pinggang ..
- **Hematologic:** pemanjangan pembekuan darah, gangguan pembekuan darah dan pendarahan (coagulopathy) dan penurunan platelet darah (thrombocytopenia).
- **Hipersensitiviti:** anafilaksis akut, bengkak epidermis dan salur pernafasan (angioedema dan edema berhubung dgn pangkal tekak), asma, bronchospasm, ruam kulit.

- **Muskuloskeletal:** Rosak tisu otot (*rhabdomyolysis*).
- **Metabolisme:** gula dalam darah yang rendah (dalam kanak-kanak), gula darah tinggi.
- **Pembiakan:** kehamilan dan sakit bersalin yang berpanjangan, mati semasa kelahiran, berat lahir bayi lebih rendah, pendarahan sebelum atau selepas bersalin.
- **Deria khas:** Kehilangan pendengaran, nada dalam telinga.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa sahaja yang membuat anda rasa tidak sihat.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada sesetengah orang.

Jangan terkejut dengan senarai ini. Kebanyakan orang tidak mengalami apa-apa

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

7. CARA PENYIMPANAN DAN PELUPUSAN MILLISPIRIN

Menyimpan di bawah 30°C.

Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

Jangan simpan MILLISPIRIN atau mana-mana ubat-ubatan lain di dalam bilik mandi, dekat sink atau meninggalkannya di ambang tingkap atau di dalam kereta.

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Pelupusan

Jangan gunakan MILLISPIRIN selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan di atas kotak dan blister.

Jika doktor anda memutuskan untuk menghentikan rawatan anda, kembalikan mana-mana ubat yang tidak digunakan kepada ahli farmasi. Hanya simpan jika doktor anda memberitahu anda.

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

8. MAKLUMAT LANJUT

Rupa bentuk

MILLISPIRIN: Tablet putih bulat bercembung dengan garisan di tengah

Pembungkusan

dibungkus dalam bungkusan alu-alu blister Setiap jalur mengandungi 10 tablet.

Bahan-bahan

Setiap tablet mengandungi aspirin (asid salisilik asetil) 300 mg.

Bahan-bahan lain adalah:

Colloidal anhydrous silica, sodium lauryl sulphate, purified talcum, stearic acid and maize starch.

Nombor Pendaftaran

MAL13115223XZ

9. PENGILANG

Dikeluarkan oleh:

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.
Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

10. PEMEGANG PENDAFTARAN PRODUK

Pemegang Pendaftaran Produk:

UNIMED SDN BHD
53, Jalan Tembaga SD 5/2B, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

11. TARIKH KEMASKINI

10 November 2022

12. NOMBOR SIRI

NPRA(R2/1)221110/974