

IOBRIM EYE DROPS

(Brimonidine Tartrate 0.2% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan IOBRIM
2. Bagaimana IOBRIM berfungsi
3. Sebelum menggunakan IOBRIM
4. Cara menggunakan IOBRIM
5. Semasa menggunakan IOBRIM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan IOBRIM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan IOBRIM

Digunakan untuk mengurangkan tekanan dalam mata.

Bagaimana IOBRIM berfungsi

Ia boleh digunakan sama ada bersendirian, apabila titis mata *beta-blocker* di kontraindikasi, atau dengan ubat titis mata lain, apabila ubat tunggal tidak cukup untuk menurunkan tekanan yang meningkat dalam mata, dalam rawatan glaukoma *open angle* atau hipertensi okular.

Sebelum menggunakan IOBRIM

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan IOBRIM

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada IOBRIM atau mana-mana bahan-bahan lain IOBRIM
- Jika anda sedang menyusukan bayi.

- Sebelum menggunakan IOBRIM

Sebelum anda menggunakan ubat ini, beritahu doktor anda:

Jika anda menderita atau mengalami kemurungan, kurang keupayaan mental, kekurangan bekalan darah ke otak, masalah jantung, bekalan darah yang terganggu daripada anggota badan atau penyakit tekanan darah.

- Jika anda mempunyai atau telah mempunyai masalah buah pinggang atau hati masa lalu.

- Jika diberikan untuk kanak-kanak yang berumur di antara 2 dan 12 tahun kerana IOBRIM tidak digalakkan untuk digunakan dalam kumpulan umur ini.

- Mengandung dan menyusukan

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat. Beritahu doktor anda sekiranya anda hamil atau merancang untuk mengandung. IOBRIM tidak boleh digunakan semasa menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau telah baru-baru ini menggunakan apa-apa ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan berikut:

- Ubat bius, sedatif, opiat, barbiturat atau kerap minum arak.
- Dadah yang menghalang reseptor beta (titis mata dan ubat makan), ubat-ubatan yang mengurangkan tekanan darah dan / atau *cardiac glycosides*
- Antidepresan kumpulan Tricyclic
- Jika dos sebarang ubat-ubatan yang sedang diambil ditukar. Ini boleh menjejaskan rawatan anda dengan IOBRIM.

Bagaimana menggunakan IOBRIM

Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan IOBRIM tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

Dos yang disyorkan adalah satu titis dalam mata terjejas dua kali sehari. Jika perlu doktor mungkin meminta anda untuk menambah titisan IOBRIM pada sebelah petang.

- **Apabila menggunakannya**

Untuk lebih berkesan IOBRIM mesti digunakan setiap hari.

- **Berapa lama untuk menggunakannya**

Jangan berhenti menggunakan IOBRIM sehingga doktor anda memberitahu anda untuk.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- **Jika anda terlupa menggunakannya**

Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, gunakan sebaik sahaja anda ingat. Jika, ia adalah hampir masa untuk dos seterusnya, anda perlu meninggalkan dos yang tertinggal sama sekali dan kemudian ikut rutin biasa anda.

- **Jika anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)**

Dewasa

Tidak ada kes penggunaan berlebihan di kalangan orang dewasa menggunakan IOBRIM. Ini tidak mungkin apabila diberi sebagai titis mata.

Jika IOBRIM telah sengaja ditelan atau jika anda telah menggunakan IOBRIM lebih dari yang seharusnya, sila hubungi doktor anda dengan segera

Semasa menggunakan IOBRIM

- Perkara yang perlu dilakukan

Arahan untuk penggunaan

IOBRIM adalah ubat titis mata. Basuh tangan anda sebelum menggunakan titis mata. Label preskripsi anda memberitahu anda berapa banyak titisan untuk digunakan pada setiap dos. Jika anda menggunakan IOBRIM

dengan lain ubat titisan mata, tunggu 5-15 minit sebelum menggunakan titisan mata kedua.

Guna titis mata anda dengan cara yang berikut:

1. Dongakkan kepala ke belakang dan melihat siling.
2. Perlahan-lahan tarik kelopak mata lebih rendah ke bawah sehingga terdapat poket kecil.
3. Picit botol penitis terbalik untuk melepaskan setitik ke dalam mata anda.
4. Sambil tutup mata terjejas, tekan jari anda daripada sudut mata tertutup (sebelah mana mata bertemu hidung) dan tahan selama 1 minit.

Elakkan daripada menyentuh hujung penitis terhadap mata atau apa-apa lain. Tutup dan ketatkan penutup selepas digunakan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Memandu dan menggunakan mesin

- IOBRIM boleh menyebabkan penglihatan kabur atau tidak normal. Kesan ini mungkin kelihatan lebih teruk pada waktu malam atau dalam pencahayaan rendah.
- IOBRIM juga boleh menyebabkan rasa mengantuk atau keletihan dalam sesetengah pesakit.
- Jika anda mengalami mana-mana gejala-gejala ini, jangan memandu atau menggunakan jentera sehingga tanda-tanda hilang.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mesin digunakan. Jika tablet membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau memberikan anda sakit kepala, tidak memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan: konjunktivitis alahan, hyperemia konjunktiva, dan pruritus mata.

Kesan buruk: rasa terbakar, kehadiran folikel limfa dalam jumlah yang besar (folliculosis konjunktiva), tekanan darah tinggi, kekeringan mulut, dan gangguan visual.

Peristiwa: alergi reaksi, lemah (asthenia) keradangan kronik kelopak mata (blepharitis), bronkitis, edema, konjunktiva, pendarahan konjunktiva, konjunktivitis, batuk, pening, pencernaan yang terganggu, nafas yang sulit, epiphora, pelepasan mata, kekeringan mata, kerengsaan mata, sakit mata, kelopak mata edema, erythema kelopak mata, sindrom selesema, konjunktivitis folikel, sensasi badan asing, sakit kepala, sakit tekak, fotofobia, ruam, rinitis, jangkitan sinus, resdung, rasa pedih, superficial punctuate keratopathy, kecacatan medan penglihatan, *floater vitreous* (debris kecil dalam vitreous mata), dan bertambah buruk ketajaman penglihatan.

Reaksi buruk berikut katanya: hakisan kornea, insomnia, kekeringan hidung, sifat tidur, perubahan rasa.

Cara penyimpanan dan pelupusan IOBRIM

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Untuk mengelakkan pencemaran titis mata simpan di bekas yang sentiasa ditutup. Jangan sentuh hujung penitis untuk mana-mana permukaan. Kandungan adalah steril jika meterai masih utuh. JAUHKAN DARI KANAK-KANAK.

Selepas pembukaan: Simpan di bawah 30°C. Buang kandungan 28 hari selepas membuka botol.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini

dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Jelas, larutan kuning kehijauan

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Brimonidine Tartrate

- Bahan tidak aktif

Benzalkonium chloride, polyvinyl alcohol, sodium chloride, sodium citrate, citric acid, water for injection and sodium hydroxide.

- Nombor MAL

MAL*****

Pengilang

FDC LIMITED,

B-8, MIDC Area, Waluj,
Aurangabad-431136.
INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn Bhd

No 53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur

Tarikh kemaskini RiMUP

10/03/2015