OLODIN

(Olopatadine HCL Opthalmic Solution USP 0.1% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan OLODIN
2. Bagaimana OLODIN berfungsi
3. Sebelum menggunakan OLODIN
4. Cara menggunakan OLODIN
5. Semasa menggunakan OLODIN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan OLODIN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan OLODIN

OLODIN digunakan untuk merawat tanda-tanda dan gejala-gejala konjunktivitis alahan bermusim.
Konjunktivitis alahan. sesetengah bahan (Alergen) seperti debunga, habuk rumah atau bulu haiwan boleh menyebabkan reaksi alahan yang menyebabkan gatal-gatal, kemerahan dan juga pembengkakan permukaan mata anda.
OLODIN adalah ubat untuk rawatan keadaan alahan mata.

Bagaimana OLODIN berfungsi

Ia berfungsi dengan mengurangkan keamatan reaksi alahan.

Sebelum menggunakan OLODIN

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil OLODIN jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil OLODIN jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- *Sebelum menggunakan OLODIN*

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan OLODIN.

Anda perlu mengeluarkan kanta lekap yang berada dalam mata anda sebelum menggunakan OLODIN.

kanak-kanak
Jangan gunakan OLODIN pada kanak-kanak di bawah umur 3 tahun. Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 3 tahun kerana tidak ada data untuk menunjukkan bahawa ia selamat dan bekerja pada kanak-kanak di bawah 3 tahun.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.
Jika anda menggunakan ubat titis mata atau ubat-ubatan lain salap mata, meninggalkan sekurang-kurangnya 5 minit antara setiap perubatan. Salap mata perlu diberikan lepas.

Cara menggunakan OLODIN

- *Berapa banyak harus digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaa ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Bilas mata dengan air suam. Jangan dimasukkan ke dalam mata lebih titis sehingga ia masa untuk dos seterusnya biasa anda.

Semasa menggunakan OLODIN

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan OLODIN.
Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
Jangan berkongsi OLODIN dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika OLODIN menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, OLODIN boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat mereka.
Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Biasa: Sakit kepala, kekurangan tenaga (asthenia), penglihatan kabur, pedih atau rasa pedih, sindrom sejuk, mata kering, objek asing bertanda di mata, lebihan darah dalam saluran membekalkan ke organ atau ke bahagian badan yang lain (*hyperaemia)*, hipersensitiviti, keradangan kornea mata. (*Keratitis)*, bengkak kelopak mata, loya, sakit tekak, pruritus, rinitis, jangkitan sinus dan *taste perversion*

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.ov.my [*Consumers →Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan OLODIN

- *Penyimpanan*

  Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
  Simpan pada suhu tidak melebihi 30ºC.
  Lindungi daripada cahaya.

- *Pelupusan*

  Anda harus buang botol empat minggu selepas anda mula dibuka untuk mengelakkan jangkitan, dan menggunakan botol baru. Tulis tarikh anda membuka ia dalam ruang yang di label botol dan kotak
  Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

  Jelas, larutan tidak berwarna

- *Bahan-bahan kandungan*
  - Bahan aktif

    Olopatadine Hydrochloride

  - Bahan tidak aktif

    Benzalkonium Chloride, Sterile Aqueous.

- *Nombor MAL*
  MAL17025026AZ

Pengilang
FDC limited
B-8 MIDC Industrial Area
Waluj, Aurangabad-431136
Maharashtra, India

Pemegang Pendaftaran Produk
Unimed Sdn Bhd
53, Jalan Tembaga SD 5/2B, Bandar Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur.

Nombor Siri:
NPRA(R2/1)200210/354

Tarikh kemaskini RiMUP
18/09/2020