

CONLAX-10 SUPPOSITORIES

Bisacodyl (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CONLAX-10 Suppositories
2. Bagaimana CONLAX-10 Suppositories berfungsi
3. Sebelum menggunakan CONLAX-10 Suppositories
4. Cara menggunakan CONLAX-10 Suppositories
5. Semasa menggunakan CONLAX-10 Suppositories
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CONLAX-10 Suppositories
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan CONLAX-10 Suppositories

CONLAX-10 Suppositories digunakan untuk individu yang mengalami sembelit. Ia juga digunakan semasa persediaan prosedur diagnostik, sebagai rawatan sebelum dan selepas pembedahan, dan keadaan di mana bantuan penyahtinjaan diperlukan.

CONLAX-10 Suppositories berfungsi

Bisacodyl adalah sejenis julap perangsang. Ia berfungsi dengan meningkatkan pergerakan dalam usus, lalu membantu tinja dikeluarkan.

Sebelum menggunakan CONLAX-10 Suppositories

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan CONLAX-10 Suppositories jika anda alah terhadap bisacodyl atau mana-mana bahan dalam produk ini.

Jangan menggunakan CONLAX-10 Suppositories jika anda mengalami:

- kelumpuhan usus
- usus tersumbat
- kondisi-kondisi abdomen jangka pendek termasuk appendix
- masalah keradangan usus jangka pendek
- kesakitan abdomen yang teruk disertai loya dan muntah
- koyakan atau rekahan atau ulser pada laluan dubur

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan menggunakan CONLAX-10 Suppositories jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan menggunakan CONLAX-10 Suppositories jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat, atau ubat lain yang serupa atau sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan pada hujung risalah ini.

Seperti ubatan lain, jangan menggunakan CONLAX-10 Suppositories semasa mengandung, terutamanya dalam tiga bulan pertama, dan semasa menyusu, melainkan kebbaikannya melebihi sebarang risiko yang mungkin terjadi, dan hanya menggunakan CONLAX-10 atas nasihat doktor.

- Sebelum menggunakan CONLAX-10 Suppositories

Jangan menggunakan CONLAX-10 Suppositories melebihi 5 hari tanpa siasatan terhadap punca sembelit. Penggunaan jangka panjang boleh menyebabkan ketidakseimbangan cecair dan elektrolit dalam badan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor khususnya jika anda ada mengambil:

- Diuretik atau ubat lawas kencing digunakan untuk tekanan darah tinggi dan lain-lain keadaan
- Adreno-corticosteroids

Cara menggunakan CONLAX-10 Suppositories

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada

label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Rawatan sembelit jangka pendek:

Dewasa dan kanak-kanak 10 ke atas: Sebij CONLAX-10 Suppositories sehari.

Kanak-kanak 10 tahun ke bawah yang mengalami sembelit jangka panjang atau sembelit berterusan mesti dirawat dibawah pantauan doktor.

Untuk persediaan prosedur diagnostik dan rawatan sebelum dan selepas pembedahan:

Mesti digunakan hanya dibawah pantauan doktor.

Dewasa dan kanak-kanak 10 ke atas: Sebij CONLAX-10 Suppositories sehari.

Perlu digunakan pada keesokkan hari untuk melengkapkan pengosongan usus.

Cara memasukkan supositori

- Kosongkan usus anda sebelum memasukkan supositori.
- Basuh tangan anda.

- Keluarkan strip supositori dan koyakkan di sepanjang tebuk.



- Kemudian keluarkan supositori dari bungkusan plastik dengan menarik semula bahagian yang longgar.



- Berbaring dengan sebelah lutut di angkat ke dada anda.

- Tolak bahagian hujung supositori dengan perlahan-lahan ke dalam laluan belakang (rektum) dengan jari anda. Tolak supositori sedalam mungkin seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah.

- Turunkan kaki anda dan, jika boleh, jangan bergerak selama beberapa minit.

- Jika anda rasa seperti anda perlu untuk menolak supositori keluar, cuba menghalangnya dengan berbaring dan tidak bergerak dengan menekan punggung anda. Penting untuk memastikan supositori berada dalam rektum dan membiarkannya menjadi

cair dan ubat dapat diserap. Menolak supositori jauh ke dalam rektum dengan menggunakan jari anda akan membantu mengurangkan perasaan ini.

- Basuh tangan anda.

- **Bila perlu digunakan**

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- **Berapa lama perlu digunakan**

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- **Jika terlupa menggunakan**

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Gunakan dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk menggunakan dos seterusnya pada masa biasa. Jangan menggunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- **Jika terguna berlebihan (terlebih dos)**

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika menggunakan dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Menggunakan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan cirit-birit, kekejangan otot perut dan kehilangan cecair badan dan lain-lain elektrolit yang signifikan.

Semasa menggunakan CONLAX-10 Suppositories

- **Perkara yang perlu dilakukan**

Gunakan ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang

merawat anda bahawa anda sedang menggunakan CONLAX-10 Suppositories.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- **Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi CONLAX-10 Suppositories dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- **Perkara yang perlu diberi perhatian**

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, CONLAX-10 Suppositories boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Penggunaan CONLAX-10 Suppositories boleh menyebabkan:

- keradangan rectum
- ketidakselesaan abdomen seperti kolik atau kekejangan pada perut
- cirit-birit dengan pengunaan jangka panjang
- tindakbalas alahan termasuk keradangan lapisan bawah kulit

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan CONLAX-10 Suppositories

- **Penyimpanan**

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di tempat yang kering dibawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

- **Pelupusan**

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- **Rupa dan warna produk**

Supositori legap berbentuk peluru berwarna putih.

- **Bahan-bahan kandungan**

- Bahan aktif
Bisacodyl BP 10mg

- Bahan tidak aktif
Witsepsol H15

- **Nombor MAL**

MAL17075024XZ

Pengilang

Bliss GVS Pharma Ltd
Plot No. 11, survey No. 38/1, Dewan Udyog, Nagar, Aliyali Village, Palghar, Dist. Thane, Maharashtra, 401404, INDIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn. Bhd.
53, Jalan Tembaga SD5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/09/2018