

MOSI (Moxifloxacin Ophthalmic Solution 0.5% w/v)

Moxifloxacin HCl (0.5% w/v)

Apa yang ada dalam risalah ini

1. Apa kegunaan **MOSI**
2. Bagaimana **MOSI** berfungsi
3. Sebelum mengambil **MOSI**
4. Cara mengguna **MOSI**
5. Semasa mengambil
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **MOSI**
8. Penerangan produk
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini

Apa Kegunaan **MOSI**

MOSI ialah sejenis ubat steril untuk rawatan konjunktivitis bakteria iaitu sejenis jangkitan mata untuk pesakit usia satu tahun dan ke atas.

Bagaimana **MOSI** berfungsi

MOSI mengandungi Moxifloxacin yang merupakan agen antibakteria yang sering digunakan untuk pelbagai organisma gram-positif dan gram-negatif.

Sebelum mengambil **MOSI**

Bila Tidak Boleh Mengambil

- Jika anda rasa anda mungkin alah kepada Moxifloxacin atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini.
- Jika anda tahu anda akan memandu, mengguna jentera, atau melakukan apa-apa aktiviti lain yang memerlukan penglihatan jelas.

Kehamilan dan Penyusuan Bayi

Jangan mengambil **MOSI** jika anda mengandung, cuba untuk mengandung atau berfikir anda mungkin mengandung.

Jangan mengambil **MOSI** jika anda sedang menyusukan bayi. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

Sebelum Mula Ambil

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda memakai kanta sentuh.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda memohon apa-apa jenis titisan mata atau salap mata sebelum anda mula menggunakan ubat ini. Ubat anda boleh menjejaskan fungsi mereka dan boleh mengubah keberkesanannya.

Sila beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan termasuk produk herba atau apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara Mengguna **MOSI**

Berapa Banyak Boleh Diambil

Titiskan satu titisan ke dalam mata yang terjejas tiga kali sehari selama tujuh hari.

Jika anda menggunakan ubat mata yang lain, tunggu sekurang-kurangnya lima minit sebelum menggunakan ubat-ubat lain.

Sentiasa gunakan **MOSI** seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan tersenarai dalam label, tanya doktor atau ahli farmasi untuk bantuan.

Cara-cara Mengguna:

(Sila rujuk kepada pictogram sertai di hujung risalah ini)

- Basuh tangan anda.
- Elakkan daripada menyentuh mata atau mana-mana permukaan lain dengan hujung penitis.
- Keluarkan kanta sentuh sebelum menggunakan ubat ini.
- Goncangkan ubat secara perlahan-lahan untuk memastikan ubat itu adalah sebatii.
- Dongakkan kepala ke belakang, tengadahkan dan tarik ke bawah kelopak mata lebih rendah untuk membuat kantung mata.
- Letakkan hujung penitis di atas mata dan perlahan-lahan memerah botol ubat untuk menitikkan ubat ke dalam mata.
- Lihat ke bawah dan perlahan-lahan menutup mata anda selama 1 hingga 2 minit. Tekan jari anda dari sudut di bahagian dalam mata yang tertutup, dan tahan selama 1 minit.
- Cuba tidak berkelip dan menggosok mata anda.
- Ulangi langkah-langkah di atas untuk mata yang sebelah lagi jika perlu.
- Gantikan dan ketatkan penutup dengan segera selepas siap digunakan.

Berhati-hati tidak menyentuh hujung penitis di mana-mana permukaan,

termasuk mata dan tangan untuk mengelakkan pencemaran. Jangan gunakan ubat titisan mata yang mempunyai partikel di dalamnya.

Bila Mengguna Ubat

Guna seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa Lama Mengambil Ubat

Teruskan mengambil **MOSI** seperti yang dicadangkan oleh doktor anda.

Jika Anda Lupa Mengambil

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang anda perlu lakukan jika anda lupa mengambil ubat.

Mengambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga masa mengambil ubat itu dan melangkau dos yang tertinggal. Jangan ambil dos yang berganda untuk membuat dos yang tertinggal.

Jika Anda Mengambil Terlalu Banyak (Berlebihan)

Jika anda menggunakan **MOSI** secara berlebihan. Bilas mata anda dengan air secukupnya. Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat anda, jika anda berfikir anda atau sesiapa sahaja yang mengambil terlalu banyak ubat ini. Walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan tetapi anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa Anda Mengambilnya

Perkara yang Anda Perlu lakukan

Ambil ubat dengan tepat seperti doktor anda telah memberitahu anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda tentang anda sedang mengambil **MOSI**.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang Anda Tidak Boleh Lakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

MOSI (Moxifloxacin Ophthalmic Solution 0.5% w/v)

Moxifloxacin HCl (0.5% w/v)

Jangan mengambil apa-apa ubat-ubatan baru tanpa mengambil nasihat daripada doktor anda.

Jangan berikan **MOSI** kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama dengan anda.

- Perkara yang Perlu Berhati-hati

Kehamilan dan Penyusuan Bayi

Ubat ini boleh digunakan hanya apabila amat diperlukan semasa mengandung.

Sila gunakan ubat ini dengan penuh perhatian semasa menyusu bayi.

Memandu dan Menggunakan

Mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Ubat yang boleh membuat penglihatan anda kabur buat sementara atau tidak stabil. Jangan memandu, menggunakan mesin, atau melakukan apa-apa aktiviti yang memerlukan penglihatan yang jelas sehingga anda pasti anda boleh melakukan aktiviti dengan selamat.

Kesan-Kesan Sampingan

Seperti ubat-ubatan yang lain, **MOSI** boleh memberi kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mendapatkannya. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan yang berikut:

- Mata rasa kepanasan/rasa pedih
- Sakit kepala
- Keradangan kornea
- Kegatalan mata
- Kemerahan mata
- Mata berdarah
- Keradangan di belakang tekak.

Berhenti menggunakan ubat ini jika anda mengalami kealahan termasuk ruam, bengkak, pening, masalah pernafasan selepas menggunakan ubat ini. Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami kealahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web

npra.moh.gov.my (Consumers Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Penyimpanan dan Pelupusan MOSI

Penyimpanan

Jauhkan ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dalam bekas yang ketat. Letak dalam suhu di bawah 30°C.

Selepas pembukaan pertama: Simpan dalam bekas yang ketat dan simpan di bawah suhu 30°C.

Buang selepas 28 hari botol dibuka.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.


Penerangan Produk

Rupa dan Warna Produk

Setiap botol mengandungi 5ml **MOSI**.

Ubat anda adalah jelas, berwarna kuning, tidak mengandungi partikel dan tidak berbau.

Cara-cara mengguna:



Bahan-bahan Kandungan

Bahan aktif

0.545% w/v Moxifloxacin Hydrochloride setara dengan Moxifloxacin 0.5%w/v

Bahan tidak aktif

Disodium Edetate, Sodium Chloride, Boric Acid, Sodium Hydrochloride, dan Water for Injection.

Nombor MAL:

MAL18026179AZ

Pengilang

FDC Limited
Plot No B-8, M.I.D.C Industrial Area,
Waluj- 431136,
Dist: Aurangabad,
INDIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

UNIMED SDN BHD
53, JalanTembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh Kemaskini

17/03/2020

Nombor Siri

NPRA(R2/1)190429/121