

CHLORHEX ANTISEPTIC SOLUTION

Chlorhexidine Gluconate (4% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **ChlorHEX Antiseptic Solution**
2. Bagaimana **ChlorHEX Antiseptic Solution** berfungsi
3. Sebelum menggunakan **ChlorHEX Antiseptic Solution**
4. Cara menggunakan **ChlorHEX Antiseptic Solution**
5. Semasa menggunakan **ChlorHEX Antiseptic Solution**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **ChlorHEX Antiseptic Solution**
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan **ChlorHEX Antiseptic Solution**

ChlorHEX Antiseptic Solution digunakan untuk membersihkan kulit secara umum.

Bagaimana **ChlorHEX Antiseptic Solution berfungsi** **ChlorHEX Antiseptic Solution** mempunyai sifat antibakteria. Ia berkesan melawan pelbagai jenis bakteria, sesetengah virus dan juga kulat.

Sebelum menggunakan **ChlorHEX Antiseptic Solution**

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan **ChlorHEX Antiseptic Solution** jika anda alah (hipersensitif) kepada chlorhexidine gluconate atau mana-mana bahan lain yang disenaraikan di bahagian Maklumat Lanjut.

- Sebelum mula menggunakan **ChlorHEX Antiseptic Solution**

Beritahu ahli kesihatan profesional anda jika anda mengalami

kecederaan pada kepala, tulang belakang atau gegendang telinga yang berlubang. **Chlorhexidine** boleh menyebabkan kehilangan pendengaran atau pekak sekiranya memasuki gegendang telinga yang berlubang.

- Jika menggunakan produk lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang produk lain, termasuk yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan **ChlorHEX Antiseptic Solution**

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk Pembersihan Kulit secara Umum

Bilas kawasan yang ingin dibersihkan dengan air. Sapukan **ChlorHEX Antiseptic Solution** dengan jumlah yang minimal untuk menutup kulit. Basuh dan bilas dengan air.

- Bila perlu digunakan

Guna bila diperlukan

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan **ChlorHEX Antiseptic Solution** mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Tidak berkaitan

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya tertelan, minum beberapa gelas air dan segera berjumpa doktor.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan

hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan **ChlorHEX Antiseptic Solution**

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna **ChlorHEX Antiseptic Solution** mengikut arahan doktor .

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan cairkan. Gunakan dengan kepekatan asal.

ChlorHEX Antiseptic Solution tidak boleh digunakan untuk membersihkan kulit atau luka secara rutin. Ia juga tidak boleh digunakan berulang kali untuk pembersihan kulit secara umum pada kawasan badan yang besar kecuali untuk mengurangkan jangkitan bakteria pada kulit.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

ChlorHEX Antiseptic Solution bertujuan untuk KEGUNAAN LUAR SAHAJA.

1. Elakkan bersentuhan dengan membran mukus seperti mata, telinga dan mulut.
2. Jangan gunakan pada muka dan kepala sebagai persediaan kulit sebelum pembedahan. Penyalahgunaan produk ini telah dilaporkan boleh menyebabkan kecederaan mata yang serius dan kekal apabila **ChlorHEX Antiseptic Solution** masuk dan berada di dalam mata semasa proses pembedahan. Sekiranya terkena pada kawasan tersebut, segera bilas dengan air.

CHLORHEX ANTISEPTIC SOLUTION

Chlorhexidine Gluconate (4% w/v)

Kesan-kesan sampingan

ChlorHEX Antiseptic Solution boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

ChlorHEX Antiseptic Solution mengandungi chlorhexidine. Maklumkan kepada ahli kesihatan profesional anda jika anda mempunyai alergi terhadap chlorhexidine.

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, gatal, bengkak, kesukaran bernafas, pening kepala atau degupan jantung yang laju.

Segera berjumpa doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami kesan sampingan setelah menggunakannya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan ChlorHEX Antiseptic Solution

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Jauhkan dari matahari.

Jauhkan produk daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Sila rujuk kepada ahli kesihatan profesional anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan produk yang

tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

ChlorHEX Antiseptic Solution adalah cecair yang jernih sehingga sedikit keruh, berwarna merah dengan haruman lavender. ChlorHEX Antiseptic Solution dibekalkan dalam botol plastik 500ml, 540ml, 800ml dan 1000ml.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Chlorhexidine Gluconate 4%

- Bahan tidak aktif

Ponceau 4R colour, Glucono delta lactone, Fragrance, Nonyl phenol ethoxylated, Lauryl dimethylamine oxide, Isopropyl alcohol, Purified water.

- Nombor MAL:

MAL05121215XCZ

Pengilang

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang,
Selangor Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Steriline Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang,
Selangor Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/06/2021

Nombor Siri

NPRA (R4/1) 020621/00037