

RELISPRAY PAIN RELIEF SPRAY®

Cinnamon oil / Camphor / Clove Oil / Eucalyptus Oil / Menthol / Methyl Salicylate / Turpentine oil (0.5% w/w / 10 % w/w / 1% w/w / 6% w/w / 4% w/w / 20%w/w / 10%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Relispray
2. Bagaimana Relispray berfungsi
3. Sebelum menggunakan Relispray
4. Cara menggunakan Relispray
5. Semasa menggunakan Relispray
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Relispray
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Relispray

Relispray digunakan secara topikal untuk memberikan kelegaan sementara sakit otot dan sendi.

Bagaimana Relispray berfungsi

Ubat ini mengandungi bahan aktif yang bertindak pada hujung saraf lalu melegakan kesakitan. Ia juga melebarkan saluran darah yang memberikan rasa sejuk dan diikuti dengan rasa kebas.

Sebelum menggunakan Relispray

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan gunakan ubat ini jika anda alah kepada bahan aktif atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini seperti disenaraikan dalam (Maklumat Lanjut).
- Jangan gunakan pada luka
- Jangan gunakan pada bayi di bawah umur 2 tahun.

- Sebelum menggunakan Relispray

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Produk ini mengandungi *methyl salicylate* dan apabila disapu pada kulit, boleh diserap ke dalam darah. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil warfarin, kerana

penggunaan berlebihan pada kulit boleh meningkatkan risiko pendarahan.

Cara menggunakan Relispray

- Berapa banyak perlu digunakan

Goncang sebelum setiap penggunaan. Semburkan satu lapisan yang nipis pada bahagian yang sakit. Tutup kawasan semburan dengan kain, untuk meningkatkan keberkesanan

- Bila perlu digunakan

Gunakan 3-4 kali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Gunakan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan penggunaan mengikut jadual seperti biasa. Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Keracunan *salicylate* boleh berlaku selepas pengambilan secara tidak sengaja atau penggunaan topikal *methyl salicylate* dalam keadaan tertentu.

Semasa menggunakan Relispray

- Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi, dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Relispray.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini. Hanya gunakan ubat ini untuk melegakan kesakitan apabila perlu.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Relispray kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika kemerahan kulit berlaku atau kerengsaan berterusan maka hentikan penggunaan.

Adalah merbahaya untuk mrnggunakan produk yang mengandungi camphor ke dalam lubang hidung kanak-kanak. Walaupun sedikit amaun produk yang digunakan dengan cara tersebut boleh menyebabkan pengsan dengan segera. Perhatian harus diberikan semasa merawat kanak-kanak.

Berhati-hati semasa menyembur Relispray untuk mengelakkan semburan terkena kulit yang sangat sensitif seperti kelopak mata, bibir dan lain-lain. Jangan kena pada mata atau luka

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Relispray boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan secepat mungkin jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Ubat ini boleh menyebabkan:

1. Kerengsaan kulit
2. Alahan kulit
3. Kulit menjadi sensitif terhadap cahaya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Relispray

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

Gas petroleum cecair (propelan) sangat mudah terbakar. Oleh itu, jangan membekukannya. Elakkan dari menyimpan di bawah sinaran matahari atau suhu yang panas.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada bungkusan selepas 'EXP'. Tarikh luput ini merujuk kepada hari terakhir dalam bulan tersebut.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Penyembur cecair jernih dan tidak berwarna dengan bau tertentu, diisi dalam bekas aerosol aluminium serta berinjak.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- *Cinnamon oil*
- *Camphor*
- *Clove Oil*
- *Eucalyptus Oil*
- *Menthol*
- *Methyl Salicylate*
- *Turpentine oil*

- Bahan-bahan tidak aktif

- *Propylene glycol*
- *Liquefied petroleum gas*
- *Isopropyl alcohol*

- Nombor MAL:
MAL12020030X

Pengilang

Midas Care Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
B-16, MIDC, Waluj, 431136
India

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan teratai,
5 1/2 Mile off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini

27/02/2023

Nombor siri

NPRA (R4/1) 050123/00001