

ANTI HIST SYRUP

Chlorpheniramine maleate (4mg/5ml)

Apakah di dalam risalah ini:

1. Apakah kegunaan Antihist Syrup
2. Bagaimana Antihist Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Antihist Syrup
4. Cara menggunakan Antihist Syrup
5. Semasa menggunakan Antihist Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Antihist Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Antihist Syrup

Antihist Syrup digunakan untuk merawat masalah yang disebabkan oleh alahan, seperti demam alergi, kulit gatal, bengkak, alahan makanan, tindak balas terhadap ubat atau gigitan serangga.

Bagaimana Antihist Syrup berfungsi

Antihist Syrup mengandungi bahan aktif chlorpheniramine maleate. Chlorpheniramine adalah antihistamin, yang menyekat tindakan histamin dalam badan dan melegakan bengkak, gatal-gatal, penghasilan lendir, dan gejala alergi yang lain.

Sebelum mengambil Antihist Syrup

Anda tidak boleh memberikan ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun. Bagi kanak-kanak berusia antara 2 hingga 6 tahun, ubat ini perlu digunakan dengan berhati-hati dan mengikut nasihat yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap chlorpheniramine atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)
- anda sedang mengambil, atau telah mengambil dalam dua minggu yang lalu, ubat untuk kemurungan yang dipanggil Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs).

-Sebelum mula mengambil

Mengandung dan menyusu

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Chlorpheniramine mungkin dirembeskan ke dalam susu ibu dan memberi kesan kepada bayi. Doktor anda akan membincangkan kebaikan dan keburukan menyusukan anak semasa anda sedang mengambil Antihist Syrup.

-Mengambil ubat-ubatan lain

Sebelum anda mengambil ubat ini, pastikan bahawa anda memberitahu ahli farmasi atau doktor anda tentang sebarang ubat-ubatan lain yang anda mungkin gunakan pada masa yang sama, terutamanya seperti yang berikut:

- ubat untuk membantu anda berehat (hipnotik atau *anxiolytics*)
- Phenytoin ((ubat sawan))

Jika anda tidak pasti tentang interaksi dengan mana-mana ubat-ubatan lain, rujuk kepada ahli farmasi anda. Ini termasuk ubat-ubatan yang ditetapkan oleh doktor dan ubat yang anda telah beli untuk anak anda, termasuk ubat-ubat herba dan homeopati.

Cara menggunakan Antihist Syrup

-Berapa banyak harus diambil

Dewasa, dan kanak-kanak berumur lebih dari 12 tahun:

5 ml, perlu diambil tiga atau empat kali sehari

Kanak-kanak 6-12 tahun:

2.5 hingga 5 ml, perlu diambil tiga atau empat kali sehari

Kanak-kanak 2-5 tahun:

1.25 hingga 2.5 ml, perlu diambil tiga atau empat kali sehari

-Bila perlu diambil

Untuk diambil 3 atau 4 kali sehari seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Gunakan Antihist Syrup untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor. Jika simptom tidak hilang, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau orang lain mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh menyebabkan anda mengalami sawan, kesukaran bernafas dan tekanan darah rendah.

Semasa menggunakan Antihist Syrup

-Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Antihist Syrup

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

ANTI HIST SYRUP

Chlorpheniramine maleate (4mg/5ml)

Jangan gunakan sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Antihist Syrup kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mempunyai intolerans kepada gula, jangan ambil ubat ini, melainkan jika doktor anda membenarkan anda untuk berbuat demikian. Ubat ini mengandungi gula proses.

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menyebabkan rasa mengantuk. Jika terjejas, jangan memandu atau mengendalikan mesin.

Jangan ambil ubat ini bersama alkohol atau ubat penenang lain.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Antihist Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat kesan tersebut.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang mungkin termasuk:

- mengantuk
- pening

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Antihist Syrup

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C
Pastikan bekas tertutup rapat

Lindungi daripada cahaya

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui sisa air atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair jernih berwarna jingga

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
chlorpheniramine maleate

- Bahan tidak aktif
raspberry flavor, sunset yellow lake, refined sugar carmoisine lake, Methylparaben, Chloroform spirit.

-Nombor MAL

MAL19861155AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn Bhd
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP

20/12/2023

Nombor siri

NPRA(R4/1)181223/00092