

MICOSTEN CREAM

Miconazole nitrate (2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Micosten Cream
2. Bagaimana Micosten Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Micosten Cream
4. Cara menggunakan Micosten Cream
5. Semasa menggunakan Micosten Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Micosten Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Micosten Cream

Micosten Cream digunakan untuk merawat jangkitan kulit yang disebabkan oleh kulat dan yis tertentu.

Bagaimana Micosten Cream berfungsi

Micosten Cream mengandungi bahan aktif miconazole, iaitu antikulat. Ia berfungsi dengan menghalang pertumbuhan kulat dan seterusnya membunuh kulat.

Sebelum menggunakan Micosten Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Micosten Cream jika:

- anda alah kepada miconazole atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum mula menggunakan

Mengandung dan menyusukan anak
Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor sekiranya anda :

- sedang mengambil warfarin (ubat cair darah)
- mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi,

pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Micosten Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan krim ke kawasan kulit yang dijangkiti sehingga ia menyerap sepenuhnya.

- Bila perlu digunakan

Sapukan ubat pada kawasan yang terkena jangkitan dua kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan pada waktu malam.

- Berapa lama perlu digunakan

Sapukan Micosten Cream untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor, sehingga semua simptom jangkitan hilang.

Tempoh rawatan adalah selama lebih kurang 2-5 minggu. Selepas semua jangkitan telah hilang, teruskan rawatan selama 10 hari tambahan untuk mengelakkan jangkitan daripada berulang.

Jika kerengsaan berlaku, atau keadaan tidak bertambah baik dalam masa 4 minggu, hentikan rawatan dan dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau sesiapa sahaja mungkin telah menggunakan terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan yang berlebihan boleh mengakibatkan kerengsaan kulit dan hipersensitiviti yang biasanya hilang

selepas pemberhentian terapi.

Semasa menggunakan Micosten Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Micosten Cream

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan Micosten Cream kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda

Jangan gunakan pembalut kedap udara/air bersama krim ini, kecuali diarahkan berbuat demikian oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan terkena pada mata.

Jika disapu pada kawasan lipatan kulit, sapu nipis dan urut dengan perlahan untuk mengelakkan kulit daripada tercedera.

Untuk mengelakkan jangkitan daripada berulang, gunakan krim mengikut tempoh yang disyorkan oleh doktor.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Micosten Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Lawati doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

MICOSTEN CREAM

Miconazole nitrate (2% w/w)

Kesan sampingan termasuk:

- kerengsaan kulit
- Rasa terbakar
- *Maceration* (kulit menjadi nipis dan mudah pecah/luka)
- alahan kulit (gatal, atau kemerahan)
- Reaksi kulit lain yang terjadi selepas memulakan rawatan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Micosten Cream

- Penyimpanan

Simpan di tempat kering yang dingin di bawah suhu 30°C.

Pastikan bekas ditutup rapat. Lindungi daripada cahaya dan pembekuan. Untuk kegunaan luaran sahaja.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air kumbahan atau sisa buangan isi rumah. Sila rujuk ahli farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak digunakan dengan betul. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim putih atau putih pudar.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Miconazole Nitrate

- Bahan tidak aktif
- Cetostearyl alcohol
Cetomacrogol
Propyl paraben
White soft paraffin
Liquid paraffin
Methyl paraben
Purified water

- Nombor MAL

MAL19992124AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

24/07/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)210624/00078