FENOLIP CAPSULE 300MG

Fenofibrate (300mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fenolip
2. Bagaimana Fenolip berfungsi
3. Sebelum mengambil Fenolip
4. Cara menggunakan Fenolip
5. Semasa menggunakan Fenolip
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Fenolip
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Fenolip

Fenofibrate diindikasikan untuk hiperlipidemia jenis IIa, IIb, III, IV dan V.(kehadiran lemak yang berlebihan dalam darah)

Bagaimana Fenolip berfungsi

Fenofibrate mengurangkan kandungan lipid/lemak dan trigliserida (sejenis lemak) yang tinggi dalam darah. Ia berguna dalam rawatan hiperlipidemia teruk di mana kawalan pemakanan sahaja tidak dapat membantu.

Sebelum mengambil Fenolip

- *Bila tidak boleh mengambil*

Jangan mengambil Fenolip jika
• Anda alah (hipersensitif) dengan fenofibrate, atau mana-mana bahan-bahan lain Fenolip.
• Anda mengalami penyakit hati atau buah pinggang atau pundi hempedu.

- *Sebelum mula mengambil*

Beritahu doktor anda sebelum anda mula mengambil ubat ini:
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang
- Jika anda mempunyai diabetes, terutamanya diabetes jenis 2 yang tidak dikawal dengan baik.
- Jika anda mempunyai masalah hati.
- Anda mengambil ubat-ubatan lain.
- Jika anda atau keluarga anda mempunyai masalah otot.
- Jika anda lebih daripada 70 tahun

Jika mengambil ubat-ubat lain
Sila beritahu doktor anda jika anda mengambil atau telah baru-baru ini mengambil apa-apa ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi. Khususnya sila memberitahu doktor anda jika anda sudah mengambil:
- Antikoagulan untuk menipis darah anda (contohnya, *warfarin*).
- Ubat-ubatan lain untuk mengawal tahap lipid (lemak) dalam darah (contohnya, ubat yang dikenali sebagai "statin" atau "fibrates"). Mengambil "statin" (contohnya, *simvastatin*, *atorvastatin*) pada masa yang sama dengan Fenolip boleh meningkatkan risiko masalah otot.
- Ejen Oral antidiabetik seperti glitazone

Cara menggunakan Fenolip

- *Berapa banyak harus digunakan*

Dos permulaan fenofibrate yang disarankan adalah 300mg setiap hari. Bagi kanak-kanak tahap dos ialah 5 mg setiap kg berat badan sehari. Sekatan pemakanan perlu diteruskan.

- *Bila perlu digunakan*

Telan seluruh kapsul dengan segelas air. Ia adalah penting untuk mengambil kapsul dengan makanan, kerana ia tidak akan berfungsi dengan sebaiknya jika perut anda kosong.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Rawatan perlu dihentikan jika tindakbalas yang sewajarnya tidak tercapai dalam masa 3 bulan.

- *Jika terlupa menggunakan*

Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, ambil sebaik sahaja anda ingat. Walau bagaimanapun, jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal itu. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Jika anda mengesyaki pengambilan dos yang berlebihan, hubungi jabatan kecemasan hospital yang terdekat atau beritahu doktor anda dengan segera.

Semasa menggunakan Fenolip

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Di samping mengambil ubat ini, doktor mungkin menukar diet anda kepada yang rendah lemak, gula, dan kolesterol. Sila ikut nasihat doktor anda tentang mana-mana diet khas**.**

- *Perkara yang tidak boleh dlakukan*

Jangan mengambil kapsul jika perut anda kosong kerana ia tidak akan berfungsi dengan baik.

Jangan gunakan Fenolip sekiranya anda hamil atau sedang menyusu . Sila maklumkan kepada doktor jika anda hamil

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

FENOLIP CAPSULE 300MG

Fenofibrate (300mg)

Semak dengan doktor anda dengan segera jika anda mempunyai sakit yang tidak dapat dijelaskan pada otot, kelembutan, atau kelemahan, terutamanya jika anda juga mempunyai keletihan luar biasa atau demam. Ini boleh disebabkan oleh gejala masalah otot serius dipanggil miopati. Berhenti menggunakan ubat ini dan periksa dengan doktor anda dengan segera jika anda mempunyai air kencing berwarna gelap, cirit-birit, demam, kekejangan otot atau spasma otot, sakit otot atau ketegangan, atau berasa sangat letih atau lemah. Ini mungkin merupakan gejala masalah otot serius yang dipanggil rhabdomiolisis. Rhabdomiolisi boleh menyebabkan masalah buah pinggang

Kesan-kesan sampingan
Seperti semua ubat-ubatan, Fenolip boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mendapat . Kesan-kesan sampingan yang paling biasa ialah sakit perut, loya, muntah-muntah, cirit-birit dan angin (kembung perut).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Fenolip

- *Penyimpanan*

Simpan di tempat yang kering dan sejuk di bawah 30°C. Pastikan bekas tertutup rapat. Lindungi daripada cahaya.

- *Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Kapsul gelatin keras berwarna putih legap.

- *Bahan-bahan kandungan*
  -Bahan aktif

  Fenofibrate

  -Bahan tidak aktif

  Sodium starch glycolate, Corn starch, Lactose, Colloidal silicone dioxide and Magnesium stearate.

- **Nombor MAL:**
  MAL19992757AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor

Tarikh Kemaskini RiMUP
19/06/2015

Nombor Siri
BPFK(R4/1)240315/00047