

VICIDE CREAM

Acyclovir (5% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Vicide Cream.
2. Bagaimana Vicide Cream berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Vicide Cream.
4. Cara menggunakan Vicide Cream.
5. Semasa menggunakan Vicide Cream.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Vicide Cream.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Vicide Cream

Vicide Cream digunakan sebagai rawatan topikal bagi jangkitan virus pada kulit (herpes), termasuk di kawasan kemaluan.

Bagaimana Vicide Cream berfungsi

Vicide Cream mengandungi bahan aktif acyclovir, iaitu ubat antiviral. Ia menghalang pertumbuhan virus dan menyembuhkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Vicide Cream

– Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Vicide Cream jika:

- anda alah kepada acyclovir atau mana-mana bahan lain ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut)

– Sebelum menggunakan Vicide Cream

Kehamilan dan menyusukan anak

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk mengandung atau menyusu sebelum menggunakan sebarang ubat.

– Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil probenecid (digunakan untuk merawat gout) sebelum menggunakan krim ini.

Cara menggunakan Vicide Cream

– Berapa banyak harus digunakan

Digunakan secara topikal.

Sapukan ke kawasan yang dijangkiti

Rawatan harus dimulakan secepat mungkin apabila ruam mula muncul.

– Bila perlu digunakan

Sapukan Vicide Cream setiap 5 hingga 6 kali atau setiap 4 jam atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

– Berapa lama perlu digunakan

Sapukan krim selama 5 hingga 10 hari atau untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor anda.

– Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

– Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Menggunakan terlalu banyak krim ini boleh menyebabkan kerengsaan kulit dan hipersensitiviti

Semasa menggunakan Vicide Cream

– Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Vicide Cream.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

– Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor anda.
- Jangan berikan Vicide Cream kepada orang lain, walaupun mereka

mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

– Perkara yang perlu diberiperhatian

Jangan sapu krim ini pada kawasan membran mukosa (bahagian berwarna kemerahan) seperti di dalam mulut dan hidung, ke dalam mata dan di dalam faraj.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Vicide Cream boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- Kesakitan ringan, rasa terbakar atau pedih sementara apabila digunakan.
- Kering kulit
- Kemerahan kulit
- Kegatalan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Vicide Cream

– Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin di bawah suhu 30°C.

Lindungi dari cahaya dan pembekuan.

Pastikan bekas ubat ditutup rapat.

– Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

– Rupa dan warna produk

Krim putih atau putih pudar.

– Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:

Setiap gm krim mengandungi acyclovir 50mg

-Bahan Tidak Aktif:

Cetostearyl alcohol, cetomacrogol, white soft paraffin, glycerin, propylene glycol

VICIDE CREAM

Acyclovir (5% w/w)

,liquid paraffin, methyl paraben, propyl paraben dan purified water.

– Nombor MAL
MAL19992122AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

10/07/2024

Nombor siri

NPRA(R4/1)020724/00082