

CORIFED DM SYRUP

Tripolidine Hydrochloride/ Pseudoephedrine Hydrochloride / Dextromethorphan Hydrobromide
(1.25mg/30mg/10mg per 5ml)

Apakah di dalam risalah ini:

1. Apakah kegunaan Corifed DM
2. Bagaimana Corifed DM berfungsi
3. Sebelum mengambil Corifed DM
4. Cara menggunakan Corifed DM
5. Semasa menggunakan Corifed DM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Corifed DM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan Corifed DM

Corifed DM Syrup digunakan untuk melegakan batuk tidak berkahak yang disertai dengan tersumbat pada saluran pernafasan atas, termasuk tersumbat yang berkaitan dengan reaksi alahan.

Bagaimana Corifed DM berfungsi

Sirap Corifed DM syrup mengandungi tiga bahan aktif, tripolidine, pseudoephedrine dan dextromethorphan.

Tripolidine ialah sejenis antihistamin yang menghalang kesan histamin, dan mengurangkan bersin, hidung berair, mata berair, kahak dan gejala alahan yang lain.

Pseudoephedrine adalah dekonjestan dengan melegakan hidung bengkak dan tersumbat.

Dextromethorphan penahan batuk. Ia membantu mengurangkan refleks batuk di dalam otak.

Sebelum mengambil Corifed DM

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika anda:

- Alah kepada pseudoephedrine, tripolidine, atau dextromethorphan atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- Mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi atau penyakit jantung yang teruk

- mengambil atau telah mengambil dalam dua minggu lepas, ubat jenis *monoamine oxidase inhibitors* (MAOIs) untuk rawatan kemurungan
- mempunyai batuk, disertai dengan banyak kahak atau batuk yang disebabkan oleh penyakit asma.

Sebelum menggunakan Corifed DM

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda:

- Jika anda mengalami masalah hati atau buah pinggang
- Jika anda mempunyai masalah pernafasan
- Jika anda mempunyai penyakit kencing manis.
- Jika anda mempunyai peningkatan tekanan dalam mata
- Jika anda mempunyai tiroid terlampau aktif
- Jika anda mengalami pembesaran prostat

Apabila digunakan untuk rawatan batuk dan selsema:

(a) Tidak boleh digunakan jika anak anda berumur di bawah 2 tahun

(b) Untuk digunakan dengan berhati-hati di bawah nasihat doktor atau ahli farmasi jika anak anda berumur 2 hingga 6 tahun

Kehamilan dan penyusuan

Jika anda hamil, merancang untuk hamil atau merasakan anda mungkin hamil, berbincang dengan doktor anda sebelum memulakan sebarang ubat.

Corifed DM Syrup hanya boleh digunakan semasa kehamilan jika manfaatnya melebihi risiko kepada janin.

Sejumlah kecil Corifed DM Syrup dirembeskan ke dalam susu ibu dan boleh menjejaskan bayi anda. Doktor anda akan membincangkan risiko dan faedah penyusuan susu ibu semasa anda mengambil Corifed DM Syrup.

- Mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk

apa-apa ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- ubat untuk menurunkan tekanan darah tinggi termasuk bethanidine
- *Monoamine Oxidase Inhibitors* (MAOIs) contohnya furazolidone (untuk merawat jangkitan bakteria)
- Ubat dekonjestan, kemurungan, perangsang seperti amphetamine
- bretylium (untuk merawat ritma jantung yang tidak teratur)

Cara menggunakan Corifed DM

- Berapa banyak harus diambil

Dewasa dan kanak-kanak berumur lebih dari 12 tahun:

10ml (2 sudu teh), diambil 3 kali sehari

Kanak-kanak 6-12 tahun:

5ml (1 sudu teh), diambil 3 kali sehari

Kanak-kanak 2-5 tahun:

2.5ml (1/2 sudu teh), diambil 3 kali sehari

- Bila perlu diambil

Ambil 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi

- Berapa lama perlu diambil

Ambil Corifed DM untuk tempoh yang doktor cadangkan.

- Jika terlupa mengambil

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil ubat dan makan dos yang tertinggal. Jangan mengambil ubat tambahan untuk membuat dos yang tertinggal itu.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau sesiapa sahaja mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini

CORIFED DM SYRUP

Tripolidine Hydrochloride/ Pseudoephedrine Hydrochloride / Dextromethorphan Hydrobromide
(1.25mg/30mg/10mg per 5ml)

walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaian atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh menyebabkan rasa mengantuk, letih, pening, kurang koordinasi, pergerakan mata yang tidak normal, kelemahan, kurang kekuatan otot, pernafasan perlahan, kulit kering, denyutan jantung cepat, tekanan darah tinggi, hiperaktif, suhu badan yang sangat tinggi, cepat marah, khayalan, sawan, masalah membuang air kecil dan rasa loya atau muntah.

Semasa menggunakan Corifed DM

-Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda menggunakan Corifed DM.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh lakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Corifed DM kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera.

Jika ubat membuat anda mengantuk atau menjejaskan keupayaan berfikir anda, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Jangan ambil ubat ini bersama alkohol atau ubat penenang lain.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat, DM Corifed boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku termasuk:

- gangguan tidur
- kayalan
- mengantuk
- tindak balas kulit
- kencing tidak lawas, terutamanya pada lelaki dengan pembesaran prostat
- loya, muntah, atau gangguan gastrousus lain

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Corifed DM

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering dan sejuk di bawah suhu 30 °C.

Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat. Lindungi daripada cahaya.

Simpan ubat jauh daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap berwarna merah mempunyai rasa rasberi..

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Pseudoephedrine Hydrochloride

Tripolidine Hydrochloride

Dextromethorphan Hydrobromide

- Bahan tidak aktif

Refined sugar

Methylparaben

Propylparaben

Chloroform spirit

Carbohymethylcellulose sodium

Ponceau 4R

Citric acid

Raspberry flavour

Purified water

No. MAL

MAL19992586AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.

Lot 5030, Jalan Teratai,

5 ½ Mile Off Jalan Meru

41050 Klang, Selangor, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.

Lot 5979, Jalan Teratai,

5 ½ Mile Off Jalan Meru

41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini

11/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)160124/00009