

KEZOL CREAM

Ketoconazole (2%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Kezol Cream
2. Bagaimana Kezol Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Kezol Cream
4. Cara menggunakan Kezol Cream
5. Semasa menggunakan Kezol Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Kezol Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Kezol Cream

Kezol Cream digunakan secara topikal untuk merawat jangkitan kulat dan yis pada kulit, termasuk di kawasan pangkal paha.

Bagaimana Kezol Cream berfungsi

Ia mengandungi ketoconazole, sejenis antikulat yang berfungsi dengan membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengambil Kezol Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Kezol Cream jika anda alah kepada ketoconazole, sodium sulphite atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut).

- Sebelum mula menggunakan

Mengandung dan penyusuan

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan bayi sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jika ubat kortikosteroid digunakan untuk merawat seborrheic dermatitis (keadaan kulit yang menyebabkan kemerahan dan mengelupas, selalunya pada kulit kepala atau muka), anda disarankan supaya (tidak menggunakan sebarang ubat sapu) selama dua minggu sebelum menggunakan krim ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Kezol Cream

- Berapa banyak harus di ambil

Dewasa : Sapukan pada kawasan yang dijangkiti sekali sehari.

Untuk seborrheic dermatitis, sapukan dua kali sehari.

Bila perlu diguna

Sapukan sekali atau dua kali sehari bergantung pada jenis jangkitan atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu diguna

Gunakan Kezol Cream untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor atau sehingga semua gejala jangkitan hilang.

Teruskan menggunakan krim ini untuk beberapa hari selepas semua gejala hilang.

Jika tiada perubahan yang dilihat selepas 4 minggu, berhenti menggunakan krim dan dapatkan nasihat doktor dengan segera.

- Jika terlupa mengguna

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Menggunakan terlalu banyak krim ini boleh menyebabkan kerengsaan kulit dan hipersensitiviti.

Semasa menggunakan Kezol Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Kezol Cream

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Kezol Cream kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan terkena mata.

Pastikan anda menghabiskan ubat ini mengikut tempoh yang ditetapkan doktor untuk mengurangkan risiko jangkitan berulang.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Kezol Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Anda mungkin mengalami kerengsaan kulit dan rasa pedih.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan Kezol Cream

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Pastikan bekas tertutup rapat.

Untuk kegunaan luar sahaja. Jauhkan ubat daripada kanak-kanak. Lindungi daripada cahaya dan suhu beku.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

KEZOL CREAM

Ketoconazole (2%w/w)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Ketoconazole

- Bahan tidak aktif:

liquid paraffin, cetomacrogol,
cetostearyl alcohol, white soft
paraffin, chlorocresol, propylene
glycol, sodium sulphite and
purified water.

- Nombor MAL:

- MAL19992585AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.

Lot 5030, Jalan Teratai,

5 ½ Miles off Jalan Meru

41050 Klang, Selangor, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.

Lot 5979, Jalan Teratai,

5 ½ Miles off Jalan Meru

41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

10/07/2024

Nombor siri

NPRA(R4/1)240624/00081