

DECAFED LINCTUS

Pseudoephedrine hydrochloride/Tripolidine hydrochloride/Dextromethorphan hydrobromide
(30mg/1.25mg/15mg per 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Decafed Linctus
2. Bagaimana Decafed Linctus berfungsi
3. Sebelum mengambil Decafed Linctus
4. Cara menggunakan Decafed Linctus
5. Semasa menggunakan Decafed Linctus
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Decafed Linctus
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Decafed Linctus

Ia digunakan untuk melegakan batuk kering tanpa kahak, yang sering disertai dengan selesema dan jangkitan saluran pernafasan bahagian atas, alergi bermusim dan sepanjang tahun.

Bagaimana Decafed Linctus berfungsi

Tripolidine Hydrochloride membantu mengurangkan hidung berair dengan cara menghalang histamina, sejenis bahan semulajadi yang dihasilkan dalam badan semasa tindak balas alergi. Dextromethorphan bertindak pada otak untuk mengurangkan refleks batuk. Pseudoephedrine pula membukakan hidung dan saluran pernafasan tersumbat untuk memudahkan pernafasan.

Sebelum mengambil Decafed Linctus

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini

- Jika anda mempunyai alergi terhadap mana-mana bahan yang terkandung dalam produk ini
- Jika anda mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi atau penyakit jantung yang teruk
- Jika anda sedang mengambil atau telah mengambil dalam tempoh dua minggu lepas, ubat perencat monoamine oxidase inhibitor (MAOI) untuk kemurungan.
- Jika anda mempunyai glaukoma sudut sempit (peningkatan tekanan dalam mata) atau pengekalan air kencing

- Jika anda mempunyai ulser perut atau usus dan semasa serangan asma

Jangan gunakan ubat ini pada kanak-kanak di bawah 2 tahun. Gunakan dengan berhati-hati mengikut nasihat doktor / ahli farmasi bagi kanak-kanak berumur 2-6 tahun.

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda:

- Jika anda mempunyai alahan kepada sebarang ubat, makanan, pengawet atau pewarna.
- Jika anda mengalami masalah buah pinggang
- Jika anda mempunyai tekanan darah tinggi atau penyakit jantung.
- Jika anda menghidap diabetes atau telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda tidak bertoleransi terhadap beberapa gula
- Jika anda menghidap glaukoma (peningkatan tekanan dalam mata)
- Jika anda mempunyai kelenjar tiroid yang terlalu aktif
- Jika anda mengalami pembesaran prostat.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung atau merancang untuk hamil atau sedang menyusukan bayi. Doktor atau ahli farmasi anda boleh berbincang dengan anda risiko dan manfaat yang terlibat.

- Mengambil ubat-ubatan lain

Sebelum mengambil ubat ini, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil apa-apa ubat-ubatan lain termasuk vitamin, makanan tambahan dan sediaan herba bagi memastikan gabungan tersebut adalah selamat.

Ubat-ubatan yang boleh berinteraksi dengan Decafed Linctus termasuk:

- monoamine oxidase inhibitor (MAOI) untuk kemurungan
- methyl dopa, mecamlamine, reserpine (untuk menurunkan tekanan darah tinggi)

- digitalis (untuk gangguan jantung)

Cara menggunakan Decafed Linctus

- Berapa banyak harus diambil

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun: 10ml tiga kali sehari

Kanak-kanak berumur 6-12 tahun: 5ml tiga kali sehari.

Kanak-kanak berumur 2-6 tahun: 2.5ml tiga kali sehari.

- Bila perlu diambil

Gunakan tiga kali sehari atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu diambil

Ubat ini biasanya hanya digunakan untuk jangka masa yang pendek. Jika gejala berterusan, berjumpa dengan doktor.

- Jika terlupa mengambil

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Gejala dos berlebihan termasuk mengantuk, keletihan, pening, lemah, pergerakan mata yang tidak terkawal, hiperaktif, kekurangan koordinasi otot, kadar pernafasan perlahan, kekeringan kulit dan membran mukus, kadar denyutan jantung yang tidak normal, tekanan darah tinggi, suhu badan yang luar biasa tinggi, cepat marah, khayalan, sawan, kesukaran membuang air kecil, loya dan muntah.

DECAFED LINCTUS

Pseudoephedrine hydrochloride/Tripolidine hydrochloride/Dextromethorphan hydrobromide
(30mg/1.25mg/15mg per 5ml)

Semasa menggunakan Decafed Linctus

- Perkara yang perlu dilakukan

Bincang dengan ahli farmasi atau doktor anda jika simptom anda tidak bertambah baik. Ahli farmasi atau doktor anda akan menilai keadaan anda dan membuat keputusan sama anda perlu terus mengambil ubat.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jangan berkongsi Decafed Linctus dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana Decafed Linctus memberi kesan kepada anda. Ubat ini mungkin menyebabkan kesan mengantuk dan jika ini berlaku, jangan memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan. Decafed Linctus boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Pseudoephedrine boleh menyebabkan gementar, keterujaan, kegelisahan, kesukaran tidur, sakit kepala, berdebar-debar, keresahan, khayalan, kesakitan atau kesukaran semasa buang air kecil.

Dextromethorphan boleh menyebabkan sedikit mengantuk, gangguan gastrousus, loya atau muntah.

Tripolidine boleh menyebabkan kelemahan, pening, koordinasi tidak

terkawal, mulut kering, kahak yang likat, penglihatan kabur, kesukaran atau pengekalan kencing dan sembelit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Decafed Linctus

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering dan dingin bawah suhu 30°C. Simpan di dalam bekas yang tertutup rapat. Lindungi daripada cahaya.

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap jernih berwarna merah dengan rasa raspberi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan aktif

Pseudoephedrine hydrochloride
Tripolidine hydrochloride
Dextromethorphan Hydrobromide

- Bahan-bahan tidak aktif

Refined sugar
Methylparaben
Propylparaben
Chloroform spirit
Carboxymethylcellulose sodium
Ponceau 4R
Citric acid
Raspberry flavour
Purified water

- Nombor MAL

MAL20040825AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

01/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)220224/00023