

NOVYNETTE TABLET

Ethinylestradiol/Desogestrel (0.02 mg/0.15 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Novynette
2. Bagaimana Novynette berfungsi
3. Sebelum menggunakan Novynette
4. Cara menggunakan Novynette
5. Semasa menggunakan Novynette
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Novynette
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Novynette

Pil pencegah kehamilan (kontraseptif oral)

Bagaimana Novynette berfungsi

Novynette berfungsi dengan menghalang ovulasi dan mengubah rembesan serviks untuk mencegah kehamilan.

Sebelum menggunakan Novynette

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Novynette jika anda mempunyai mana-mana keadaan berikut.

- jika anda mempunyai (atau pernah mempunyai) darah beku dalam salur darah di kaki, paru-paru atau organ-organ lain;
- jika anda mempunyai penyakit yang mengganggu pembekuan darah anda – seperti, kekurangan protein C, kekurangan protein S, kekurangan antithrombin-III, Factor V Leiden atau antiphospholipid-antibodies;
- jika anda memerlukan pembedahan dan jika anda tidak dapat bergerak untuk tempoh yang lama;
- jika anda pernah mendapat serangan jantung atau strok;
- jika anda mengalami (atau pernah mengalami) *angina pectoris* (keadaan yang menyebabkan sakit dada teruk dan mungkin tanda awal serangan jantung) atau gejala strok sementara;
- jika anda mempunyai mana-mana penyakit berikut yang boleh meningkatkan risiko darah beku di arteri:
 - penyakit kencing manis teruk dengan kerosakan salur darah;
 - tekanan darah yang terlalu tinggi;
 - kandungan lemak dalam darah terlalu tinggi (kolesterol atau *triglycerides*);

- Keadaan yang dikenali sebagai *hyperhomocysteinaemia*.
- jika anda mengalami (atau pernah mengalami) ‘*migrain dengan aura*’
- jika anda ada (atau pernah ada) atau jika anda disyaki mempunyai kanser payudara atau kanser organ genital;
- jika anda ada (atau pernah ada) penyakit hati dan fungsi hati anda masih tidak normal.
- jika anda ada (atau pernah ada) ketumbuhan di hati
- jika anda mengalami pendarahan dari faraj yang tidak dapat dijelaskan.
- jika anda ada penebalan dinding rahim (*endometrial hyperplasia*);
- jika anda ada keradangan pankreas atau sejarah keradangan pankreas berkaitan dengan paras lemak yang sangat tinggi dalam darah.
- jika anda alah kepada desogestrel atau ethinylestradiol atau pada mana-mana bahan kandungan ubat ini
- jika anda ada Hepatitis C dan sedang menggunakan ubat yang mengandungi ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, dasabuvir, glecaprevir / pibrentasvir atau sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir (ubat ini boleh meninggikan keputusan ujian fungsi hati (enzim hati ALT meningkat). Novynette boleh dimulakan semula 2 minggu selepas anda hentikan pengambilan ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Novynette jika anda mengandung, sedang cuba untuk mengandung atau fikir anda mungkin mengandung. Jika anda mengandung semasa menggunakan Novynette, hentikan penggunaan serta merta dan hubungi doktor anda. Jangan ambil Novynette jika anda menyusukan anak.

- Sebelum menggunakan Novynette

Sebelum menggunakan Novynette, doktor anda akan bertanya beberapa soalan mengenai sejarah kesihatan anda dan saudara terdekat, akan menjalankan pemeriksaan perubatan dan ginekologi menyeluruh, dan juga untuk mengecualikan kehamilan.

Novynette, seperti pil perancang hormon lain, tidak melindungi anda

dari jangkitan HIV (AIDS) atau lain-lain penyakit kelamin (STD).

Amaran dan langkah berjaga-jaga

Beritahu doktor anda jika mana-mana keadaan berikut berkenaan dengan anda atau menjadi lebih teruk semasa anda menggunakan Novynette:

- Jika anda mengalami gejala angioedema seperti bengkak pada muka, lidah dan/atau tekak dan/atau kesukaran untuk menelan atau gatal-gatal disertai dengan kesukaran bernafas, hubungi doktor dengan segera. Produk yang mengandungi estrogen boleh menyebabkan atau memburukkan gejala angioedema.
- jika anda ada *systemic lupus erythematosus* (SLE – penyakit yang mengganggu sistem pertahanan badan anda);
- jika anda ada *haemolytic uraemic syndrome* (HUS – gangguan pembekuan darah yang menyebabkan kegagalan buah pinggang);
- batu karang;
- jika anda ada *gestational herpes* (ruam kulit dengan lepuh semasa kehamilan)
- jika anda ada *Sydenham's chorea* (penyakit saraf di mana pergerakan badan tidak terkawal)
- jika anda ada bengkak di bawah lapisan kulit yang berulang

Darah beku

Penggunaan kontraseptif hormon gabungan seperti Novynette meningkatkan risiko darah beku berbanding dengan tidak menggunakannya. Darah beku boleh menyebabkan salur darah tersumbat dan masalah yang serius tetapi jarang berlaku..

Diingatkan bahawa secara keseluruhan risiko Novynette menyebabkan darah beku yang bahaya adalah rendah.

Dapatkan perhatian perubatan segera jika anda perasan gejala darah beku

yang mungkin menandakan anda mengalami darah beku di kaki (*deep vein thrombosis*), paru-paru (*pulmonary embolism*), serangan jantung atau strok

Bagaimana untuk mengesan darah beku

Gejala-gejala darah beku termasuk *Deep vein thrombosis*:

- sebelah kaki sakit dan/atau bengkak yang luar biasa

NOVYNETTE TABLET

Ethinylestradiol/Desogestrel (0.02 mg/0.15 mg)

Pulmonary embolism:

- sesak nafas atau bernafas dengan laju secara tiba-tiba
- batuk secara tiba-tiba
- sakit dada yang tajam dan bertambah teruk dengan pernafasan mendalam.

Darah beku dalam mata

- hilang penglihatan separa atau sepenuhnya secara tiba-tiba

Serangan jantung:

- dada terasa tidak selesa, tertekan, dihipit atau sakit di bawah tulang dada, kadang-kadang merebak ke belakang, rahang, tekak, tangan dan perut
- degupan jantung laju atau tidak tetap
- keresahan, sesak nafas
- rasa kenyang, senak atau tercekik

Strok:

- muka, tangan atau kaki tiba-tiba lemah atau kebas, terutamanya pada sebelah badan
- tiba-tiba kekeliruan, sukar bercakap atau memahami
- hilang kesedaran

Darah beku menghalang saluran darah lain:

- kaki atau tangan menjadi bengkak dan kebiruan

Faktor yang meningkatkan risiko anda mendapat darah beku dalam salur darah

- peningkatan usia (terutamanya umur melebihi 35 tahun);
- merokok (wanita berusia lebih dari 35 tahun dinasihatkan untuk tidak merokok jika mereka berhasrat untuk menggunakan kontraseptif hormon gabungan oral, COC).
- obesiti (BMI melebihi 30 kg/m²);
- sejarah keluarga terdekat yang pernah mengalami strok, serangan jantung atau darah beku pada kaki, paru-paru atau organ lain pada usia muda.
- tidak dapat bergerak untuk tempoh yang lama, pembedahan besar, sebarang pembedahan pada kaki, atau trauma serius;
- tekanan darah tinggi;
- migrain
- jika anda, atau sesiapa dalam keluarga terdekat, mempunyai paras kolesterol (lemak) yang tinggi;
- jika anda baharu melahirkan anak;
- jika anda mempunyai masalah dengan jantung anda (masalah injap, gangguan rentak jantung yang dipanggil *atrial fibrillation*);

- jika anda ada anemia sel sabit (penyakit keturunan berkaitan sel darah merah);
- jika anda ada penyakit keradangan usus kronik;
- jika anda mempunyai kencing manis

Novynette dan tumor

Kanser payudara didapati lebih kerap berlaku di kalangan wanita yang menggunakan pil perancang gabungan, tetapi tidak dapat dipastikan sama ada ianya disebabkan penggunaan pil perancang. Contohnya, tumor lebih banyak dikesan di kalangan wanita yang menggunakan pil perancang kerana mereka diperiksa lebih kerap oleh doktor mereka. Risiko tumor payudara berkurang selepas kombinasi pil hormon dihentikan. Adalah penting untuk sentiasa memeriksa payudara anda dan hubungi doktor jika anda merasa sebarang benjolan. Tumor hati benigna dan kanser hati di kalangan pengguna pil perancang ada dilaporkan tetapi jarang. Hubungi doktor anda jika anda mengalami sakit perut yang sangat teruk.

Gangguan psikiatrik

Sebilangan wanita yang menggunakan kontraseptif hormon termasuk Novynette melaporkan kemurungan. Kemurungan boleh menjadi serius dan kadang-kadang boleh menyebabkan fikiran bunuh diri. Jika anda mengalami perubahan mood dan gejala kemurungan, hubungi doktor anda dengan segera untuk mendapatkan nasihat perubatan lanjut.

Ujian makmal

Jika anda memerlukan ujian darah, beritahu doktor anda atau kakitangan makmal bahawa anda menggunakan pil perancang, kerana pil perancang boleh mempengaruhi keputusan sesetengah ujian.

Pemeriksaan berkala

Apabila anda mula menggunakan Novynette doktor anda akan melakukan pemeriksaan berkala, atau jika anda mempunyai sebarang masalah anda boleh berjumpa doktor anda pada bila-bila masa.

Kanak-kanak dan remaja

Keselamatan dan keberkesanan Novynette di kalangan remaja di bawah 18 tahun belum dapat dipastikan. Tiada maklumat didapati.

Novynette mengandungi laktosa

Jika anda pernah diberitahu oleh doktor bahawa anda tidak tolerans kepada sesetengah jenis gula, hubungi doktor anda sebelum menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Jangan guna Novynette jika anda menghidap Hepatitis C dan menggunakan ubat yang mengandungi ombitasvir/paritaprevir/ritonavir dan dasabuvir. Doktor anda akan memberikan pil perancang jenis lain jika anda dirawat dengan ubat-ubat ini.

Sesetengah ubat boleh mempengaruhi paras Novynette dalam darah dan boleh menyebabkan ia kurang berkesan mencegah kehamilan atau boleh menyebabkan pendarahan tidak dijangka, seperti ubat yang digunakan untuk:

- sawan (cthnya. barbiturates, carbamazepine, phenytoin, primidone, felbamate, oxcarbazepine, topiramate);
- batuk kering (cthnya. rifampicin);
- jangkitan HIV dan virus Hepatitis C (cthnya. nevirapin, efavirenz) atau jangkitan lain (cthnya. griseofulvin);
- peningkatan tekanan darah di paru-paru (bosentan);
- rawatan herba St. John's wort (*Hypericum perforatum*).

Ubat-ubat berikut boleh meningkatkan paras Novynette dalam darah dan menyebabkan kesan sampingan:

- etoricoxib (rawatan keradangan dan sakit sendi),
- itraconazole, ketoconazole, fluconazole (rawatan jangkitan kulat);
- diltiazem (rawatan sesetengah penyakit jantung dan tekanan darah tinggi);
- antibiotik seperti clarithromycin, erythromycin.

Novynette boleh mempengaruhi kesan ubat-ubat lain seperti:

- ciclosporin (untuk mencegah kesan penolakan selepas pemindahan organ);
- lamotrigine (untuk rawatan sawan);
- theophylline (untuk rawatan masalah pernafasan);

NOVYNETTE TABLET

Ethinylestradiol/Desogestrel (0.02 mg/0.15 mg)

- tizanidine (untuk rawatan kekejangan otot);
- levothyroxine (untuk rawatan kekurangan hormon tiroid)

Jika anda menghidap penyakit kencing manis, doktor anda akan memantau anda sepanjang penggunaan Novynette.

Cara menggunakan Novynette

- Berapa banyak perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Telah pil sepenuhnya, dengan air. Satu tablet perlu diambil sekali sehari, sebaiknya sentiasa pada masa yang sama, bermula hari pertama haid bulanan untuk 21 hari. Ini diikuti dengan tempoh tanpa pil selama 7 hari di mana pendarahan seperti haid akan berlaku. Mulakan pengambilan 21 tablet seterusnya pada hari ke-8, walaupun pendarahan belum berhenti.

Jika tidak menggunakan sebarang pencegah kehamilan hormon sebelum ini

- Tunggu sehingga haid anda bermula. Tablet pertama perlu diambil pada hari pertama haid.
- Jika haid anda telah bermula, anda boleh mula ambil pil perancang pada hari ke-2 hingga ke-5 kitaran haid tidak kira pendarahan telah berhenti atau tidak. Dalam kes ini, langkah pencegahan tambahan perlu diambil untuk 7 hari pertama pengambilan pil semasa kitaran pertama.

Apabila menukar dari perancang gabungan hormon (pil perancang gabungan hormon, gelang faraj, atau tempelan kulit)

Anda boleh mula mengambil Novynette pada hari selepas anda mengambil tablet terakhir pil perancang sekarang (ini bermaksud tiada hari tanpa-pil). Jika pek pil sekarang mengandungi tablet tak-aktif, anda boleh mula ambil Novynette pada hari selepas mengambil tablet aktif terakhir (jika anda tidak pasti yang mana, sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda). Anda juga boleh mula kemudian, tetapi tidak lebih dari hari selepas tempoh tanpa-tablet (atau selepas tablet tak-aktif terakhir pil perancang sekarang).

Jika anda menggunakan gelang faraj atau tempelan kulit, mula ambil Novynette sebaiknya pada hari mengeluarkannya, atau paling lewat

apabila pemakaian seterusnya dijadualkan.

Menukar dari pil progestogen-sahaja (POP, atau pil mini)

Anda boleh berhenti mengambil pil progestogen-sahaja pada bila-bila masa, dan mula mengambil Novynette pada hari berikutnya pada masa biasa. Tetapi pastikan anda menggunakan langkah pencegahan tambahan (seperti kondom atau spemid) semasa persetubuhan pada 7 hari pertama pengambilan pil.

Menukar dari suntikan progestogen-sahaja, implan, alat pencegahan kehamilan dalam rahim (IUS) mengandungi progestogen kepada Novynette

Anda boleh mula ambil Novynette pada hari suntikan seterusnya dijadualkan, atau pada hari implan atau alat dalam rahim dikeluarkan. Walau bagaimanapun, anda perlu menggunakan pencegah kehamilan tambahan (seperti kondom atau spemid) semasa persetubuhan pada 7 hari pertama pengambilan pil.

Penggunaan selepas bersalin,

Pengambilan tablet pertama untuk ibu yang tidak menyusui boleh diberi pada hari ke 21-28 selepas bersalin, dan tiada pencegahan kehamilan tambahan diperlukan. Jika persetubuhan berlaku, Novynette tidak boleh dimulakan sehingga hari pertama haid. Jika Novynette tablet mula diambil selepas 28 hari bersalin, kaedah pencegahan kehamilan tambahan lain diperlukan untuk 7 hari pertama.

Selepas keguguran atau pengguguran

Selepas keguguran atau pengguguran, doktor anda akan menasihati anda untuk menggunakan ubat ini. Anda boleh mula menggunakan Novynette sejurus selepas keguguran atau pengguguran. Dalam kes ini, anda tidak memerlukan langkah pencegahan kehamilan tambahan.

Apa yang perlu dilakukan jika anda sakit perut

Jika anda muntah atau cirit birit dalam tempoh 3-4 jam selepas mengambil pil, bahan aktif dalam pil mungkin belum diserap sepenuhnya oleh badan. Selepas muntah atau cirit birit, ambil tablet baru dalam pek lain secepat mungkin. Jika boleh, ambil tablet baru dalam tempoh 12 jam dari masa anda biasa ambil pil.

Jika tidak boleh atau 12 jam telah berlalu, ikut nasihat yang diberikan di bahagian 'Jika terlupa menggunakan'.

Jika anda ingin menangguhkan atau menukar haid anda

Jika anda ingin menangguhkan haid anda perlu teruskan pengambilan pek Novynette yang seterusnya selepas tablet terakhir diambil, tanpa tempoh tanpa-pil. Anda boleh mengambil sebanyak mana pil dari pek seterusnya ini sehingga habis pek kedua.

Jika anda ingin menukar haid ke hari lain, selain dari hari haid biasanya berlaku dalam minggu yang sama, anda boleh memendekkan (tapi jangan panjangkan) tempoh tanpa-pil yang akan datang sebanyak hari yang ada mahu. Lebih pendek hari tanpa-pil, lebih besar kemungkinan anda tidak akan mengalami pendarahan dan anda mungkin mengalami sedikit pendarahan semasa penggunaan tablet dari pek kedua.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Novynette untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda boleh berhenti menggunakan Novynette pada bila-bila masa. Jika anda tidak mahu mengandung, dapatkan nasihat doktor mengenai kaedah perancang kehamilan lain yang berkesan.

Jika anda mahu mengandung, hentikan penggunaan Novynette dan tunggu sehingga anda datang haid sebelum cuba untuk mengandung. Anda boleh mengira tarikh jangkaan bersalin dengan lebih mudah.

- Jika terlupa menggunakan

Jika satu pil lewat 12 jam atau kurang

Anda masih terlindung dari kemungkinan hamil jika anda ambil pil yang terlupa sebaik sahaja anda ingat, dan teruskan pengambilan pil seterusnya seperti biasa. Ini mungkin bermaksud mengambil dua pil dalam satu hari.

Jika anda lewat mengambil pil lebih dari 12 jam, perlindungan kehamilan mungkin berkurang jadi anda perlu

NOVYNETTE TABLET

Ethinylestradiol/Desogestrel (0.02 mg/0.15 mg)

menggunakan langkah pencegahan tambahan.

Jika anda lupa lebih dari satu pil, rujuk doktor anda untuk nasihat.

- Jika mengambil secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Tiada kesan serius akibat terlebih dos dilaporkan. Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan mual, muntah-muntah, dan sedikit pendarahan faraj di kalangan budak perempuan.

Semasa menggunakan Novynette

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Novynette.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika berlaku pendarahan antara kitaran haid, pengambilan pil perlu diteruskan. Pendarahan ini biasanya berhenti sendiri. Jika pendarahan berterusan atau berulang, pemeriksaan ginekologi perlu dilakukan untuk mengecuali sebarang penyakit. Jika tiada pendarahan berlaku semasa 7 hari tanpa pil, hentikan pengambilan pil sehingga anda disahkan tidak mengandung.

Jika anda mempunyai kecenderungan untuk kloasma, elakkan pendedahan kepada matahari atau sinaran UV semasa mengambil pil kontraseptif hormon gabungan.

Memandu dan menggunakan jentera
Novynette tidak mempengaruhi keupayaan memandu atau menggunakan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Novynette boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Semasa permulaan rawatan, sebahagian besar wanita boleh menjangkakan kesan sampingan seperti payudara nyeri, rasa lesu dan tompok darah. Walau bagaimanapun, kesan sampingan ini biasanya bersifat sementara dan hilang selepas 2-4 bulan.

Kesan sampingan yang sangat kerap:

- haid tidak teratur

Kesan sampingan yang kerap:

- kemurungan, perubahan mood, rasa gementar
- sakit kepala
- pening
- rasa mual, sakit perut
- jerawat
- payudara sakit dan rasa nyeri, tidak datang haid, haid sakit atau gejala yang biasa dialami beberapa minggu sebelum datang haid seperti: letih atau susah tidur, perut kembung
- peningkatan berat badan

Kesan-kesan sampingan yang tidak kerap:

- pengumpulan cecair (bengkak)
- keinginan seksual menurun
- migrain
- masalah pendengaran (otosclerosis)
- tekanan darah tinggi
- muntah-muntah, cirit-birit
- ruam kulit
- payudara membesar

Kesan-kesan sampingan yang jarang:

- reaksi hipersensitif (alahan)
- keinginan seksual meningkat
- tak tolerans pada kanta lekap
- gangguan kulit eritema nodosum (dicirikan dengan nodul-nodul kulit merah dan menyakitkan), eritema multiforme (dicirikan dengan ruam dan tompok merah), tompok coklat pada kulit, muka atau badan (kloasma)
- rembesan faraj atau payudara
- berat badan menurun
- darah beku dalam salur darah yang berbahaya. Risiko untuk mendapat darah beku mungkin lebih tinggi jika anda mempunyai keadaan lain yang meningkatkan risiko ini (rujuk bahagian “Sebelum menggunakan Novynette” untuk maklumat lanjut mengenai keadaan yang meningkatkan risiko darah beku dan gejala darah beku.)

Tidak diketahui (kekerapan tidak dapat dianggarkan dari data yang ada):

- pemburukan gejala angioedema keturunan dan diperolehi.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perasan mana-mana kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Penyimpanan dan pelupusan Novynette

- Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30°C. Jangan simpan sebarang ubat di dalam bilik mandi, berdekatan sinki, atau di tepi tingkap.

Jangan tinggalkan di dalam kereta terutamanya pada hari panas. Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat. Jangan guna ubat anda selepas tarikh luput yang dinyatakan pada pek selepas ‘EXP’. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem bewarna hampir kuning, berbentuk bulat, dwicembung, berdiameter 6mm, dengan tanda P9 pada satu belah, dan tanda RG pada satu belah lagi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ethinylestradiol/Desogestrel

- Bahan tidak aktif

Teras tablet: potato starch; stearic acid; alpha-tocopherol; lactose monohydrate; magnesium stearate; silica colloidal anhydrous; povidone K 30; quinoline yellow (E 104); Salutan tablet: hypromellose; Macrogol 6000; propylene glycol

NOVYNETTE TABLET

Ethinylestradiol/Desogestrel (0.02 mg/0.15 mg)

- Nombor MAL:
MAL05072014AZ

Pengilang

Gedeon Richter Plc.
H-1103, Budapest
Gyömrői út 19-21.
Hungary

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Mile off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

11/04/2023

Nombor siri

NPRA(R4/1)090323/00021