

TERNAFIN TABLET

Terbinafine Hydrochloride (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ternafin Tablet
2. Bagaimana Ternafin Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ternafin Tablet
4. Cara menggunakan Ternafin Tablet
5. Semasa menggunakan Ternafin Tablet
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ternafin Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Ternafin Tablet

Terbinafine digunakan untuk merawat jangkitan kulat pada kulit dan kuku. Walau bagaimanapun, ia tidak sesuai untuk merawat keadaan kulit tertentu yang dipanggil panau (ruam bertompok pada kulit)

Bagaimana Ternafin Tablet berfungsi

Ternafin Tablet mengandungi bahan aktif terbinafine, yang tergolong dalam kumpulan ubat antikulat. Terbinafine berfungsi dengan membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Ternafin Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Ternafin Tablet

- jika anda alah kepada terbinafine, atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut)

- Sebelum menggunakan Ternafin Tablet

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Ternafin Tablet jika:
- anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang

Kehamilan dan menyusukan anak

Jika anda hamil, merancang untuk hamil atau berpendapat anda mungkin hamil, berbincang dengan doktor anda sebelum memulakan sebarang ubat.

Terbinafine hanya boleh digunakan semasa kehamilan jika faedahnya lebih daripada risiko kepada janin.

Terbinafine dirembeskan ke dalam susu ibu, oleh itu penggunaannya oleh ibu menyusukan tidak digalakkan

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat berikut:

- sesetengah ubat untuk rawatan kemurungan
- ubat penghalang beta (digunakan untuk tekanan darah tinggi atau masalah jantung)
- *monoamine oxidase inhibitors* (MAOIs)
- ubat perancang oral
- rifampicin (digunakan untuk merawat tibi)
- cimetidine (digunakan dalam rawatan ulser)
- nortriptyline (digunakan dalam rawatan sakit saraf)

Cara menggunakan Ternafin Tablet

Ambil ubat ini seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa, warga emas dan kanak-kanak dengan berat melebihi 40kg :
1 tablet diambil sekali sehari

Kanak-kanak dengan berat 20-40kg:
Setengah tablet diambil sekali sehari

Individu dengan masalah buah pinggang dan hati:
Doktor anda mungkin melaraskan dos anda mengikut keadaan anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat selama yang disyorkan oleh doktor.

Tempoh rawatan biasanya antara 2-6 minggu, dan mungkin berlarutan sehingga 12 minggu.

Habiskan kesemua ubat yang dibekalkan kepada anda, walaupun gejala jangkitan sembuh lebih awal.

- Jika terlupa menggunakan Ternafin Tablet

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan

mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh menyebabkan sakit kepala, loya, sakit perut dan pening.

Semasa menggunakan Ternafin Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ternafin Tablet .

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Ambil Ternafin Tablet hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Ternafin Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin
Berhati-hati memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana Ternafin Tablet memberi kesan kepada anda.

Anda harus menjalani ujian darah rutin (cth. fungsi hati, kiraan darah) sebelum dan semasa rawatan dengan Ternafin Tablet. Doktor anda akan menasihati anda tentang kekerapan anda perlu menjalani ujian ini.

TERNAFIN TABLET

Terbinafine Hydrochloride (250mg)

Jika anda mengalami sebarang ruam kulit, loya/muntah, kekuningan mata/kulit, kurang selera makan, air kencing berubah warna gelap, warna najis berubah pucat, atau gejala lain yang berkaitan, sila berjumpa dengan doktor anda secepat mungkin.

Kesan-kesan Sampingan

Seperi semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Ternafin tablet secara amnya boleh diterima dengan baik, dan kesan sampingan biasanya ringan atau sederhana dan sementara.

Kesan sampingan biasa berlaku termasuk:

- Rasa kembung, hilang selera makan, ketidakhadaman, loya, sakit perut ringan, cirit-birit.
- Sakit kepala
- Ruam, geligata
- Sakit otot/sendi

Kesan sampingan yang tidak biasa berlaku:

- Hilang deria rasa, biasanya akan hilang selepas ubat diberhentikan.

Kesan sampingan yang jarang dan sangat jarang berlaku:

- Masalah hati: Kekuningan mata/kulit, keradangan atau kegagalan hati
- Reaksi kulit yang serius: Melepuh, mengelupas, sensitif pada cahaya, tindak balas alahan yang teruk
- Gangguan darah: Rendah sel darah putih, atau platelet
- Keguguran rambut

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumer→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Penyimpanan dan pelupusan Ternafin Tablet

- Penyimpanan

Simpan di tempat kering yang dingin di bawah suhu 30°C.

Lindungi daripada cahaya

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah.

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa and warna produk

Tablet bulat berwarna putih atau putih pudar dengan garis pada satu permukaan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap satu tablet mengandungi Terbinafine hydrochloride bersamaan dengan Terbinafine 250mg

- Bahan tidak aktif

Sodium starch glycolate, pregelatinised starch, sodium lauryl sulphate, microcrystalline cellulose, corn starch, colloidal silicone dioxide, magnesium stearate dan purified water.

- Nombor MAL

MAL05121149AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.

Lot 5030, Jalan Teratai,

5 ½ Miles off Jalan Meru

41050 Klang, Selangor, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.

Lot 5979, Jalan Teratai,

5 ½ Miles off Jalan Meru

41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP

24/07/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)040724/00085