

AKURIT TABLET

Rifampin / Isoniazid (150mg/ 75mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Akurit
2. Bagaimana Akurit berfungsi
3. Sebelum menggunakan Akurit
4. Cara menggunakan Akurit
5. Semasa menggunakan Akurit
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Akurit
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Akurit

Akurit digunakan untuk rawatan batuk kering.

Bagaimana Akurit berfungsi

Akurit mengandungi dua ubat yang berbeza iaitu rifampin dan isoniazid. Mereka berfungsi dengan membunuh bakteria penyebab tibi.

Sebelum menggunakan Akurit

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Akurit jika anda:

- mempunyai alahan pada rifampin, isoniazid atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam Akurit. Antara tanda tindak balas alergi termasuk: ruam, masalah pernafasan atau kesukaran menelan, bibir, muka, tekak atau lidah menjadi bengkak
- Pernah mengalami kecederaan hati yang berpunca dari ubat atau sejarah reaksi teruk terhadap isoniazid seperti demam, menggigil dan keradangan sendi
- Pernah mengalami masalah hati akut.

- Sebelum menggunakan Akurit

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil ubat ini jika anda;

- Mempunyai masalah hati jangka masa panjang.
- Mempunyai masalah buah pinggang yang teruk
- Menghidapi diabetes
- Minum alkohol setiap hari atau anda ketagihan alkohol

Jika anda tidak pasti jika anda

mengalami mana-mana perkara di atas,, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Akurit.

Akurit boleh menjejaskan keputusan ujian darah seperti ujian untuk folat, vitamin B12 dan fungsi hati. Sekiranya anda akan menjalani ujian darah, adalah penting untuk memberitahu doktor bahawa anda sedang mengambil Akurit.

Mengandung dan menyusukan anak
Rifampin boleh dirembeskan ke dalam susu ibu.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan anak. Doktor anda akan menilai sama ada anda boleh meneruskan rawatan Akurit.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain. Ini termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan. Ini kerana Akurit boleh menjejaskan fungsi ubatan lain dan sebaliknya.

- Methadone (Ubat untuk ketagihan dadah)
- Digitoxin, quinidine dan disopyramide (ubat untuk degupan jantung yang tidak teratur)
- Dapsone (antibiotik)
- Digitoxin, quinidine dan disopyramide (ubat untuk degupan jantung tidak teratur)
- Corticosteroid i.e Prednisolone (ubat untuk kurangkan keradangan)
- Phenytoin, Lamotrigine (ubat untuk mengawal sawan)
- Antiretroviral (Zidovudine, tenofovir disoproxil, Efavirenz, Nevirapine, Indinavir, Ritonavir, Lopinavir, Atazanavir, Tipranavir, Darunavir, Dolutegravir)
- Antikulat (Ketoconazole, Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole)

- Antibakteria/Antituberkulotik (Clarithromycin, Doxycycline, Metronidazole, Sulfamethoxazole, Trimethoprim)
- Antimalaria (Mefloquine, Quinine, Artemisinin dan derivatifnya)
- Analgesik, antipiretik, ubat anti-radang bukan steroid (Morphine, Codeine)
- Imunosupresif (Tacrolimus, Sirolimus, Everolimus)
- Ubat kardiovaskular (Warfarin, Atenolol, Verapamil, Lidocaine, Simvastatin, Atorvastatin)
- Ubat gastrousus (Ranitidine)
- Ubat psikoterapeutik (Diazepam, Midazolam, Alprazolam, Zolpidem)
- Hormon; ubat endokrin dan kontraseptif lain (Ethinylestradiol, Norethindrone)
- Ubat oral untuk diabetes
- (Glibenclamide, Glimepiride, Repaglinide)
- Lain-lain (Praziquantel)

Akurit boleh menjejaskan fungsi pil kontraseptif oral. Oleh itu, anda perlu mengambil langkah-langkah kontraseptif alternatif.

Jika anda mengambil ubat-ubatan anti tibi yang lain, sila tanya doktor anda tentang cara mengambil ubat tersebut.

Cara menggunakan Akurit

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Doktor anda akan menetapkan dos mengikut berat badan anda. Dos biasa ialah 2-5 tablet sehari

Berat badan (kg)	Jumlah tablet harian Akurit
30-37	2
38-54	3
55-70	4
>70	5

Doktor anda mungkin menetapkan suplemen tambahan (vitamin B) jika anda kekurangan zat makanan atau mempunyai diabetes.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat seperti yang diarahkan

AKURIT TABLET

Rifampin / Isoniazid (150mg/ 75mg)

oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

- Anda mesti mengambil tablet setiap hari mengikut tempoh masa seperti yang diarahkan oleh doktor.

- Pada umumnya, terapi perlu diteruskan sehingga ada penambahbaikan

- Jika terlupa menggunakannya

Jika anda terlupa dos, ambil ia sebaik sahaja anda mengingatnya. Walau bagaimanapun, jika hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggangkannya.

Rujuk doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa mengambilnya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan .

Jika boleh, bawa tablet atau kotak anda bersama anda untuk menunjukkan kepada doktor ubat yang telah anda ambil.

Mengambil terlalu banyak rifampin boleh menyebabkan mual, muntah, dan membuat anda tiba-tiba rasa letih, berikutan ini ketidaksedaran mungkin berlaku dengan gangguan hati yang teruk. Pening, pertuturan yang tidak jelas, kabur penglihatan, khayalan boleh berlaku dengan pengambilan isoniazid yang berlebihan.

Semasa menggunakan Akurit

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Akurit.

Beritahu doktor anda dengan segera

jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Jumpa doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil apa-apa ubat baharu tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan Akurit kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

Jangan minum alkohol jika anda mengambil Akurit.

Jangan berhenti dan mula mengambil tablet sesuka hati. Ini boleh menyebabkan buah pinggang hipersensitif dan jangkitan tidak akan dirawat dengan baik

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Anda mungkin rasa kesemutan atau rasa kebas atau mempunyai kesan sampingan lain yang boleh menjejaskan keupayaan anda memandu ketika mengambil ubat ini. Jika ini berlaku, jangan memandu atau menggunakan alat atau jentera.

Rifampin dan metabolitnya boleh menyebabkan air kencing, najis, air liur, kahak, peluh dan air mata bertukar menjadi merah-jingga. Kanta lekap lembut mungkin diwarnai.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Akurit boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jika anda mengalami sebarang

kesan sampingan, kebanyakannya adalah ringan dan sementara. Walau bagaimanapun, sesetengah kesan sampingan mungkin memerlukan perhatian perubatan.

Lihat maklumat di bawah dan jika perlu, tanya doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai persoalan berkenaan kesan sampingan.

Reaksi sistem saraf:

Sakit kepala, mengantuk, keletihan, gangguan pada kawalan koordinasi, pening, ketidakupayaan untuk menumpukan perhatian, rasa keliru, gangguan penglihatan, kelemahan otot, sakit atau kesemutan pada bahagian kaki dan tangan, kebas, sawan, keradangan saraf pada mata, gangguan ingatan, dan khayalan.

Gangguan gastrousus

Pedih ulu hati, gangguan epigastrik, gangguan makan, loya, muntah, kembung, dan cirit-birit.

Keradangan pankreas, yang menyebabkan sakit teruk di perut dan belakang (pankreatitis).

Reaksi hati

Penyakit kuning dan kadangkala keradangan hati yang teruk.

Reaksi buah pinggang

Kerosakan buah pinggang, pemusnahan sel darah merah, yang menyebabkan kehadiran darah dalam air kencing, keradangan buah pinggang, lebihan asid urik dalam darah.

Reaksi darah

Penurunan sel darah merah, sel darah putih dan kiraan platelet.

Reaksi alergi dan imunologi

Pembesaran nodus limfa, keradangan saluran darah, kegatalan, ruam, lepuh, sakit mulut, dan lidah, keradangan mata.

Reaksi metabolik dan endokrin

Kekurangan vitamin B6 atau B3, glukosa berlebihan dalam darah, asid berlebihan dalam darah, pertumbuhan payudara lelaki

AKURIT TABLET

Rifampin / Isoniazid (150mg/ 75mg)

Gangguan muskuloskeletal dan penghubung tisu

Penyakit yang menyebabkan sistem imun anda menyerang sendi, kulit, organ, dan saluran darah.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa lagi yang mungkin membuat anda berasa tidak sihat.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di sini mungkin berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan di laman web npra.gov.my [Pengguna → Laporkan Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) or Vaksin (AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan Akurit

-Penyimpanan

- Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak.
- Simpan ubat anda di bawah suhu 30°C.
- Jangan simpan apa-apa ubat di bilik mandi, atau berhampiran sinki, atau di ambang jendela.
- Jangan biarkan ubat di dalam kereta terutama pada hari panas. Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat-ubatan.
- Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan itu.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Akurit adalah tablet dwicembung yang bersalut berwarna merah bata, berbentuk kapsul, bergaris pada satu permukaan dan kosong pada permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- Rifampin
- Isoniazid

Bahan tidak aktif:

- *Microcrystalline Cellulose, Crospovidone, Pregelatinized Starch, Ascorbic acid, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Hypromellose, Polyethylene glycol, Talc, Titanium dioxide, Color Iron oxide Red, Simethicone Emulsion*

- Nombor MAL

MAL06011712AZ

Pengilang

Lupin Ltd.
A 28-1, MIDC Industrial Area,
Chikalthana, Chhatrapati
Sambhajnagar, Maharashtra 431210,
India

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.,
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Mile, Off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor.
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

16/06/2025

Nombor Siri

NPRA (R4/1)050723/00059