

FUCID OINTMENT

Sodium fusidate(2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fucid Ointment
2. Bagaimana Fucid Ointment berfungsi
3. Sebelum menggunakan Fucid Ointment
4. Cara menggunakan Fucid Ointment
5. Semasa menggunakan Fucid Ointment
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Fucid Ointment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Fucid Ointment

Fucid Ointment digunakan secara topikal untuk merawat pelbagai jangkitan kulit yang disebabkan oleh bakteria tertentu seperti impetigo, luka yang dijangkiti, bisul, dan jangkitan kulit lain .

Bagaimana Fucid Ointment berfungsi

Fucid Ointment mengandungi sodium fusidate, sejenis antibiotik yang membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Fucid Ointment

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ubat ini jika:

- anda alah kepada sodium fusidate atau mana-mana bahan lain ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)

- Sebelum mula menggunakan Fucid Ointment

Kehamilan dan menyusukan anak

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusu bayi sebelum menggunakan ubat ini.

Fucid Ointment hanya boleh digunakan semasa kehamilan jika manfaatnya lebih daripada risiko kepada janin.

- Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Fucid Ointment

- Berapa banyak harus digunakan

Basuh tangan anda sebelum dan selepas menyapu salap. Sapukan ke kawasan yang dijangkiti dengan atau tanpa pembalut,

- Bila perlu digunakan

Sapukan 2 hingga 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Fucid Ointment untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor, biasanya selama tempoh 7 hari.

Jika jangkitan tidak bertambah baik atau bertambah teruk dalam tempoh 7 hari selepas menggunakan salap, sila berjumpa doktor sekali lagi secepat mungkin.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Menggunakan terlalu banyak ointment ini boleh menyebabkan kesan

sampingan yang lebih teruk atau meningkat.

Semasa menggunakan Fucid Ointment

- Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Fucid Ointment.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Fucid Ointment kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan daripada terkena mata dan berhati-hati apabila menyapu berhampiran mata anda.

Jika anda mengalami sebarang alahan atau tindak balas kulit semasa menggunakan salap ini, hentikan penggunaan dan berjumpa doktor dengan segera.

Elakkan daripada menggunakan ubat ini dengan terlalu kerap atau untuk tempoh masa yang lama, kerana bakteria mungkin menjadi tahan terhadapnya.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Fucid Ointment boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

FUCID OINTMENT

Sodium fusidate(2% w/w)

Berjumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan termasuk:

- Reaksi hipersensitiviti seperti ruam kulit.
- Rasa pedih dan kerengsaan ringan di pada kawasan yang disapu salap (jarang berlaku)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Fucid Ointment

- Penyimpanan

Simpan salap di tempat yang dingin di bawah suhu 30°C

Untuk kegunaan luaran sahaja

Simpan bekas dengan tertutup rapat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Salap berwarna putih atau kuning pudar.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif

Sodium fusidate

Bahan tidak aktif

Cetomacrogol 1000, White soft paraffin, Cetostearyl alcohol, Liquid paraffin.

- Nombor MAL:

MAL07050005AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP

10/07/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)230624/00079