

# AKURIT-4 TABLETS

Rifampin /Isoniazid /Pyrazinamide /Ethambutol Hydrochloride (150mg/75mg/400mg/275mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Akurit-4
2. Bagaimana Akurit-4 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Akurit-4
4. Cara menggunakan Akurit-4
5. Semasa menggunakan Akurit-4
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Akurit-4
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Akurit-4

Akurit-4 digunakan dalam rawatan batuk kering.

## Bagaimana Akurit-4 berfungsi

Akurit-4 mengandungi empat ubat yang berbeza iaitu rifampin, isoniazid, pyrazinamide dan ethambutol hydrochloride. Mereka berfungsi dengan membunuh bakteria penyebab tibi.

## Sebelum menggunakan Akurit-4

### – Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- mempunyai alahan pada rifampin, isoniazid, pyrazinamide, etambutol hydrochloride atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat.
- pernah mengalami kecederaan hati yang berpunca dari ubat atau sejarah reaksi teruk terhadap isoniazid seperti demam, menggigil dan keradangan sendi
- mengalami gangguan mata yang disebabkan oleh saraf optik yang meradang

### – Sebelum menggunakan Akurit-4

Etambutol tidak disyorkan untuk digunakan pada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mempunyai salah satu daripada keadaan berikut sebelum mengambil ubat ini:

- Kencing manis
- Kecacatan mata
- Minum alkohol setiap hari atau anda ketagihan alkohol
- Masalah buah pinggang
- Penyakit hati jangka masa panjang

### – Mengandung dan menyusukan anak

Rifampin boleh dirembeskan ke dalam susu ibu.

Sila hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, atau merancang untuk hamil atau menyusukan sebelum menggunakan sebarang ubat. Doktor anda akan menilai sama ada anda boleh meneruskan rawatan Akurit-4.

Akurit -4 boleh menjejaskan keputusan ujian darah seperti ujian untuk folat, vitamin B12 dan fungsi hati. Sekiranya anda akan menjalani ujian darah, adalah penting untuk memberitahu doktor bahawa anda sedang mengambil Akurit-4.

### – Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil sebarang ubat lain, termasuk sebarang ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil salah satu daripada ubat berikut:

- Ubat untuk degupan jantung yang tidak teratur seperti *quinidine*, *disopyramide*, *mexiletine*, dan *tocainide*.
- Ubat untuk jantung atau tekanan darah (*diltiazem*, *nifedipine*, *verapamil*, *enalapril*, dan beta-blocker)
- Kortikosteroid (ubat untuk kurangkan keradangan)
- Kontraseptif oral termasuk *progestin*
- Ubat untuk merawat jangkitan kulat seperti *fluconazole*, *itraconazole*, *ketoconazole*
- Antibiotik seperti *dapsone*, *ciprofloxacin*, *chloramphenicol*, *ethionamide*, *cotrimoxazole*
- Ubat untuk gangguan mental/emosi seperti *nortriptyline* dan *haloperidol*
- Metadon (ubat untuk ketagihan dadah atau ubat tahan sakit narkotik)
- Ubat asma seperti *theophylline*
- Ubat untuk mencegah penolakan organ seperti *cyclosporine*
- Ubat untuk mencegah pembekuan darah seperti *warfarin*
- Ubat untuk mengawal sawan seperti *carbamazepine*, *fosphenytoin*, *phenytoin*, *primidone*, *valproic acid*, *phenytoin*, *diazepam*
- Ubat gout seperti *probenecid*
- Ubat anestetik seperti *halothane* dan *barbiturate*

- Ubat antiretroviral untuk HIV/AIDS seperti *zidovudine*

- *Clofibrate* (Ubat untuk menurunkan kolesterol)

Jika anda sedang mengambil mana-mana ubat ini, tanya doktor anda tentang penukaran kepada ubat lain semasa anda mengambil Akurit-4. Selalunya, terdapat ubat lain yang boleh anda ambil.

Jika anda perlu mengambil ubat untuk ketidakcergasan, seperti antasid, ambil tablet anda sekurang-kurangnya satu jam sebelum antasid.

Akurit boleh menjejaskan fungsi pil kontraseptif oral. Oleh itu, anda perlu mengambil langkah-langkah kontraseptif alternatif.

Jika anda mengambil ubat-ubatan anti-tibi yang lain, sila tanya doktor anda tentang cara mengambil ubat tersebut.

## Cara menggunakan Akurit-4

### – Berapa banyak harus digunakan

Dewasa – Ambil 3 tablet sehari untuk purata berat badan 50 kg. Tablet ini boleh dipecahkan kepada dua supaya lebih mudah ditelan. Ia bukan untuk mengambil separuh dos tablet.

### – Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa fasa awal selama 3 bulan, Akurit-4 diberikan secara berterusan setiap hari. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

### – Berapa lama perlu digunakan

Ambil tablet mengikut tempoh masa yang disyorkan oleh doktor anda. Walaupun anda berasa lebih baik, anda tidak seharusnya mengganggu rawatan dengan Akurit-4 tanpa berunding dengan doktor anda.

Jika anda berhenti mengambil tablet terlalu awal, jangkitan mungkin datang kembali. Tambahan pula, ubat mungkin tidak lagi berkesan terhadap bakteria tersebut.

Tindak balas hipersensitiviti buah pinggang yang jarang berlaku telah dilaporkan apabila terapi disambung semula dengan gangguan rawatan sebelum ini.

### – Jika terlupa menggunakannya

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda

# AKURIT-4 TABLETS

Rifampin /Isoniazid /Pyrazinamide /Ethambutol Hydrochloride (150mg/75mg/400mg/275mg)

ingat. Jika hampir tiba masanya untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa.

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

– Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan loya, muntah, dan bertambah lesu, pening, pertuturan yang tidak jelas, penglihatan kabur dan khayalan.

Jika boleh, bawa tablet atau kotak anda bersama anda untuk menunjukkan kepada doktor ubat yang telah anda ambil.

## Semasa menggunakannya

– Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Akurit-4.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

– Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan Akurit-4 kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

Jangan minum sebarang alkohol selagi anda mengambil Akurit-4.

## Perkara yang perlu diberi perhatian:

– *Memandu dan menggunakan jentera*

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Ia boleh menyebabkan kekeliruan,

khayalan, pening, kelesuan dan gangguan penglihatan (penglihatan kabur, buta warna merah-hijau, kehilangan penglihatan). Jika anda mengalami mana-mana perkara di atas, jangan memandu atau menggunakan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Akurit 4 boleh menyebabkan air kencing, najis, air liur, kahak, peluh dan air mata bertukar menjadi merah-jingga. Kanta sentuh lembut mungkin diwarnai.

## Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Akurit-4 boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Jika anda mengalami kesan sampingan, kebanyakannya adalah ringan dan sementara. Walau bagaimanapun, sesetengah kesan sampingan mungkin memerlukan perhatian perubatan.

Lihat maklumat di bawah dan, jika perlu, tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang kesan sampingan.

## Reaksi sistem saraf:

Sakit kepala, mengantuk, keletihan, gangguan pada kawalan koordinasi, pening, ketidakupayaan untuk menumpukan perhatian, rasa keliru, gangguan penglihatan, kelemahan otot, sakit atau kesemutan pada bahagian kaki dan tangan, kebas, sawan, keradangan saraf pada mata, gangguan ingatan, dan khayalan.

## Gangguan gastrousus

Pedih ulu hati, gangguan epigastrik, gangguan makan, loya, muntah, kembung, dan cirit-birit.

Keradangan pankreas, yang menyebabkan sakit teruk di perut dan belakang (pankreatitis).

## Reaksi hati

Penyakit kuning dan kadangkala keradangan hati yang teruk.

## Reaksi buah pinggang

Kerosakan buah pinggang, pemusnahan sel darah merah, yang menyebabkan kehadiran darah dalam air kencing, keradangan buah pinggang, lebihan asid urik dalam darah.

## Reaksi darah

Penurunan sel darah merah, sel darah putih dan kiraan platelet.

## Reaksi alergi dan imunologi

Pembesaran nodus limfa, keradangan saluran darah, kegatalan, ruam, lepuh, sakit mulut, dan lidah, keradangan mata.

## Reaksi metabolik dan endokrin

Kekurangan vitamin B6 atau B3, glukosa berlebihan dalam darah, asid berlebihan dalam darah, pertumbuhan payudara lelaki

## Gangguan muskuloskeletal dan penghubung tisu

Penyakit yang menyebabkan sistem imun anda menyerang sendi, kulit, organ, dan saluran darah.

## Gangguan kulit dan tisu subkutan

Kulit memerah, keradangan kulit

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami apa-apa lagi yang mungkin membuat anda berasa tidak sihat.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di sini mungkin berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara penyimpanan dan pelupusan Akurit-4

– Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan pada suhu tidak melebihi 30°C.

Jangan simpan sebarang ubat di dalam bilik mandi, atau berhampiran sinki, atau di ambang tingkap.

Jangan biarkan di dalam kereta terutamanya pada hari panas. Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat-ubatan.

Jangan gunakan ubat anda selepas tarikh luput. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

– Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

# AKURIT-4 TABLETS

Rifampin /Isoniazid /Pyrazinamide /Ethambutol Hydrochloride (150mg/75mg/400mg/275mg)

---

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem berbentuk kapsul berwarna perang dengan garisan pada satu permukaan dan kosong pada sebelah lagi.

### - Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide,  
Ethambutol Hydrochloride

Bahan tidak aktif:

Microcrystalline cellulose , Crospovidone ,  
Pregelatinized starch Ascorbic acid, Gelatin,  
Colloidal silicon dioxide , Magnesium  
stearate, Opadry 80W56578 BROWN

### - Nombor MAL MAL20051429AZ

## Pengilang

Lupin Ltd.  
A-28/1, MIDC Area, Chikalthan,  
Chhatrapati Sambhajnagar -  
431210, Maharashtra State, India

## Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.,  
Lot 5979, Jalan Teratai, 5 ½ Mile, Off Jalan  
Meru, 41050 Klang, Selangor. Malaysia

## Tarikh kemaskini RiMUP

11/04/2025

## Nombor Siri

NPRA (R4/1)050723/00060