

# PREDSONE SYRUP

Prednisolone (3mg/5ml)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Predsone
2. Bagaimana Predsone berfungsi
3. Sebelum mengambil Predsone
4. Cara menggunakan Predsone
5. Semasa menggunakan Predsone
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Predsone
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Predsone

Predsone digunakan sebagai rawatan dalam pelbagai keadaan termasuk keradangan dan alahan.

## Bagaimana Predsone berfungsi

Kortikosteroid berfungsi seperti hormon badan yang dipanggil kortisol. Ubat ini membantu mengurangkan keradangan dalam badan anda atau mengawal sistem imun anda.

## Sebelum mengambil Predsone

### - Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan Predsone Syrup jika anda mempunyai alahan kepada prednisolone atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam Predsone Syrup

Jangan gunakan Predsone Syrup jika anda ada

- Ulser mata
- Tulang rapuh
- Ulser perut atau usus atau gangguan mental
- Jangkitan melainkan dirawat dengan ubat-ubatan

### - Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai:

- Kencing manis
- Kegagalan fungsi jantung atau hati
- Tekanan darah tinggi
- Kelemahan otot
- *Pheochromocytoma* (tumor kelenjar adrenal)
- Glaukoma (peningkatan tekanan dalam mata) atau sawan

Rujuk dengan doktor anda sebelum mengambil Predsone Syrup, jika anda mempunyai: *Systemic sclerosis* (gangguan autoimun). Mengambil dos harian 15mg atau lebih boleh meningkatkan risiko komplikasi serius yang dipanggil krisis buah pinggang *scleroderma* yang boleh menyebabkan tekanan darah anda meningkat dan mengurangkan pembuangan air kecil.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda harus memberitahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat kerana ia mungkin berinteraksi dengan Predsone Syrup anda:

- Phenytoin, phenobarbitone (digunakan untuk merawat sawan)
- Efedrin (digunakan untuk merawat masalah pernafasan)
- Amphotericin B (antikulat)
- Digitalis glycosides (mengawal masalah jantung)
- Isoniazid, rifampicin (digunakan untuk merawat atau mencegah tibi)
- Mitotane (digunakan untuk merawat kanser)
- NSAIDs, salicylate (melegakan kesakitan)
- Ubat cair darah
- Ubat kencing manis
- Hormon estrogen (perancang kehamilan)

## Cara menggunakan Predsone

### - Berapa banyak harus digunakan

Keperluan dos bergantung kepada penyakit yang dirawat dan tindak balas individu.

**Dewasa:** 5-60 mg setiap hari yang dibahagikan kepada beberapa kali sehari atau dua hari sekali. Bagi terapi jangka panjang, dos tidak boleh dikekalkan melebihi 7mg kalau boleh.

**Kanak-kanak:** Seperti yang diarahkan oleh doktor.

Jangan ambil dalam jumlah yang berbeza daripada dos yang disarankan.

### - Bila perlu digunakan

Ambil ubat seperti yang dipreskripsikan oleh doktor anda.

### - Berapa lama perlu digunakan

Kanak-kanak: Untuk rawatan jangka pendek tidak lebih daripada 2 minggu, kerana ia boleh mengganggu pertumbuhan kanak-kanak.

Apabila rawatan hendak dihentikan, dos perlu dikurangkan secara beransur-ansur dalam tempoh beberapa minggu atau bulan bergantung kepada dos dan tempoh terapi.

### - Jika terlupa menggunakan

Jika anda tertinggal satu dos Predsone Syrup, ambil secepat mungkin. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan mengambil 2 dos sekaligus.

### - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

## Semasa menggunakan Predsone

### - Perkara yang perlu dilakukan

Elakkan alkohol semasa anda menggunakan prednisolone

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor anda.
- Jangan berikan Predsone Syrup kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

# PREDSONE SYRUP

Prednisolone (3mg/5ml)

- Perkara yang perlu diberi perhatian
- Elakkan dengan orang yang mengalami selsema atau jangkitan kerana prednisolone boleh menurunkan keupayaan badan anda untuk melawan jangkitan.
- Beritahu doktor anda jika anda dapati tanda dan gejala jangkitan seperti:
  - demam,
  - sakit tekak,
  - ruam,
  - menggidil.
- Jika anda menghidap diabetes, Predsone Syrup mungkin menjejaskan gula darah anda. Periksa paras gula darah dengan kerap. Tanya doktor anda sebelum anda menukar dos ubat diabetes anda.

## Kehamilan dan menyusukan anak:

Jika anda hamil, hubungi doktor anda. Anda perlu membincangkan faedah dan risiko menggunakan Predsone Syrup semasa anda hamil.

Prednisolone boleh didapati dalam susu ibu. Jika anda sedang atau akan menyusui semasa anda menggunakan prednisolone, rujuk dengan doktor anda. Penyusuan susu ibu semasa penggunaan dos yang lebih tinggi tidak disyorkan kerana kortikosteroid boleh menyebabkan kesan yang tidak diingini seperti pertumbuhan terencat.

## Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Predsone Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan termasuk

- gangguan cecair dan elektrolit,
- kelemahan otot,
- osteoporosis (tulang rapuh),
- keradangan pankreas akut,
- Sindrom *Cushing* (pertambahan berat badan, muka sembab, bonggol tisu berlemak di antara bahu),

Predsone Syrup boleh menyebabkan pertumbuhan terencat. Oleh itu, pertumbuhan dan perkembangan bayi dan kanak-kanak semasa terapi kortikosteroid yang berpanjangan perlu dipantau rapat.

Selain itu, kesan sampingan lain termasuk kitaran haid tidak teratur, katarak atau glaukoma (gangguan penglihatan), ulser perut, peningkatan tekanan dalam tisu otak dan juga saraf mata bengkok.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npa.gov.my](http://npa.gov.my) [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

## Cara penyimpanan dan pelupusan Predsone

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering di bawah suhu 30°C.

Pastikan bekas tertutup rapat. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

## Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap jernih tidak berwarna atau kuning muda dengan rasa buah.

- Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif  
Prednisolone

-Bahan tidak aktif

Gula, Air, Sorbitol 70%, Tutti fruity, Citric acid monohydrate, Propylene glycol, Sodium benzoate, Glycerin, Sodium saccharin, Disodium edetate.

- Nombor MAL:

MAL06081197AZ

## Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.  
Lot 5030, Jalan Teratai,  
5 ½ Miles off Jalan Meru  
41050 Klang, Selangor, Malaysia

## Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.  
Lot 5979, Jalan Teratai,  
5 ½ Miles off Jalan Meru  
41050 Klang, Selangor, Malaysia

## Tarikh Kemaskini RiMUP

24/07/2024

## Nombor Siri

NPRA(R4/1)200624/00076