

SULBUMIN 200 CAPSULE

Sulbutiamine (200mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sulbumin
2. Bagaimana Sulbumin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Sulbumin
4. Cara menggunakan Sulbumin
5. Semasa menggunakan Sulbumin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan Sulbumin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang and Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sulbumin

Sulbumin digunakan untuk rawatan semua bentuk fungsi asthenia (kekurangan kekuatan).

Bagaimana Sulbumin berfungsi

Sulbutiamine merupakan sejenis thiamine. Sulbutiamine melintasi halangan darah otak lebih mudah daripada vitamin B1 kerana sifat lipophilic dan meningkat pembentukan adenosina thiamine. Ia memberikan rintangan fizikal yang lebih baik, prestasi intelek yang lebih baik dan keseimbangan psikologi.

Sebelum menggunakan Sulbumin

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan ambil Sulbumin jika anda:

- Anda alah (hipersensitiviti) untuk Sulbutiamine atau mana-mana bahan-bahan lain.

Jika anda hamil, cuba untuk hamil atau fikir anda mungkin mengandung, rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Jika anda sedang menyusukan bayi, rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil ubat ini. Ini kerana Thiamine diedarkan secara meluas kepada kebanyakan tisu badan dan boleh didapati dalam susu ibu.

- Sebelum mula mengambil

Anda perlu berunding dengan doktor atau ahli farmasi jika anda:

- Alah (hipersensitiviti) kepada Sulbutiamine atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Rujuk dengan doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil:

- Ubat darah tinggi seperti furosemide, ethacrynic acid dan bumetanide.
- Pengambilan thiamin dengan makanan yang mengandungi sulfites(seperti buah-buahan kering, kerepek kentang,jem dan jus anggur).
- Pengambilan thiamine dengan teh, kopi dan kopi tanpa kafein.

Cara menggunakan Sulbumin

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan yang diberikan pada sisip dengan teliti. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

Untuk kegunaan orang dewasa sahaja. 2-3 kapsul setiap hari. Kapsul harus ditelan seluruhnya dengan segelas air yang besar, membahagikan dos antara makan pagi dan tengah hari. Tempoh rawatan adalah terhad kepada 4 minggu.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan dalam risalah product ini.

- Berapa lama perlu digunakan Seperti dos yang telah disyorkan

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil ubat dan makan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos yang berganda untuk membuat untuk dos yang tertinggal itu.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat serta-merta.

Tanda-tanda dan gejala termasuk keresahan dengan perasaan yang melampau kepada keghairahan dan rasa gegaran di kaki.

Semasa menggunakan Sulbumin

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil dos anda betul-betul seperti yang diberikan dalam risalah tersebut.

Maklumkan kepada semua doctor, doctor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda sedang menggunakan Sulbumin.

SULBUMIN 200 CAPSULE

Sulbutiamine (200mg)

Dapatkan nasihat doktor dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan Sulbumin kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Produk ini tidak memberi kesan kepada keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Sulbumin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat mereka.

- Kesan-kesan sampingan adalah:
keresahan ringan dalam orang tua.
- alahan kulit
- bau air kencing yang tidak menyenangkan. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil Sulbumin ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Sulbumin

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu dan kelembapan. 30°C. Lindungi dari cahaya

- Pelupusan

Produk tidak harus dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan Sulbumin yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk
Sulbumin:

Dua keping, warna merah tua, saiz '0' kapsul sayur-sayuran keras yang mengandungi serbuk warna putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Sulbutiamine

-Bahan tidak aktif
Sodium Starch Glycolate
Corn Starch
Colloidal Silicon Dioxide
Microcrystalline Cellulose
Magnesium Stearate

- Nombor MAL

MAL06111366X

Pengilang

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 1/2 Miles Off, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 1/2 Miles Off, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan.

Tarikh kemaskini RiMUP
Oktober 2021

Nombor Siri

BPFK(R4/1)190417/00085