

ALFA-D CAPSULE

Alfacalcidol Capsule (0.25mcg, 1.00 mcg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Alfa-D
2. Bagaimana Alfa-D berfungsi
3. Sebelum menggunakan Alfa-D
4. Cara menggunakan Alfa-D
5. Semasa menggunakan Alfa-D
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Alfa-D
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Alfa-D

Alfacalcidol digunakan untuk keadaan yang disebabkan oleh gangguan dalam metabolisme kalsium akibat daripada kekurangan pengeluaran Vitamin D3. Ia juga digunakan untuk merawat syarat-syarat berikut:

- Penyakit buah pinggang kronik, gangguan mineral dan tulang.
- Gangguan kelenjar paratiroid.
- Kelembutan dan kecacatan tulang kerana kekurangan kalsium.
- kalsium darah rendah pada bayi yang baru lahir.
- Pengurangan jisim dalam tulang dan ketumpatan

Bagaimana Alfa-D berfungsi

Ia mengandungi alfacalcidol, yang merupakan sejenis bahan seperti vitamin D yang merangsang penyerapan kalsium dan fosfat di dalam makanan dari usus dan penyerapan semula kalsium di dalam buah pinggang.

Sebelum menggunakan Alfa-D

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Alfa-D jika :

- Anda mempunyai terlalu banyak kalsium dalam darah anda (hiperkalsemia).
- Anda terlalu sensitif kepada alfacalcidol atau mana-mana bahan-bahan aktif yang lain.

Jika anda hamil, cuba untuk hamil atau fikir anda mungkin mengandung, rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Jika anda sedang menyusukan, rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil ubat ini

- Sebelum menggunakan Alfa-D

Anda perlu berunding dengan doktor atau ahli farmasi jika anda:

- Mengambil lain-lain jenis ubat dipanggil glikosida jantung, seperti digoxin.
- Jika anda mempunyai sebarang masalah dengan buah pinggang anda.
- Maklumkan kepada doktor anda jika anda menggunakan glycosides atau digitalis untuk masalah jantung anda sebelum mengambil Alfa-D Kapsul
- Doktor anda mungkin perlu memantau kalsium di darah dan tahap phosphate kerap terutamanya jika anda mempunyai masalah buah pinggang, menerima dos tinggi atau ubat ini digunakan untuk anak anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil:

- Ubat-ubat lain untuk antiepileptics, seperti carbamazepine, phenobarbital, phenytoin dan primidone.
- Rifampicin dan isoniazid.
- Corticosteroids.
- Thiazide diuretics, calcium, or phosphate.

Cara menggunakan Alfa-D

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan yang diberikan pada sisip dengan teliti. Ianya mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

Dewasa: Dos permulaan biasa adalah 1mcg sekali sehari. Dos yang mungkin diselaraskan dengan meningkatkan kepada 0.25-0.5mcg. It adalah penting bahawa tahap kalsium dalam darah dipantau. Kebanyakan orang bertindak balas terhadap dos antara 1 hingga 3 mcg setiap hari. Jika pesakit dengan penyembuhan tulang, dos boleh

dikurangkan dan dos penyelenggaraan umum adalah 0,25-1 mcg setiap hari.

Orang Tua: Dos permulaan adalah 0.5mcg sekali sehari.

Kanak-kanak antara 5 hingga 20 kg:

Dos permulaan adalah 0.05mcg/kg berat badan sekali sehari.

Kanak-kanak 20 kg dan ke atas:

Dos permulaan adalah 1mcg setiap hari.

- Bila perlu digunakan

Sentiasa telan keseluruhan kapsul dengan segelas air.

- Berapa lama perlu digunakan

Seperti dos yang telah disyorkan.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga kemudian mengambil dos dan makan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos yang berganda untuk membuat untuk dos yang tertinggal itu.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat serta-merta.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan tahap kalsium yang berlebihan (hypercalcaemia).

Semasa menggunakan Alfa-D

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil dos anda tepat seperti yang diberikan dalam risalah.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Alfa-D.

Dapatkan nasihat doktor dengan segera jika anda hamil semasa mengambil Alfa-D.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan Alfa-D untuk orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

ALFA-D CAPSULE

Alfacalcidol Capsule (0.25mcg, 1.00 mcg)

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan menggunakan mesin

Produk ini tidak memberi kesan kepada keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Alfacalcidol boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat mereka.

Kesan sampingan yang terlalu banyak kalsium dalam darah.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ini Alfa-D.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public→ Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan
Alfa-D

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. Pastikan botol ditutup dengan ketat.

- Pelupusan

Produk tidak harus dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan Alfa-D yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Alfa-D 0.25mcg Kapsul:
Dua keping, putih, saiz '2' kapsul sayur-sayuran keras yang mengandungi jisim separuh pepejal kekuningan.

Alfa-D Kapsul 1.00mcg:
Dua keping, bata merah, saiz '2' kapsul sayur-sayuran keras yang mengandungi jisim separuh pepejal kekuningan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Alfacalcidol

- Bahan tidak aktif
Colloidal Silicon dioxide
Vegetable oil
Vitamin E
Lauroyl polyoxyl-32 glycerides

- Nombor MAL

Alfa-D 0.25mcg Capsules:

MAL10120049X

Alfa-D 1.00mcg Capsules:

MAL09061594X

Pengilang

PAHANG PHARMACY SDN.BHD.
Lot 5979, Jalan Teratai, 5 ½ Miles Off,
Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan.

Pemegang Pendaftaran Produk

PAHANG PHARMACY SDN.BHD.
Lot 5979, Jalan Teratai, 5 ½ Miles Off,
Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan.

Tarikh kemaskini RiMUP

01/04/2017

Nombor Siri

BPFK(R4/1)010417/00043