

CANDIFORCE-100

Itraconazole/Itraconazole Capsules 100mg

What is in this leaflet

1. Apakah kegunaan Candiforce-100 (Itraconazole Capsules 100mg)
2. Bagaimana Candiforce-100 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Candiforce-100
4. Cara menggunakan Candiforce-100
5. Semasa menggunakan Candiforce-100
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan & pelupusan Candiforce-100
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Candiforce-100

Kapsul Candiforce-100 digunakan untuk jangkitan yang disebabkan oleh kulat atau yis pada orang dewasa. Ia digunakan untuk:

- Jangkitan mulut atau faraj menyebabkan 'thrush'
- jangkitan kulit
- Jangkitan yang menjejaskan bahagian badan yang lain

Tompok kulit mungkin mengambil masa beberapa minggu untuk benar-benar bersih selepas anda selesai rawatan anda dengan Candiforce-100. Kuku jari kaki dan jari kaki mungkin mengambil masa beberapa bulan untuk dibersihkan sepenuhnya. Ini kerana kulit atau kuku anda akan kelihatan normal selepas kulit atau kuku baru tumbuh, walaupun ubat telah membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan

Bagaimana Candiforce-100 berfungsi

Candiforce-100 mengandungi Itraconazole. Ini tergolong sekumpulan ubat-ubatan yang disebut 'antifungal'.

Candiforce-100 berfungsi dengan membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan.

Doktor anda mungkin telah menetapkan ubat ini untuk sebab lain. Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai mengapa ubat ini telah ditetapkan untuk anda.

Sebelum menggunakan Candiforce-100

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah (hipersensitif) ke Itraconazole.
- Jika anda alah (hipersensitif) ke mana-mana ramuan lain dalam ubat ini.

Berbincang dengan doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini

- Jika anda pernah mengalami masalah buah pinggang. Dos anda Candiforce-100 mungkin perlu ditukar
- Sekiranya anda mengalami masalah hati seperti kulit kuning (penyakit kuning). Dos anda Candiforce-100 mungkin perlu ditukar. Jika selepas mengambil ubat ini, anda mengalami kekurangan selera makan yang teruk, berasa sakit (loya), sakit (muntah), berasa lelah, sakit perut, kelemahan otot, menguning kulit atau putih mata, air kencing yang luar biasa, najis pucat atau keguguran rambut, berhenti mengambil Candiforce-100 dan beritahu doktor anda dengan segera
- Sekiranya anda mengalami masalah jantung termasuk kegagalan jantung (juga dikenali sebagai kegagalan jantung kongestif atau CHF). Candiforce-100 boleh menjadikannya lebih teruk. Jika selepas mengambil ubat ini, anda akan mendapat mana-mana yang berikut:
 - Nafas yang pendek
 - Berat badan naik yang tidak dijangka
 - Pembengkakan kaki atau perut
 - Merasa sangat penat
 - bangun sesak nafas pada waktu malam berhenti mengambil Candiforce-100 dan beritahu doktor anda dengan segera. Ini mungkin tanda-tanda kegagalan jantung

- Jika anda menghidapi *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) atau imun system anda tidak berfungsi sewajarnya,
- Sekiranya anda mengalami tindak balas alergi terhadap produk antikulat yang lain pada masa lalu

Kanak-kanak dan orang tua

Kapsul Candiforce-100 biasanya tidak diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun atau orang tua. Walau bagaimanapun, doktor anda mungkin menetapkan dalam kes-kes khas.

Kehamilan dan penyusuan

Sila dapatkan nasihat doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil Candiforce-100:

- Jangan ambil Candiforce-100 jika anda mengandung kecuali doktor anda telah memberitahu anda. Anda harus menggunakan kontrasepsi untuk memastikan anda tidak hamil ketika mengambil ubat ini
- Ubat dalam Candiforce-100 kekal di dalam badan anda untuk beberapa lama selepas anda berhenti mengambilnya. Selepas rawatan anda selesai, anda mesti menggunakan kontrasepsi sehingga tempoh seterusnya anda (berdarah haid). Dapatkan nasihat doktor tentang jenis kontrasepsi yang hendak digunakan
- Jika anda hamil selepas memulakan rawatan Candiforce-100, hentikan mengambilnya dan beritahu doktor anda dengan segera
- Jangan menyusukan anak jika anda mengambil Candiforce-100, sebahagian kecil ubat ini boleh memasuki ke dalam susu anda. Tanya doktor anda untuk mendapatkan nasihat jika anda menyusukan anak.

- Sebelum menggunakan Candiforce-100

- Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap apa-apa ubat, makanan, pengawet atau pewarna lain

CANDIFORCE-100

Itraconazole/Itraconazole Capsules 100mg

- Beritahu doktor anda jika anda merancang untuk hamil atau menyusukan bayi.
- Beritahu doktor anda, jika anda sudah mengambil apa-apa ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru mengambil atau mungkin akan mengambil sebarang ubat lain. Ini termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi atau ubat-ubatan herba.

Terutamanya, jangan ambil senarai ubat berikut dengan Candiforce-100 dan beritahu doktor anda jika anda mengambil mana-mana:

- Ubat untuk demam alergi atau alahan yang dipanggil *terfenadine*, *astemizole* atau *mizolastine*
- Ubat untuk menurunkan kolesterol dipanggil *lovastatin* atau *simvastatin*
- Ubat untuk denyutan jantung yang tidak teratur yang dipanggil *quinidine*, *disopyramide*, *dronedarone* atau *dofetilide*
- Ubat yang digunakan untuk mengubati angina (sakit dada) dan tekanan darah tinggi yang disebut *bepiridil*, *felodipine*, *lercanidipine*, *ivabradine*, *ranolazine* dan *nisoldipine*
- Ubat untuk sakit kepala migrain dipanggil *dihydroergotamine* dan *ergotamine*.
- Ubat untuk rawatan penyalahgunaan dadah dipanggil *levacetylmethadol* dan *methadone*
- *Cisapride* – untuk masalah pencernaan
- *Colchicine* (pada pesakit dengan masalah buah pinggang dan hati juga) - untuk gout
- *Eplerenone* – *diuretic*
- *Ergometrine* (*ergonovine*) dan *metilergometrine* (*methylergonovine*) - digunakan selepas melahirkan
- *Halofantrine* – untuk malaria
- *Irinotecan* – untuk kanser
- *Midazolam* (oleh mulut) atau *triazolam* - untuk kegelisahan atau untuk membantu anda tidur

- *Pimozide*, *lurasidone* dan *sertindole* - untuk keadaan yang mempengaruhi fikiran, perasaan dan kelakuan

Jangan mula mengambil Candiforce-100 dan beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa perkara di atas. Juga, setelah menyelesaikan tempoh pengambilan Candiforce-100, jangan ambil ubat yang disenaraikan di atas selama 2 minggu.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubat berikut kerana mereka tidak disyorkan dengan Candiforce-100 melainkan jika doktor anda merasa perlu.

- Ubat untuk rawatan kanser yang dipanggil *dasatinib*, *nilotinib* dan *trabectedin*
- *Aliskiren* - untuk tekanan darah tinggi
- *Colchicine* – untuk gout
- *Everolimus* - biasanya diberikan selepas pemindahan organ
- *Fentanyl* - ubat tahan sakit yang kuat
- *Rivaroxaban* - ubat untuk darah tipis
- *Salmeterol* - untuk asma dan masalah pernafasan yang lain
- *Tamsulosin* - masalah lemah kawalan kencing pada lelaki
- *Vardenafil* - untuk masalah ereksi

Juga, setelah menyelesaikan rawatan Candiforce-100, jangan ambil ubat yang disenaraikan di atas selama 2 minggu.

Jangan mengambil mana-mana ubat yang berikut 2 minggu sebelum dan semasa anda mengambil Candiforce-100 melainkan jika doktor anda memberitahu anda sebaliknya:

- Ubat untuk tuberkulosis dipanggil *rifampicin*, *rifabutin* atau *isoniazid*
- Ubat untuk epilepsi dipanggil *carbamazepine*, *phenytoin* atau *phenobarbital*

- Ubat untuk merawat jangkitan virus yang dipanggil *efavirenz* atau *nevirapine*

Cara menggunakan Candiforce-100

Sentiasa ambil ubat ini sama seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Mengambil Candiforce-100:

- Sentiasa ambil Candiforce-100 selepas makan kerana ini membantu badan anda menggunakan ubat
- Telan kapsul keseluruhan dengan sedikit cecair
- Perlu ada asid yang cukup dalam perut anda untuk memastikan bahawa tubuh anda boleh menggunakan ubat itu. Ubat untuk senak, ulser perut atau pedih ulu hati boleh menjejaskan perut yang menghasilkan asid. Atas sebab ini anda perlu menunggu dua jam selepas mengambil Candiforce-100 sebelum mengambil mana-mana ubat-ubatan lain. Sekiranya anda mengambil ubat yang menghalang pengeluaran asid perut, anda perlu mengambil Candiforce-100 dengan minuman cola

-Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak untuk mengambil Candiforce-100.

-Bila perlu digunakan

Doktor anda akan memberitahu anda apabila menggunakan Candiforce-100.

-Berapa lama perlu digunakan

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak Candiforce-100 yang diambil dan berapa lama bergantung kepada jangkitan anda.

-Jika terlupa menggunakan

- Jika anda terlupa mengambil kapsul anda, ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Walau

CANDIFORCE-100

Itraconazole/Itraconazole Capsules 100mg

bagaimanapun, jika hampir masanya untuk kapsul seterusnya, langkau kapsul yang tidak dijawab.

- Jangan mengambil dos berganda untuk membuat dos terlupa.

Sekiranya anda mempunyai soalan lanjut tentang penggunaan ubat ini, sila hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

–Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Candiforce-100

–Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa ambil Candiforce-100 seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.
- Sila beritahu doktor atau ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda menggunakan Candiforce-100.
- Sila beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

–Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali jika dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.
- Jangan memberikan Candiforce-100 kepada sesiapa sahaja, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

–Perkara yang perlu diberi perhatian

- Candiforce-100 kadang-kadang boleh menyebabkan pening, penglihatan kabur / penglihatan berganda atau hilang pendengaran. Jika anda mengalami gejala ini jangan memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Candiforce-100 boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya..

Kesan sampingan yang penting untuk diperhatikan:

Anda mesti mendapatkan bantuan perubatan segera jika anda mempunyai gejala berikut.

- Tanda-tanda alergi yang ketara seperti ruam, gatal-gatal (juga dikenali sebagai ruam *nettle* atau *urticaria*), kerengsaan kulit yang teruk, bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian badan yang lain. Ini mungkin tanda-tanda reaksi alergi yang teruk. Ini hanya berlaku dalam sebilangan kecil orang
- Gangguan kulit yang teruk dengan menggelupas dan / atau ruam dengan pustula kecil (dengan demam) atau melepuh kulit, mulut, mata dan alat kelamin, dengan demam, menggigil, sakit otot dan secara amnya berasa tidak sihat. (Ini jarang berlaku)
- Rasa sesemut, kebas atau kelemahan pada anggota badan anda. (Ini jarang berlaku)
- Kekurangan selera makan, merasakan sakit (mual), sakit (muntah), keletihan yang luar biasa, sakit perut, kelemahan otot, kekuningan kulit atau putih mata anda (sakit kuning), air kencing gelap, najis pucat atau keguguran rambut. Ini mungkin tanda-tanda masalah hati. (Ini hanya berlaku dalam sebilangan kecil orang)
- Sesak nafas, kenaikan berat badan yang tidak dijangka, bengkak kaki atau perut anda, berasa sangat letih atau sesak nafas pada waktu malam. Ini mungkin tanda-tanda kegagalan

jantung. Sesak nafas juga boleh menjadi tanda paru-paru berair. (Ini jarang berlaku).

Kesan sampingan lain yang mungkin berlaku:

Biasa (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 10 orang)

- Sakit perut, berasa sakit (loya)
- Sakit kepala

Tidak biasa (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 100 orang)

- Masalah haid
- Sinusitis, hidung berair, batuk dan selesema
- Sembelit, cirit-birit, angin, sakit (muntah), ketakcernaan

Jarang (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 1000 orang)

- Kenaikan dalam ujian fungsi hati (ditunjukkan melalui ujian darah)
- Kencing yang tidak dijangka atau perlu buang air kencing lebih kerap
- Masalah dengan penglihatan termasuk penglihatan kabur dan penglihatan berganda
- Bertukar selera
- Masalah darah tertentu yang boleh meningkatkan risiko jangkitan
- Berdengung di telinga
- Kehilangan pendengaran (mungkin kekal)
- Kesakitan perut yang teruk, sering berasa loya dan muntah (keradangan pankreas)
- Bengkak kerana cecair di bawah kulit
- Kehilangan rambut yang teruk atau penipisan (*alopecia*)
- Tahap trigliserida yang tinggi dalam darah (ditunjukkan melalui ujian darah)
- kulit merah, gatal, atau mengelupas kulit
- Kulit sensitif kepada cahaya
- Kesukaran ereksi

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus

CANDIFORCE-100

Itraconazole/Itraconazole Capsules 100mg

kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web <http://npra.moh.gov.my> [Orang Awam → Laporan Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) or Vaksin(AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Candiforce-100

- Penyimpanan

- Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak.
- Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada label. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan itu.
- Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya & kelembapan

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang di dalam air sisa atau dalam sisa rumah. Sila tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang apa-apa ubat yang anda tidak perlukan lagi. Jika anda melakukan ini, anda akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Saiz "0el" kapsul keras gelatin putih putih yang dipenuhi dengan pelet putih berwarna krim. Candiforce-100 dibekalkan dalam pek padu sebanyak 30 kapsul

- Bahan-bahan

- Bahan aktif

- Itraconazole Ph. Eur. - 100 mg (As Itraconazole Pellets)

- Bahan tidak aktif

- Sugar Spheres, Hypromellose, Polyethylene Glycol, Methylene Chloride, Dehydrated Alcohol (Ethanol).
- Capsule Shell: Gelatin, Titanium Dioxide

Candiforce-100 mengandungi:

Gula: Jika doktor memberitahu anda bahawa anda tidak toleran dengan beberapa gula, hubungi mereka sebelum mengambil ubat ini.

Sila tanya doktor anda jika anda bimbang tentang mana-mana ramuan dalam ubat ini.

- Nombor MAL:

MAL20076044ACZ

Pengilang

Cohance Lifesciences Limited,
FDF Unit-I, Plot No. A-19/C, A-23A & A-23B, Road no. 18, IDA., Nacharam Village, Uppal Mandal, Medchal-Malkajgiri District- 500076 Telangana State, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 1/2 A Miles off Jalan Meru,
41050 Kiang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini

31/07/2023

Nombor siri

NPRA(R2/1)230606/1081

Maklumat penting mengenai beberapa ramuan Candiforce-100: