

DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g

(Diosmectite 3g)

1. Apakah yang ada pada risalah ini
2. Apakah kegunaan DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g
3. Bagaimana DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g berfungsi
4. Sebelum mengambil DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g
5. Cara menggunakan DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g
6. Semasa menggunakan DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g
7. Kesan-kesan sampingan
8. Cara penyimpanan dan
9. pelupusan DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g
10. Maklumat lanjut
11. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
12. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DIMECTAL

- Rawatan cirit-birit akut pada orang dewasa dan kanak-kanak di atas 2 tahun, selain rehidrasi oral
- Rawatan simptomatik cirit-birit fungsional kronik pada orang dewasa.
- Rawatan simptomatik kesakitan yang berkaitan dengan penyakit usus yang berfungsi pada orang dewasa.

Bagaimana DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g berfungsi.

DIMECTAL mengekalkan cirinya dengan salutan yang kuat pada mukosa gastrointestinal kerana struktur brosurinya dan kelikatan plastik yang tinggi. DIMECTAL meningkatkan ketahanan gel mukosa sebagai tindak balas kepada agen agresif dan dengan berinteraksi dengan glikoprotein lendir. Dengan tindakannya pada penghalang mukus gastrointestinal dan kapasiti percantuman yang tinggi, DIMECTAL melindungi mukosa gastrousus. DIMECTAL adalah radiolucen, tidak mewarna najis dan, pada dos biasa, tidak mengubah masa transit usus fisiologi

DIMECTAL adalah anti-cirit birit yang menyerap dan menyingkirkan toksin, bakteria, virus dan parasit dari dinding usus serta kelebihan air di usus untuk mengurangkan najis yang longgar dan berair. Produk ini juga memperbaiki, meregenerasi, dan menyembuhkan lapisan lendir usus yang telah rosak akibat cirit-birit. Dengan membuat penghalang pada lapisan usus, melindungi usus daripada racun, bakteria, virus dan parasit, dan mengurangkan radang usus. Oleh itu, pergerakan peristaltik saluran pencernaan (termasuk usus) dinormalisasi - memulihkan dan mengatur persekitaran usus yang sihat, yang kondusif bagi mikroflora usus untuk mengumpul semula dan mendiami.

Sebelum menggunakan DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g

Bila tidak boleh menggunakan

- Tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah 2 tahun
- jika anda alah kepada bahan aktif atau mana-mana bahan lain dari ubat ini (disenaraikan dalam ramuan).

Amaran dan langkah berjaga-jaga

- Jika anda mempunyai intoleransi fruktosa keturunan jarang, sindrom glukosa / galaktosa atau kekurangan sucrase / isomaltase.
- Diosmectite mesti digunakan dengan berhati-hati oleh pesakit yang mengalami sembelit kronik yang teruk

- Sebelum mula menggunakan

Sebelum anda mula menggunakannya Bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan DIMECTAL

- Sekiranya anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anda mempunyai sikap tidak bertoleransi terhadap gula tertentu,
- jika anda pernah mengalami sembelit akut.
- jika gejala cirit-birit akut tidak lega dalam masa tiga hari

- jika demam atau muntah tinggi disertai dengan sakit.

Kanak-kanak dan remaja

Untuk mengelakkan dehidrasi akibat cirit-birit, kanak-kanak dan bayi dengan cirit-birit perlu diberikan sokongan rehidrasi oral segera.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Oleh kerana sifat penyerap DIMECTAL boleh menjejaskan masa dan / atau tahap penyerapan bahan-bahan lain, tidak disyorkan untuk mengambil DIMECTAL dengan ubat lain tetapi untuk meninggalkan jurang sekurang-kurangnya dua jam sebelum atau selepas mengambil ubat lain. Beritahu doktor anda jika anda menggunakan, baru-baru ini telah menggunakan, atau merancang untuk menggunakan mana-mana ubat lain, termasuk ubat yang berlebihan

Cara menggunakan DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g

Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan ubat ini dengan tepat seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Rawatan Cirit-birit Akut

Kanak-kanak:

Pada kanak-kanak dari 2 tahun: 4 sachet sehari selama 3 hari, kemudian 2 sachet sehari. (Maksimum 7 hari)

Dewasa: Purata 3 sachet sehari. Dalam praktiknya, dos harian dapat dua kali ganda pada awal rawatan. (Hingga 7 hari maksimum)

Indikasi lain:

Dewasa: Purata 3 sachet sehari.

Kaedah Pengambilan:

Kanak-kanak: Kandungan sachet dapat ditambahkan dan diaduk dengan teliti ke dalam botol makanan dengan 50 ml air, untuk diberikan pada siang hari, atau dicampur dengan makanan separa cair: kaldu, buah rebus, sayur tumbuk atau makanan bayi.

DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g

(Diosmectite 3g)

Dewasa

Isi satu sachet hendaklah diaduk dengan teliti dalam setengah gelas air sebelum mengambil.

Bila perlu digunakan

Anda harus mengambil ubat ini sebaik-baiknya di antara hidangan dalam tanda-tanda lain.

Berapa lama perlu digunakan

Sekiranya gejala tidak bertambah baik dalam masa 7 hari, anda harus berjumpa dengan doktor anda.

- Jika mengguna berlebihan (terlebi dos)

Mengambil terlalu banyak DIMECTAL boleh menyebabkan sembelit. Sembelit biasanya akan hilang apabila rawatan dihentikan atau apabila dos dikurangkan. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g

Sentiasa gunakan ubat ini dengan tepat seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti

Kesan-kesan sampingan

Kes-kes perkembangan yang sangat jarang berlaku atau kemerosotan sembelit telah dilaporkan; rawatan dapat diteruskan selepas mengurangkan dos. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan DIMECTAL Powder for Oral Suspension 3g

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi

rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Rupa serbuk:

Serbuk kelabu yang berkrim

Rupa suspension:

Cecair Suspension kelabu berkrim yang mempunyai rasa oren.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Diosmectite

- Bahan tidak aktif

Refined sugar

Dextrose anhydrous

Sucralose

Orange flavour

Colloidol silicone dioxide

- Nombor MAL:

MAL21036016XC

Pengilang

NORIPHARMA SDN. BHD.^(792633A)

Lot 5030, Jalan Teratai. 51/2 Mile Off

Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor,

Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

PAHANG PHARMACY SDN.

BHD.^(10826-K)

Lot 5979, Jalan Teratai. 51/2 Mile Off

Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor,

Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

16/04/2024

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/030