

CORIFED TABLET

Consumer Medication Information Leaflet (RiMUP)

Triprolidine Hydrochloride 2.5mg/Pseudoephedrine Hydrochloride 60mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CORIFED
2. Bagaimana CORIFED berfungsi
3. Sebelum mengambil CORIFED
4. Cara menggunakan CORIFED
5. Semasa menggunakan CORIFED
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CORIFED
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan CORIFED

CORIFED digunakan untuk melegakan tanda-tanda selsema dan alahan seperti hidung berair, mata berair, kesesakan hidung, sinus tersumbat.

2. Bagaimana CORIFED berfungsi

Tablet mengandungi pseudoephedrine hydrochloride, iaitu sejenis 'decongestant' yang mengecutkan bengkak membran mukus hidung, mengurangkan hyperemia hidung, melegakan hidung, edema dan kesesakan sinus dan meningkatkan potensi saluran pernafasan hidung. Triprolidine hydrochloride adalah antihistamin yang mengurangkan histamine kimia semula jadi di dalam badan dan membantu menghentikan bersin, hidung berair dan mata berair. Ia juga mempunyai tindakan anticholinergic dan memberi kesan pengeringan pada mukosa hidung.

3. Sebelum anda mengambil CORIFED

Sebelum mula untuk mengambilnya:

- Jika anda mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi atau penyakit jantung yang teruk
- Jika anda pernah mempunyai tindak balas yang buruk kepada mana-mana bahan-bahan.
- Jika anda mengambil, atau telah diambil dalam dua minggu lepas,

ubat untuk kemurungan dikenali sebagai perencat oxidase Monoamine (MAOIs) seperti isocarboxazid phenelzine, rasagiline, selegiline atau tranylcypromine

Sebelum anda bermula untuk mengambil:

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai

- masalah buah pinggang atau hati.
- tekanan darah tinggi atau penyakit jantung.
- kencing manis atau jika anda diberitahu oleh doktor anda bahawa anda mempunyai toleransi terhadap gula.
- kelenjar tiroid yang terlalu aktif.
- glaukoma (peningkatan tekanan dalam mata).
- masalah prostat (kesukaran membuang air kencing atau perlu untuk membuang air kencing sering).
- mengambil alkohol.
- hamil atau bercadang untuk hamil semasa rawatan
- menyusu bayi.

Jika anda mengambil ubat-ubatan lain:

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat-ubatan lain termasuklah ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

- Ubat antihipertensi (ubat yang digunakan untuk penyakit darah tinggi seperti guanethidine, methyl dopa, alfa dan beta blocker, debrisoquine, bretylium dan betanidine)..
- ubat-ubatan sympathomimetic (perangsang atau suppressants selera makan dan ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat kesesakan dan asma).
- Tricyclic antidepresan (yang digunakan untuk merawat kekeliruan mood).
Mungkin ada ubat-ubatan lain yang boleh berinteraksi dengan pseudoephedrine dan triprolidine. Memberitahu doktor mengenai

semua ubat-ubatan yang anda gunakan.

4. Cara menggunakan CORIFED

Berapa banyak harus diambil:

Ambil seperti doktor memberitahu anda. Jika anda tidak pasti, sila semak dengan doktor atau ahli farmasi anda. Ikut arahan pada label preskripsi anda. Dos yang disyorkan adalah:

Dewasa dan kanak-kanak lebih 12 tahun: 1 tablet tiga kali sehari
Kanak-kanak 6 - 12 tahun : ½ tablet tiga kali sehari.

- Telan keseluruhan tablet dengan segelas penuh air.

Bila perlu diambil:

CORIFED mesti diambil dengan makanan.

Berapa lama perlu diambil:

Gunakan ubat ini betul-betul seperti yang diarahkan pada label, atau seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Jangan menggunakan ubat-ubatan dalam jumlah yang lebih besar, atau menggunakannya untuk lebih lama daripada yang disyorkan. Ubat selsema biasanya diambil hanya untuk masa yang singkat sehingga anda sembuh.

Jika anda mengambil terlalu banyak

Anda mungkin mengalami peningkatan dalam kesan-kesan sampingan dan keterukan. Hubungi doktor anda jika anda mengambil tablet yang lebih daripada apa yang perlu anda lakukan.

Gejala dos berlebihan mungkin termasuk rasa resah atau gementar, rasa loya, muntah, sakit perut, pening, mengantuk, kering mulut, kehangatan atau sawan.

5. Semasa menggunakan CORIFED

CORIFED TABLET

Consumer Medication Information Leaflet (RiMUP)

Triprolidine Hydrochloride 2.5mg/Pseudoephedrine Hydrochloride 60mg

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Elakkan memandu atau melakukan apa-apa yang memerlukan anda dalam keadaan sedar dan berjaga-jaga.
- Elakkan minum arak. Ia boleh meningkatkan kesan-kesan sampingan ubat-ubatan ini.
- Elakkan daripada mengambil pil diet, pil kafein, atau perangsang lain (seperti ubat-ubatan ADHD) tanpa nasihat doktor anda
- Mengambil ubat perangsang bersama-sama dengan decongestant boleh meningkatkan risiko kesan sampingan yang tidak menyenangkan
- Jangan gunakan ubat selsema orang lain, ubat alergi, atau ubat tidur tanpa terlebih dahulu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi. Jika anda mengambil produk-produk tertentu bersama-sama, anda secara tidak sengaja boleh mengambil terlalu banyak ubat-ubatan tertentu. Baca label pada ubat lain yang anda gunakan untuk melihat jika ia mengandungi antihistamin atau decongestant

6. Kesan-kesan sampingan

Semua ubat-ubatan termasuk CORIFED boleh menyebabkan reaksi alahan. Anda perlu menghubungi doktor dengan segera jika mengalami mana-mana gejala berikut selepas mengambil CORIFED:

- Halusinasi
- Ruam pada kulit
- Masalah prostat pada lelaki (Mempunyai masalah untuk membuang air kecil)
- Keresahan, kesukaran untuk tidur atau mimpi buruk
- Mengantuk

Jika anda mempunyai mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak termasuk di dalam risalah ini atau tidak pasti tentang apa-apa, bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [Consumers-> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

7. Cara penyimpanan dan pelupusan CORIFED

Penyimpanan : Simpan pada suhu bawah 30°C.

Pelupusan : Ubat-ubatan tidak boleh dibuang ke dalam sistem saliran atau sisa domestik. Tanyakan ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

8. Penerangan Produk **Rupa dan warna produk**

Tablet bulat berwarna kuning berbentuk dengan selaras skor di satu sisi

MAL NO: MAL13025047AZ

9. Pengilang:

Noripharma Sdn. Bhd. (792633-A)
Lot 5030 Jalan Teratai, 5 ½ Miles off
Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP: July 2022

NPRA(R2/2)220422/876