

MARIXINO

Memantine hydrochloride film-coated tablets (10 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apa kegunaan *Marixino*
2. Bagaimana *Marixino* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Marixino*
4. Cara menggunakan *Marixino*
5. Semasa menggunakan *Marixino*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Marixino*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apa kegunaan *Marixino*

Marixino mengandungi bahan aktif *memantine hydrochloride*. Ia tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai ubat anti-dementia. *Marixino* digunakan untuk merawat pesakit yang mengalami penyakit Alzheimer yang sederhana kepada teruk.

Bagaimana *Marixino* berfungsi

Hilang ingatan atau nyanyuk dalam penyakit Alzheimer adalah disebabkan oleh gangguan isyarat maklumat dalam otak. Otak mempunyai saraf penerima yang dipanggil reseptor-N-methyl-D-aspartate (NMDA). Saraf ini terlibat dalam menghantar isyarat saraf yang penting dalam pembelajaran dan ingatan. *Marixino* tergolong dalam golongan ubat-ubatan yang dipanggil penentang (antagonis) reseptor-NMDA. *Marixino* bertindak keatas reseptor-NMDA tersebut dan meningkatkan transmisi isyarat saraf dan memori

Sebelum menggunakan *Marixino*

- Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda alah kepada *memantine* atau mana-mana bahan lain ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan mengambil *Marixino* jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung. Jika anda mengandung ketika mengambil *Marixino* berhenti mengambilnya dengan segera dan hubungi doktor anda.

Penggunaan *Memantine* pada wanita hamil tidak digalakkan.

Jangan mengambil *Marixino* jika anda menyusukan anak. Wanita yang mengambil *Marixino* tidak sepatutnya menyusukan anak. Tanya doktor atau

ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakan

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil *Marixino*:

- jika anda mempunyai sejarah serangan epilepsi
- jika baru-baru ini anda mengalami infarksi miokardium (serangan jantung), atau jika anda mengalami kegagalan jantung kongestif (lemah jantung) atau tekanan darah tinggi yang tidak terkawal (tekanan darah tinggi).

Dalam keadaan ini, rawatan perlu diawasi, dan manfaat klinikal *Marixino* dinilai semula oleh doktor anda secara berkala.

Jika anda mengalami kegagalan buah pinggang (masalah buah pinggang), doktor anda perlu mengawasi fungsi buah pinggang anda dan jika perlu, menyesuaikan dos *Memantine* sewajarnya

Penggunaan produk perubatan dipanggil *amantadine* (untuk rawatan penyakit Parkinson), *ketamin* (bahan umumnya digunakan sebagai ubat bius), *dextromethorphan* (biasanya digunakan untuk merawat batuk) dan lain penentang (antagonis) NMDA pada masa yang sama perlu dielakkan.

Kanak-kanak dan remaja

Marixino tidak disyorkan untuk kanak-kanak dan remaja di bawah umur 18 tahun disebabkan kekurangan data berkaitan keselamatan dan keberkesanan.

Marixino mengandungi laktosa.

Pesakit dengan masalah penyakit keturunan yang jarang berlaku seperti intoleransi galaktosa, Lapp kekurangan laktase atau glukosa-galaktosa malabsorpsi tidak sepatutnya mengambil ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Secara khususnya, *Marixino* boleh mengubah kesan ubat-ubatan berikut dan dos mereka mungkin perlu diselaraskan oleh doktor anda:

- Amantadine (bahan yang digunakan untuk merawat Parkinson's disease), ketamine (bahan yang digunakan dalam ubat bius), dextromethorphan (bahan yang digunakan untuk merawat batuk)
- dantrolene, baclofen (bahan yang digunakan untuk melegakan kejang otot)
- cimetidine, ranitidine (bahan yang digunakan untuk merawat pengeluaran asid perut), procainamide, quinidine (bahan yang digunakan untuk merawat degupan jantung tidak teratur), quinine (bahan yang digunakan untuk merawat malaria), nicotine
- hydrochlorothiazide (atau mana-mana kombinasi dengan hydrochlorothiazide)
- anticholinergics (bahan biasanya digunakan untuk merawat gangguan pergerakan atau kekejangan usus)
- phenytoin (bahan-bahan yang digunakan untuk mencegah dan melegakan sawan)
- barbiturates (bahan umumnya digunakan untuk mendorong tidur)
- dopaminergic agonists (bahan-bahan seperti L-dopa yang digunakan untuk merawat Parkinson's disease)
- neuroleptics (bahan-bahan yang digunakan dalam rawatan gangguan mental)
- oral anticoagulants (seperti warfarin yang digunakan untuk mengelakkan darah beku)

Jika anda pergi ke hospital, beritahu doktor anda bahawa anda mengambil *Marixino*.

Cara menggunakan *Marixino*

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Ianya mungkin berbeza dari maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak faham arahan pada label, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

Dos *Marixino* yang disyorkan untuk orang dewasa dan orang yang lebih tua adalah 20 mg sekali sehari. Dalam

MARIXINO

Memantine hydrochloride film-coated tablets (10 mg)

usaha untuk mengurangkan risiko kesan sampingan dos ini dicapai secara beransur-ansur oleh skim rawatan harian yang berikut:

Minggu 1	Setengah tablet 10 mg
Minggu 2	Satu tablet 10 mg
Minggu 3	Satu dan setengah tablet 10 mg
Minggu 4	Dua tablet 10 mg sekali sehari

Dos permulaan yang biasa adalah setengah tablet sekali sehari (1x 5 mg) untuk minggu pertama. Ini meningkat kepada satu tablet sekali sehari (1x 10 mg) pada minggu kedua dan untuk 1 setengah tablet sekali sehari (1x 15 mg) pada minggu ketiga. Pada minggu keempat dan seterusnya dos yang biasa ialah 2 tablet sekali sehari (1x 20 mg).

Dos untuk pesakit dengan kegagalan fungsi buah pinggang

Jika anda mengalami kegagalan fungsi buah pinggang, doktor anda akan membuat keputusan berkenaan dos yang sesuai dengan keadaan anda. Dalam kes ini, pemantauan fungsi buah pinggang anda perlu dilakukan oleh doktor anda pada selang masa yang ditetapkan.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Marixino perlu diberikan secara oral sekali sehari. Untuk mendapat manfaat daripada perubatan anda, anda perlu mengambilnya secara berkala setiap hari pada masa yang sama dalam sehari. Tablet perlu ditelan dengan air. Tablet boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Marixino selagi ia memberi manfaat kepada anda. Doktor anda perlu menilai rawatan anda secara berkala.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan

ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal..

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan kesan-kesan sampingan seperti tersenarai di bahagian “Kesan-kesan sampingan” dibawah.

Semasa menggunakan Marixino

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Marixino.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Marixino dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Marixino mungkin mengubah kereaktifan anda, menjadikan aktiviti memandu dan mengendalikan jentera tidak sesuai. Jika ubat ini menyebabkan anda berasa sakit, pening atau letih atau menyebabkan anda sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Marixino boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Secara umum, kesan sampingan yang diperhatikan berkadar adalah ringan kepada sederhana.

Biasa:

Sakit kepala, rasa mengantuk, sembelit, ujian fungsi hati meningkat, pening, gangguan keseimbangan, sesak nafas, tekanan darah tinggi dan hipersensitiviti kepada ubat.

Penyakit Alzheimer telah dikaitkan dengan kemurungan, kecenderungan untuk membunuh diri dan membunuh diri. Peristiwa-peristiwa ini telah dilaporkan dalam pesakit yang dirawat dengan Marixino.

Jika mana-mana kesan sampingan semakin serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda tidak merasa sihat semasa anda mengambil ubat ini, walaupun anda fikir masalah ini tidak berkaitan dengan perubatan.

Jangan bimbang dengan senarai kesan-kesan sampingan ini. Anda mungkin tidak akan mengalami mana-mana kesan sampingan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.moh.gov.my (Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Marixino

- Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak. Jangan simpan pada suhu melebihi 30° C.

MARIXINO

Memantine hydrochloride film-coated tablets (10 mg)

Jangan gunakan ubat anda selepas tarikh luput yang dinyatakan pada pek selepas 'EXP'. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Putih, berbentuk bujur, tablet bersalut film dwi-cembung dan bergaris pada satu sisi. Tablet boleh dibahagikan kepada dos yang sama.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Setiap tablet bersalut film mengandungi 10 mg *memantine hydrochloride*.

Bahan-bahan tidak aktif

Teras tablet mengandungi: *lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, anhydrous colloidal silica, talc, magnesium stearate*.

Salutan film mengandungi: *methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1), sodium laurilsulfate, polysorbate 80, talc, triacetin, simeticone*.

- MAL number:

MAL18116142AZ

Pengilang

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto, Slovenia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai, 5 ½ Miles off
Jalan Meru, Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Tarikh kemaskini RiMUP

05/06/2018

Nombor siri

NPRA(R2/1)200407/418