

Dasselta Film-coated Tablets

Desloratadine (5 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Dasselta*
2. Bagaimana *Dasselta* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Dasselta*
4. Cara menggunakan *Dasselta*
5. Semasa menggunakan *Dasselta*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Dasselta*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Dasselta*

Dasselta mengandungi desloratadine yang merupakan anti histamin. *Dasselta* Merupakan ubat anti-alahan yang tidak menyebabkan anda mengantuk. Ia membantu mengawal gejala dan tidak balas alahan.

Dasselta adalah untuk kegunaan orang dewasa dan remaja (12 tahun ke atas).

Bagaimana *Dasselta* berfungsi

Dasselta tablet berfungsi untuk kelegaan cepat dari gejala-gejala yang berkaitan dengan alahan rintis seperti bersin, hidung yang berhingus, gatal, tersumbat, dan mata yang gatal, berair dan merah.

Dasselta tablet juga berfungsi untuk melegakan gejala-gejala yang berkaitan dengan urtikaria seperti melegakan gatal-gatal dan mengurangkan saiz dan bilangan hives.

Sebelum menggunakan *Dasselta*

Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda alah kepada desloratadine, alah kepada mana-mana bahan dalam ubat ini (seperti senarai di Maklumat lanjut), atau kepada loratadine.

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda mengandung atau menyusukan anak, mungkin mengandung atau sedang merancang untuk mengandung, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini.

Jika anda mengandung atau menyusukan anak, penggunaan *Dasselta* adalah tidak digalakkan.

Sebelum menggunakan *Dasselta*

Jika anda mempunyai buah pinggang yang lemah, *Dasselta* perlu digunakan dengan berhati-hati. Jika ini berkenaan anda, atau anda tidak pasti, sila rujuk doktor anda sebelum menggunakan *Dasselta*.

Penggunaan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja

Keberkesanan dan keselamatan tablet *Dasselta* pada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipastikan.

Dasselta mengandungi laktosa. Pesakit yang menghadapi masalah keturunan yang jarang berlaku seperti intoleransi galaktosa, kekurangan Lapp laktosa atau ketidakserapan glukosa-galaktosa tidak harus mengambil ubat ini.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Tiada interaksi yang diketahui jika *Dasselta* diambil bersama ubat lain.

Dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga jika alkohol diambil bersama *Dasselta*.

Cara menggunakan *Dasselta*

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan remaja (12 tahun keatas): satu biji *Dasselta* 5 mg film-coated tablet sekali sehari tanpa mengira waktu makan untuk melegakan gejala yang berkaitan dengan alahan rintis (termasuk gejala sekejap-sekejap atau yang berterusan) dan urtikaria.

Bila perlu digunakan

Telan sebiji tablet sepenuhnya dengan air, samaada bersama atau tidak bersama makanan.

Berapa lama perlu digunakan

Berkenaan jangka masa rawatan, doktor anda akan menentukan jenis alahan yang anda hidapi dan akan menentukan berapa lama anda perlu menggunakan *Dasselta*.

Jika alahan rintis anda secara sekejap-sekejap (gejala muncul kurang daripada 4 hari seminggu atau kurang dari 4 minggu), doktor anda akan mencadangkan jadual rawatan yang bergantung kepada penilaian sejarah penyakit anda.

Jika alahan rintis anda berterusan (gejala muncul selama 4 hari atau lebih setiap minggu dan lebih daripada 4 minggu), doktor anda mungkin mencadangkan rawatan untuk jangka masa panjang.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa megambil dos anda pada masa yang sepatutnya, ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat, dan kemudian teruskan jadual pengambilan ubat anda seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Guna *Dasselta* seperti yang diarahkan kepada anda. Tiada kesan serius jika terlebih dos secara tidak sengaja. Walaubagaimanapun, jika anda mengambil *Dasselta* lebih dari yang sepatutnya, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan *Dasselta*

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Dasselta*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai penggunaan ubat ini, rujuk doktor atau ahli farmasi anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Dasselta Film-coated Tablets

Desloratadine (5 mg)

Jangan berkongsi *Dasselta* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Pada dos yang disarankan, *Dasselta* tidak menyebabkan anda rasa mengantuk atau kurang peka. Walaubagaimanapun, jarang berlaku dimana sesetengah orang akan mengalami rasa mengantuk, yang boleh menjejaskan keupayaan mereka untuk memandu atau menggunakan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Dasselta* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius atau anda perasan mana-mana kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda berasa tidak sihat semasa menggunakan ubat ini, walaupun jika anda fikir ianya tidak berkaitan dengan ubat ini.

Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan ini. Anda mungkin tidak akan mengalami mana-mana daripadanya.

Semasa pemasaran desloratadine, kes-kes tindak balas alahan yang teruk (kesukaran bernafas, semput, gatal-gatal, ruam dan bengkak) sangat jarang dilaporkan. Jika anda perasan mana-mana kesan sampingan yang serius ini, berhenti mengambil ubat ini dan minta bantuan perubatan dengan segera.

Semasa pemasaran, kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan sebagai:

Biasa:

- keletihan
- mulut kering
- sakit kepala

Sangat jarang:

- tindak balas alahan yang teruk
- degupan jantung yang cepat
- muntah
- pening
- sakit otot
- kegelisahan dengan pergerakan badan meningkat
- ruam
- sakit perut
- ketidakselesaan perut
- mengantuk
- berhalusinasi
- radang hati
- berdebar-debar atau degupan jantung tidak teratur
- mual
- cirit birit
- tidak dapat tidur
- sawan
- ujian fungsi hati tidak normal

Tidak diketahui:

- Kulit menjadi semakin sensitif kepada cahaya matahari, walaupun pada cahaya matahari yang redup, dan kepada sinaran UV, misalnya kepada lampu UV solarium.
- Kuning pada kulit dan/atau mata (jaundice)
- Perubahan pada degupan jantung.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan *Dasselta*

Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C.

Simpan dalam pek asal untuk melindungi daripada kelembapan.

Jangan guna ubat anda selepas tarikh luput yang dinyatakan pada pek selepas 'EXP'. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet bersalut film berwarna biru lembut, bulat dan berserong tepi

Pek blister: 10 atau 100 biji tablet dalam setiap kotak.

Tidak semua pek akan dipasarkan

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Setiap tablet bersalut film mengandungi 5 mg desloratadine

Bahan-bahan tidak aktif

Pada teras tablet mengandungi:

microcrystalline cellulose, hypromellose, hydrochloric acid, sodium hydroxide, maize starch, lactose monohydrate dan talc.

Pada salutan film mengandungi:

hypromellose, macrogol, lactose monohydrate, titanium dioxide (E171) dan indigo carmine (E132).

MAL number:

MAL0000000AZ

Pengilang

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai, 5 ½ Miles off Jalan Meru, Klang, Selangor, MALAYSIA.

Tarikh kemaskini RiMUP

08/08/2017