

SURGIBATH 4% SOLUTION

Chlorhexidine Gluconate (4% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **SurgiBath 4%**
2. Bagaimana **SurgiBath 4%** berfungsi
3. Sebelum menggunakan **SurgiBath 4%**
4. Cara menggunakan **SurgiBath 4%**
5. Semasa menggunakan **SurgiBath 4%**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **SurgiBath 4%**
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan **SurgiBath 4%**

SurgiBath 4% digunakan sebagai mandian antiseptik sebelum menjalani pembedahan. Produk ini juga sesuai digunakan sebagai syampu.

Bagaimana **SurgiBath 4%** berfungsi

SurgiBath 4% mempunyai sifat antibakteria. Ia berkesan melawan pelbagai jenis bakteria, sesetengah virus dan juga kulat.

Sebelum menggunakan **SurgiBath 4%**

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan **SurgiBath 4%** jika anda alah (hipersensitif) kepada Chlorhexidine Gluconate atau mana-mana bahan lain yang disenaraikan di bahagian Maklumat lanjut. Jangan gunakan untuk prosedur tusukan lumbar.

- Sebelum mula menggunakan **SurgiBath 4%**

Beritahu ahli kesihatan profesional anda jika anda mengalami kecederaan pada kepala, tulang belakang atau gegendang telinga yang berlubang.

Chlorhexidine boleh menyebabkan kehilangan pendengaran atau pekak sekiranya memasuki gegendang telinga yang berlubang.

- Jika mengambil produk lain

Setelah menggunakan syampu bagi persediaan pembedahan, perapi dan produk penjagaan rambut yang lain tidak boleh digunakan kerana tindak balas kimia antara chlorhexidine dan produk penjagaan rambut lain boleh menyebabkan antiseptik chlorhexidine tidak berkesan.

Cara menggunakan **SurgiBath 4%**

- Berapa banyak harus digunakan

Bilas sehingga bersih. Biarkan **SurgiBath 4%** sekurang-kurangnya 2 minit sebelum membilas. Anda perlu mandi 2 kali sebelum pembedahan, kecuali jika tidak dibenarkan oleh doktor.

- Bila perlu digunakan

Guna bila diperlukan

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan **SurgiBath 4%** mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan produk ini.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda

mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan **SurgiBath 4%**

- Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya larutan Chlorhexidine masuk ke dalam mata, segera bilas mata dengan air yang secukupnya selama sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan bantuan perubatan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan cairkan. Gunakan dengan kepekatan asal.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

SurgiBath 4% bertujuan untuk KEGUNAAN LUAR SAHAJA.

Jangan terkena mata dan elakkan daripada bersentuhan dengan telinga, mulut atau hidung.

Kesan-kesan sampingan

SurgiBath 4% boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Kejadian kesan iritasi pada kulit dengan penggunaan chlorhexidine pada luaran adalah sangat jarang.

SurgiBath 4% mengandungi chlorhexidine. Maklumkan kepada ahli kesihatan profesional anda jika anda mempunyai alergi terhadap chlorhexidine.

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, gatal, bengkak, kesukaran bernafas, pening kepala atau degupan jantung yang cepat.

SURGIBATH 4% SOLUTION

Chlorhexidine Gluconate (4% w/v)

Segera berjumpa doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami kesan sampingan setelah menggunakannya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan SurgiBath 4%

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Jauhkan dari matahari.

Jauhkan ubat daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

SurgiBath 4% adalah cecair yang jernih, berwarna oren hingga kemerah-merahan. SurgiBath 4% dibekalkan dalam botol plastik 50ml, 80ml dan 100ml (Tidak semua saiz botol dipasarkan).

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Chlorhexidine Gluconate 4% w/v

- Bahan tidak aktif

Carmoisine colour, Water, Polyethylene glycol, Fragrance, Cetiol HE, Lauramine Oxide, Propylene Glycol, Cocamide DEA, Isopropyl Alcohol, Gluconic acid

lactone, Hydroxy ethylcellulose
- Nombor MAL:

MAL10053331XCZ

Pengilang

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang,
Selangor Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Steriline Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang,
Selangor Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

22/07/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)220706/907