

ZERTIN ORAL SOLUTION

Cetirizine Dihydrochloride (5mg/5ml)

ZERTIN TABLET

Cetirizine Dihydrochloride (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan Zertin
2. Bagaimana Zertin berfungsi
3. Sebelum mengambil Zertin
4. Cara menggunakan Zertin
5. Semasa menggunakan Zertin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Zertin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Zertin

Zertin digunakan untuk merawat orang dewasa dan kanak-kanak berumur 3 tahun dan ke atas yang mempunyai demam alergi (bermusim) seperti debu atau alahan haiwan (sepanjang tahun) dan gatal-gatal yang disebabkan dari alahan.

Bagaimana Zertin berfungsi

Cetirizine adalah antihistamin yang menghalang histamin semula jadi di dalam badan yang menyebabkan gejala alahan dalam badan anda. Histamin boleh menyebabkan gejala bersin, gatal-gatal, mata berair, dan hidung berair.

Sebelum mengambil Zertin

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini dan beritahu doktor anda jika:

- Anda alah (hipersensitif) terhadap cetirizine dihydrochloride atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini.
- Anda alah kepada ubat yang serupa.
- Anda sedang menyusukan anak
- Anda mempunyai kegagalan buah pinggang yang teruk (*creatinine clearance* kurang daripada 10 ml/min)

- Sebelum mula mengambil

Semak dengan ahli farmasi anda sebelum mengambil Zertin jika:

- Anda mempunyai masalah buah pinggang
- Anda mempunyai risiko mendapat sekatan kencing (seperti lesi saraf tunjang, prostat membesar).

- Anda menghadapi epilepsi atau berisiko diserang sawan.
- Anda mahu menggunakan untuk kanak-kanak kurang daripada 2 tahun.

Jika anda hamil atau merancang untuk mengandung, tanya ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil Zertin. Seperti ubat-ubatan lain, elakkan penggunaan cetirizine semasa kehamilan, terutamanya semasa trimester pertama.

Zertin mengandungi gula laktosa. Jika anda pernah diberitahu bahawa anda mempunyai intoleransi kepada sesetengah gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan

Cara menggunakan Zertin

- Berapa banyak harus diambil

Dewasa:

10mg sekali sehari

Kanak-kanak $\geq$ 6 tahun

10mg setiap hari, sama ada 5mg dua kali sehari atau 10mg sekali sehari

Kanak-kanak 3-6 tahun

5 mg setiap hari, sama ada 2.5mg dua kali sehari atau 5mg sekali sehari

Bagi orang yang mempunyai masalah buah pinggang:

Dos perlu dikurangkan kepada setengah dos harian.

- Bila perlu diambil

Ambil sekali atau dua kali sehari atau mengikut pada nasihat doktor atau ahli farmasi

- Berapa lama perlu diambil

Ikut nasihat doktor atau ahli farmasi mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

- Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Zertin

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda sebagaimana yang diarahkan oleh doktor anda.
- Elakkan minuman beralkohol semasa anda sedang mengambil ubat ini.
- Jika anda tidak rasa lebih baik dalam masa beberapa hari, berjumpa dengan doktor anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Zertin
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Jika anda mempunyai sebarang persoalan mengenai pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

ZERTIN ORAL SOLUTION

Cetirizine Dihydrochloride (5mg/5ml)

ZERTIN TABLET

Cetirizine Dihydrochloride (10mg)

- Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berjumpa dengan doktor anda terlebih dahulu.
- Jangan beri Zertin kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
- Jika anda perlu menjalani ujian alahan, tanya doktor anda jika anda perlu berhenti mengambil Zertin untuk beberapa hari sebelum ujian. Ubat ini mungkin menjejaskan keputusan ujian alahan anda.
- Seseengah orang melaporkan bahawa mereka rasa mengantuk atau pening semasa mereka sedang mengambil Zertin. Jika anda berasa demikian, jangan memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Kadang kala terdapat laporan kesan sampingan ringan dan sementara seperti sakit kepala, pening, mengantuk, agitasi, mulut kering, perut rasa tidak selesa, dan hipersensitiviti.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan Pelupusan Zertin

Simpan di tempat yang dingin dan kering di bawah suhu 30 ° C.
Lindungi daripada cahaya.
Pastikan bekas tertutup rapat.
Jauhi daripada kanak-kanak.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Zertin Oral Solution

Sirap jernih berwarna putih hingga keputihan dengan perisa buah-buahan.

Zertin Tablet

Tablet bersalut berwarna putih hingga keputihan berbentuk bujur panjang dengan skor pada satu permukaan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Cetirizine dihydrochloride

-Bahan tidak aktif

Zertin oral solution

Propylene glycol
Refined sugar
Glycerin
Methylparaben
Propylparaben
Sodium acetate
Glacial Acetic acid
Peach Flavour
Purified water

Zertin Tablet

Colloidal silicone dioxide
Corn starch
Hydroxypropyl methylcellulose
Polyethylene glycol
Sodium starch Glycolate
Talc
Isopropyl alcohol
Titanium dioxide
Lactose monohydrate
Magnesium stearate
Povidone k30
Propylene Glycol
Purified water.

- Nombor MAL

Zertin Oral Solution
MAL20034215AZ

Zertin Tablet
MAL20040800AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd.,
Lot 5030, Jalan Teratai, 5 ½ Mile Off
Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Sterilline Sdn. Bhd.,
Lot 5979, Jalan Teratai, 5 ½ Mile Off
Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tarikh kemaskini RIMUP

21/2/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)080224/00021