

METASONE CREAM/ OINTMENT

Mometasone Furoate (1mg/1g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Metasone
2. Bagaimana Metasone berfungsi
3. Sebelum menggunakan Metasone
4. Cara menggunakan Metasone
5. Semasa menggunakan Metasone cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Metasone
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Metasone

Metasone digunakan untuk melegakan keradangan dan kegatalan yang disebabkan oleh masalah kulit tertentu yang responsif kepada kortikosteroid.

Bagaimana Metasone berfungsi

Mometasone furoate tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil kortikosteroid. Mometasone furoate mempunyai tindakan anti radang, anti-gatal, dan mengecilkan saluran darah.

Sebelum Menggunakan Metasone

-Bila tidak boleh menggunakan
Jangan gunakan jika anda hipersensitif kepada mometasone atau kortikosteroid lain atau mana-mana bahan kandungan yang disenaraikan di hujung risalah ini.

Jangan gunakan jika anda mempunyai:

- Kemerahan atau jerawat di muka.
- Ruam atau kemerahan di sekitar mulut.
- Gatal-gatal di bahagian dubur dan bahagian kelamin.
- Ruam lampin.

- Jangkitan kulit yang disebabkan oleh bakteria, virus atau kulat.
- Tibi
- Jangkitan seksual
- Kesan sampingan selepas menerima vaksin.

- Sebelum menggunakan Metasone

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang keadaan perubatan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Metasone

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan lapisan nipis pada kawasan kulit yang terjejas

- Bila perlu digunakan

Sapukan sekali sehari

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan sehingga luka sembuh atau untuk tempoh 3 minggu, yang mana lebih cepat, atau rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan berlebihan dan berpanjangan kortikosteroid topikal boleh mengurangkan fungsi kelenjar adrenal terutamanya pada bayi dan kanak-kanak.

Semasa menggunakan Metasone

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika kulit merengsa atau sensitif apabila menggunakan Metasone, berhenti menggunakan ubat tersebut.

Jika terdapat jangkitan, dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan ubat antikulat atau antibakteria yang sesuai. Jika keadaan tidak bertambah baik, berhenti menggunakan kortikosteroid.

Gunakan dos yang terendah pada kanak-kanak dan ambil langkah berjaga-jaga yang sesuai.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Metasone pada mata.

Jangan gunakan Metasone pada kawasan permukaan yang luas atau secara kedap udara dan air. Ini akan meningkatkan penyerapan kortikosteroid ke dalam badan

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat dalam kumpulan ini tidak boleh digunakan pada wanita hamil dalam jumlah yang besar atau untuk tempoh masa yang lama.

Ia hanya boleh digunakan semasa kehamilan jika manfaat melebihi potensi risiko kepada janin.

METASONE CREAM/ OINTMENT

Mometasone Furoate (1mg/1g)

Berhati-hati semasa ia diberikan kepada ibu yang menyusu kerana tidak diketahui sama ada penggunaan ubat kortikosteroid ini boleh menghasilkan jumlah yang boleh dikesan dalam susu ibu.

Kesan-kesan sampingan

Jarang sekali, kesan sampingan dilaporkan termasuk rasa kesemutan, gatal-gatal, keradangan folikel rambut, jerawat, dan tanda-tanda penipisan kulit. Kesan sampingan yang tidak kerap berlaku termasuk iritasi, pertumbuhan rambut berlebihan, pemutihan kulit, ruam kecil di sekitar mulut, jangkitan sekunder, tanda regangan, dan ruam panas.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Metasone

-Penyimpanan

Simpan di tempat kering. Simpan di bawah suhu 30°C dan elak daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim/salap licin yang berwarna putih hingga keputihan.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Mometasone Furoate

-Bahan tidak aktif:

Metasone cream

Propylparaben

Propylene Glycol

Methylparaben

Poloxyl 40 sterate

Sodium Phosphate Monobasic

Purified water

White Soft paraffin

Ceteostearyl alcohol.

Liquid Paraffin

Metasone ointment

Propylene glycol

Cetostearyl alcohol

Cetomacrogol 1000

White soft paraffin.

- Nombor MAL

Metasone cream

MAL06081217AZ

Metasone Ointment

MAL06030822AZ

Pengilang

Noripharma Sdn. Bhd., Lot 5030,
Jalan Teratai, 5 ½ Mile Off Jalan
Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan,
Malaysia

Pemegang Pendaftaran

Produk

Sterilline Sdn. Bhd., Lot 5979,
Jalan Teratai, 5 ½ Mile Off Jalan
Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

11/06/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)140524/00062