

BESOMID 100 MCG/ ACTUATION HFA- METERED DOSE INHALER

Beclometasone Dipropionate (100mcg/ actuation)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Besomid
2. Bagaimana Besomid berfungsi
3. Sebelum menggunakan Besomid
4. Cara menggunakan Besomid
5. Semasa menggunakan Besomid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Besomid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Besomid

Besomid digunakan untuk membantu mencegah gejala asma.

Bagaimana Besomid berfungsi

Bahan aktif, beclometasone dipropionate, adalah salah satu ubat dalam kumpulan yang dipanggil kortikosteroid yang sering dirujuk sebagai steroid.

Besomid mengurangkan bengkak dan kerengsaan di dinding saluran udara kecil di dalam paru-paru dan memudahkan kesukaran pernafasan.

Sebelum menggunakan Besomid

- Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda mengandung, cuba untuk mengandung atau menyusukan bayi. Terdapat risiko perencatan tumbesaran dan lelangit rekah pada bayi.

Sekiranya anda pernah mengalami batuk kering paru-paru (tibi).

Jika anda mempunyai alahan terhadap Beclomethasone atau mana-mana bahan yang disenaraikan pada hujung risalah ini.

- Sebelum menggunakan Besomid

Sesetengah ubat tidak sesuai untuk orang yang mempunyai keadaan tertentu, dan kadang-kadang ubat hanya boleh digunakan jika penjagaan tambahan diambil

Sesetengah ubat akan meningkatkan kesan Besomid dan doktor anda mungkin mengawasi anda dengan teliti selama anda mengambil ubat ini (termasuk ubat untuk HIV seperti cobicistat)

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Jika anda sedang mengambil atau menggunakan sebarang ubat lain. Ini termasuk apa-apa ubat yang anda ambil yang boleh dibeli tanpa preskripsi, seperti ubat-ubatan herba dan ubatan pelengkap.

Cara menggunakan Besomid

- Berapa banyak harus digunakan

Jika ini ialah alat sedut baru atau anda tidak menggunakan alat sedut anda selama seminggu atau lebih, ia mesti diuji sebelum digunakan dengan membuka penutup mulut dan tekan kanister di dalam alat sedut. Lepaskan satu semburan ke udara, jauh dari anda.

Penggunaan untuk orang dewasa, satu sedutan, 3 hingga 4 kali sehari atau 2 sedutan, dua kali sehari. Dalam kes-kes yang lebih teruk, 6-8 sedutan setiap hari adalah disyorkan, dengan pengurangan untuk kali yang berikutnya. Dos harian maksimum yang disyorkan untuk penyediaan ini adalah 10 sedutan. Penggunaan kanak-kanak (umur 6 tahun ke atas), satu sedutan, 2 hingga 4 kali sehari. Untuk orang tua, rujuk kepada dos yang disyorkan oleh doktor anda.

Cara menggunakan alat sedut anda

1. Buka penutup dari pelekap mulut dan periksa secara teliti kebersihannya. Goncangkan alat sedut.
2. Pegang alat sedut. Bernafas melalui mulut dan letakkan pelekap mulut dengan segera ke dalam mulut.
3. Rapatkan bibir pada pelekap mulut dengan ketat. Dongakkan kepala kebelakang sedikit. Tarik nafas secara perlahan melalui mulut. Pada masa yang sama tekan kanister untuk melepaskan satu sedutan ubat serta Tarik nafas dengan kuat dan mendalam.
4. Keluarkan ubat sedut dari mulut. Tahan nafas anda selama 10 saat, atau selagi anda selesa. Lepaskan nafas perlahan-lahan.
5. Jika dos lain diperlukan, tunggu sekurang-kurangnya

satu minit sebelum mengulangi langkah 1 hingga 4. Selepas guna, letak kembali penutup mulut.

Pembersihan

Cuci alat sedut sekurang-kurangnya seminggu sekali.

1. Tarik kanister besi perlahan-lahan daripada sarung alat sedut. Buka penutup dari pelekap mulut.
2. Bilas sarung alat sedut dan pelekap mulut dengan air suam.
3. Biarkan kering dan elakkan haba yang berlebihan.
4. Pasangkan kembali kanister dan penutup pelekap mulut dengan betul.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Besomid selama yang disyorkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna terlalu banyak (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan yang berdekatan, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja mengambil ubat ini terlalu banyak. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda keracunan atau ketidakselesaan. Anda mungkin memerlukan rawatan segera.

BESOMID 100 MCG/ ACTUATION HFA-METERED DOSE INHALER

Beclometasone Dipropionate (100mcg/ actuation)

Penggunaan yang berlebihan boleh menyebabkan penindasan tindak balas imun dan keradangan.

Semasa menggunakan Besomid

- Perkara yang perlu dilakukan
Doktor anda mungkin menetapkan alat sedut ini untuk menggantikan tablet steroid, yang mungkin bermakna untuk masa yang singkat anda perlu mengambil kedua-dua ubat. Adalah penting untuk mengikuti nasihat doktor anda. Walaupun anda mengurangkan bilangan tablet steroid yang anda ambil, anda mungkin merasa tidak sihat walaupun anda boleh bernafas secara normal atau lebih baik.
- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti mengambil steroid secara tiba-tiba. Jika anda mempunyai alahan lain, anda mungkin mendapati bahawa menghentikan tablet steroid anda menjadikannya lebih teruk. Sekiranya ini berlaku teruskan penggunaan alat sedut anda dan beritahu doktor anda. Mungkin ada ketika anda perlu mengambil tablet steroid serta menggunakan alat sedut anda, contohnya jika anda mengalami serangan asma yang semakin teruk, anda mendapat jangkitan dada atau anda memerlukan pembedahan. Doktor anda boleh memberi anda bekalan tablet steroid yang sedikit untuk diambil dalam situasi ini; jika ya, anda akan diberikan arahan lengkap tentang bagaimana dan bila untuk mengambilnya. Hubungi doktor anda dengan segera jika anda berfikir bahawa anda perlu mengambil tablet steroid, walaupun anda mempunyai bekalan sendiri.
- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini boleh memberi kesan terhadap pemanduan anda atau semasa menggunakan jentera. Jika ubat membuat anda berasa loya, pening, penat, atau sakit kepala, jangan memandu atau gunakan jentera dan jumpa doktor anda dengan segera

Lawati doktor anda dengan kerap untuk memeriksa keadaan anda. Sekiranya anda perlu pergi ke hospital, jangan lupa untuk mengambil semua alat sedut dan ubat lain bersama anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jika sebaik selepas mengambil satu sedutan alat sedut ini, anda berasa berdehit atau sesak dada, jangan mengambil sedutan lagi. Gunakan alat sedut pelega anda untuk membantu pernafasan anda dan hubungi doktor anda dengan serta-merta. Berhenti menggunakan alat sedut anda dan beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke jabatan kecemasan di hospital terdekat jika perkara berikut berlaku:

Mual, batuk dan memberi rasa dan bau yang tidak menyenangkan.

Reaksi alahan (bengkak bibir, muka atau leher yang membawa kepada kesukaran pernafasan; ruam kulit atau geligata).

Selain itu, jangkitan kulat pada tekak dan mulut, keserakan suara boleh berlaku pada sesetengah orang. Kesan sistemik sedutan kortikosteroid boleh berlaku terutamanya pada dos yang tinggi yang ditetapkan untuk tempoh yang berpanjangan. Ini mungkin termasuk penindasan adrenal, kerencatan tumbesaran pada kanak-kanak dan remaja, penurunan ketumpatan mineral tulang, kanta mata keruh dan tekanan meningkat pada mata.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web www.npra.moh.gov.my (Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines AEFI)

Cara penyimpanan dan pelupusan Besomid

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Jangan bekukan. Elakkan penyimpanan terus dibawah cahaya matahari atau haba. Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada bungkusan selepas 'EXP'. Tarikh luput ini merujuk kepada hari terakhir dalam bulan tersebut.

- Pelupusan

Kanister mempunyai tekanan dan tidak boleh tercucuk atau dibakar walaupun ia kelihatan kosong. Jangan buang ubat-ubatan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Sekiranya doktor anda memutuskan untuk menghentikan rawatan, kembalikan alat sedut itu kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk pelupusan yang selamat. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sebuah aerosol yang mengandungi larutan jernih diisi dalam bekas aluminium bertekanan yang sesuai dengan injap pemeteran yang disediakan dengan penggerak alat sedut oral.

- Bahan-bahan

- Bahan aktif
Beclometasone Dipropionate
- Bahan tidak aktif
Ethanol
Oleic Acid
Propellant HFA 134a

- Nombor MAL

MAL08080386ACZ

Pengilang

Midas Care Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
B-16 MIDC, Waluj, Chhatrapati Sambhajnagar 431-136 India

Pemegang Pendaftaran Produk

Steriline Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai
5 1/2 Mile Off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor

BESOMID 100 MCG/ ACTUATION HFA-METERED DOSE INHALER

Beclometasone Dipropionate (100mcg/ actuation)

Tarikh kemaskini RiMUP

09/02/2026

Nombor siri

NPRA(R2/3)260119/00005