

HUNDRED KOYOK CLASSIC

Risalah Maklumat Ubat untuk pengguna (RiMUP)

Menthol 0.62mg, Methy Salicylate 0.62mg, Camphor 0.41mg, Borneol 0.18mg, Thymol 0.04mg

Apakan yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan HUNDRED KOYOK CLASSIC
2. Bagaimana HUNDRED KOYOK CLASSIC berfungsi
3. Sebelum mengambil HUNDRED KOYOK CLASSIC
4. Cara menggunakan HUNDRED KOYOK CLASSIC
5. Semasa menggunakan HUNDRED KOYOK CLASSIC
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan HUNDRED KOYOK CLASSIC
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakan kegunaan HUNDRED KOYOK CLASSIC?

HUNDRED KOYOK CLASSIC digunakan untuk melegakan sakit-sakit otot dan sendi,terseliuh, leher and bahu kaku,sakit elakang dan sakit arthritis.

Bagaimana HUNDRED KOYOK CLASSIC berfungsi

HUNDRED KOYOK CLASSIC mengandungi bahan aktif Methyl Salicylate dan Menthol. Methyl Salicylate digunakan untuk melegakan kesakitan dan mengurangkan keradangan. Menthol apabiladi gunakan pada kulit,saluran darah akan dibesarkan menyebabkan sensasi kesejukan diikuti dengan kesan analgesia.

Sebelum mengambil HUNDRED KOYOK CLASSIC

Bila tidak boleh mengambil
Jangan mengambil HUNDRED KOYOK CLASSIC jika;

Cara menggunakan HUNDRED KOYOK CLASSIC

Berapa banyak harus digunakan

1. Bersih dan keringkan tempat yang terjejas.
2. Tanggalkan filem yang lebih kecil dan lekatkan HUNDRED KOYOK CLASSIC pada tempat yang terjejas.
3. Produk ini boleh digunakan beberapa kali sehari(maksimum 4 kali sehari).

Bila perlu digunakan

HUNDRED KOYOK CLASSIC digunakan untuk melegakan sakit-sakit otot dan sendi, terseliuh,leher and bahu kaku,sakit belakang dan sakit arthritis.

Berapa lama perlu digunakan

HUNDRED KOYOK CLASSIC digunakan selamanya mengalami sakit-sakit otot dan sendi,terseliuh,leher dan bahu kaku,sakit belakang dan sakit arthritis.

Rujuk doktor atau ahli farmasi jika kesakitan tidak berkurang selepas 5 hingga 6hari penggunaan.

Jika terlupa menggunakan

Gunakan product ini dengan segera dan kemudian teruskan penggunaan macam biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Pesakit yang mengambil warfarin mungkin berisiko mengalami pendarahan jika diaplikasi secara berlebihan pada kulit.

Jika anda mengambil terlalu banyak,rujuk kepada doctor atau ahli farmasi.

Semasa menggunakan HUNDRED KOYOK CLASSIC

Perkara yang perlu dilakukan

Cara penyimpanan dan pelupusan HUNDRED KOYOK CLASSIC

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Simpan di tempat yang kering and sejuk serta terlindung daripada cahaya.

Pelupusan

Lupuskan product selepas tarikh luput.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

HUNDRED KOYOK CLASSIC ialah plaster putih bersegi empat yang dilapisi dengan lapisan nipis koloid yang berubat.

Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif

Menthol, Methy Salicylate, Camphor, Borneol, Thymol

Bahan-bahan tidak aktif

Natural rubber, Super Ester, Gum Rosin, Lanolin, Glycol Salicylate, Silicon Dioxide, Cera Alba, Hexane

Pengilang

PT Indo Abadi Sarimakmur

Dsn Ngablak, Ds. Gempolkurung, No 168 M. Kec. Menganti-Gresik, 61174 Indonesia.

Pemegang Pendaftaran Produk

JWP MEDICAL SDN BHD.

4740-4741, Jalan Telaga Air, 12200 Butterworth, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

26/02/2018

1. Pesakit yang mengambil *warfarin* mungkin berisiko mengalami pendarahan jika diaplikasi untuk sengal otot atau sendi secara berlebihan pada kulit.

2. Anda mengalami kulit yang sensitif and dermatitis sentuhan

Sebelum mula mengambil

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

1. Jika anda mengalami kulit yang sensitif dan dermatitis sentuhan terhadap Methyl Salicylate, Menthol atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil *warfarin*.

Pastikan tempat yang terjejas adalah bersih and kering.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Product ini tidak sewajarnya digunakan pada bayi and kanak-kanak di bawah umur 2 tahun dan dikontraindikasikan pada mereka yang menunjukkan hipersensitiviti terhadap sebarang komponen dalam formulasi ini.

Elakkan penggunaan terus pada hidung, mata and luka.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk kegunaan luaran sahaja.
Jauhi daripada kanak-kanak.

Kesan- kesan Sampingan

Hentikan penggunaan jika ruam, kegatalan, kemerahan atau letusan berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan melalui No.tel:03-78835550, atau lapor pada laman web terbaru npra.moh.gov.my (Public --> Reporting Side Effects to Medicines or Vaccines)