

## NEOBUN CLASSIC PLASTER

Risalah Maklumat Ubat untuk pengguna (RiMUP)

Menthol 0.90mg, Methy Salicylate 0.70mg, Camphor 0.32mg, Thymol 0.14mg

---

### Apakan yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan NEOBUN CLASSIC PLASTER
2. Bagaimana NEOBUN CLASSIC PLASTER berfungsi
3. Sebelum mengambil NEOBUN CLASSIC PLASTER
4. Cara menggunakan NEOBUN CLASSIC PLASTER
5. Semasa menggunakan NEOBUN CLASSIC PLASTER
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan NEOBUN CLASSIC PLASTER
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh Kemaskini RiMUP

### Apakan kegunaan NEOBUN CLASSIC PLASTER?

NEOBUN CLASSIC PLASTER digunakan untuk melegakan sakit-sakit otot dan sendi,terseliuh, leher and bahu kaku,sakit elakang dan sakit artritis.

### Bagaimana NEOBUN CLASSIC PLASTER berfungsi

NEOBUN CLASSIC PLASTER mengandungi bahan aktif Methyl Salicylate dan Menthol. Methyl Salicylate digunakan untuk melegakan kesakitan dan mengurangkan keradangan. Menthol apabila di gunakan pada kulit,saluran darah akan dibesarkan menyebabkan sensasi kesejukan diikuti dengan kesan analgesia.

### Sebelum mengambil NEOBUN CLASSIC PLASTER

*Bila tidak boleh mengambil*

Jangan mengambil NEOBUN CLASSIC PLASTER jika;

### Cara menggunakan NEOBUN CLASSIC PLASTER

*Berapa banyak harus digunakan*

1. Bersih dan keringkan tempat yang terjejas.
2. Tanggalkan filem yang lebih kecil dan lekatkan NEOBUN CLASSIC PLASTER pada tempat yang terjejas.
3. Product ini boleh digunakan beberapa kali sehari (maksimum 4 kali sehari)

*Bila perlu digunakan*

NEOBUN CLASSIC PLASTER digunakan untuk melegakan sakit-sakit otot dan sendi, terseliuh,leher and bahu kaku,sakit belakang dan sakit artritis.

*Berapa lama perlu digunakan*

NEOBUN CLASSIC PLASTER digunakan selamanya mengalami sakit-sakit otot dan sendi,terseliuh,leher dan bahu kaku,sakit belakang dan sakit artritis.

Rujuk doktor atau ahli farmasi jika kesakitan tidak berkurang selepas 5 hingga 6hari penggunaan.

*Jika terlupa menggunakan*

Gunakan product ini dengan segera dan kemudian teruskan penggunaan macam biasa.

*Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Pesakit yang mengambil warfarin mungkin berisiko mengalami pendarahan jika diaplikasi secara berlebihan pada kulit.

Jika anda mengambil terlalu banyak,rujuk kepada doctor atau ahli farmasi.

### Semasa menggunakan NEOBUN CLASSIC PLASTER

*Perkara yang perlu dilakukan*

### Cara penyimpanan dan pelupusan NEOBUN CLASSIC PLASTER

*Penyimpanan*

Simpan di bawah suhu 30°C.

Simpan di tempat yang kering and sejuk serta terlindung daripada cahaya.

*Pelupusan*

Lupuskan product selepas tarikh luput.

### Maklumat lanjut

*Rupa dan warna produk*

NEOBUN CLASSIC PLASTER ialah plaster putih bersegi empat yang dilapisi dengan lapisan nipis koloid yang berubat.

*Bahan-bahan kandungan*

Bahan-bahan aktif

Menthol, Methy Salicylate, Camphor, Thymol

### Pengilang

PT Indo Abadi Sarimakmur  
Dsn Ngablak, Ds. Gempolkurung,  
No 168 M. Kec. Menganti-Gresik,  
61174 Indonesia.

### Pemegang Pendaftaran Produk

JWP MEDICAL SDN BHD.  
4740-4741, Jalan Telaga Air,  
12200 Butterworth, Pulau Pinang,  
Malaysia.

### Tarikh Kemaskini RiMUP

25/04/2018

1. Pesakit yang mengambil *warfarin* mungkin berisiko mengalami pendarahan jika diaplikasi untuk sengal otot atau sendi secara berlebihan pada kulit.

2. Anda mengalami kulit yang sensitif and dermatitis sentuhan

*Sebelum mula mengambil*

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

1. Jika anda mengalami kulit yang sensitif dan dermatitis sentuhan terhadap Methyl Salicylate, Menthol atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

*Jika mengambil ubat-ubat lain*

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda jika anda mengambil warfarin.

Pastikan tempat yang terjejas adalah bersih and kering.

*Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Product ini tidak sewajarnya digunakan pada bayi and kanak-kanak di bawah umur 2 tahun dan dikontraindikasikan pada mereka yang menunjukkan hipersensitiviti terhadap sebarang komponen dalam formulasi ini.

Elakkan penggunaan terus pada hidung, mata and luka.

*Perkara yang perlu diberi perhatian*

Untuk kegunaan luaran sahaja.

Jauhi daripada kanak-kanak.

### **Kesan- kesan Sampingan**

Hentikan penggunaan jika ruam, kegatalan, kemerahan atau letusan berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan melalui No.tel: 03-78835550, atau lapor pada laman web terbaru [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (Public --> Reporting Side Effects to Medicines or Vaccines)