

ENHANCIN TABLET

Amoxicillin/ clavulanic acid (500mg/125mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Enhancin Tablet
2. Bagaimana Enhancin Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Enhancin Tablet
4. Cara menggunakan Enhancin Tablet
5. Semasa menggunakan Enhancin Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Enhancin Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Enhancin Tablet

Enhancin Tablet digunakan untuk merawat jangkitan berikut:

- jangkitan saluran pernafasan
- jangkitan saluran air kencing
- jangkitan kulit dan tisu lembut (cth. bisul, luka)
- jangkitan pergigian
- jangkitan tulang dan sendi
- jangkitan lain

Bagaimana Enhancin Tablet berfungsi

Enhancin Tablet adalah antibiotik yang mengandungi amoxicillin dan clavulanate, yang berfungsi dengan membunuh bakteria penyebab jangkitan.

Sebelum mengambil Enhancin Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil Enhancin Tablet jika anda:

- alah kepada amoxicillin, clavulanate, antibiotik lain dalam kumpulan penisilin atau antibiotik serupa yang dipanggil cephalosporins atau apa-apa bahan-bahan lain ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut).
- pernah mengalami masalah hati atau penyakit kuning semasa mengambil antibiotik.

Sekiranya anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil Enhancin Tablet, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda:

- mempunyai demam virus (contohnya: selesema biasa)
- sedang dirawat untuk masalah hati atau buah pinggang
- tidak kerap membuang air kecil

Sekiranya anda tidak pasti jika mana-mana yang di atas berlaku kepada anda, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Enhancin Tablet.

Mengandung dan menyusukan anak
Amoxicillin/ clavulanate potassium akan dirembes ke dalam susu ibu.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Elak menggunakan ubat dalam masa tiga bulan pertama kehamilan melainkan jika dinasihatkan oleh doktor.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda harus memberitahu doktor anda jika anda mengambil

- Probenecid dan allopurinol (digunakan untuk gout)
- ubat-ubatan yang membantu menghentikan pembekuan darah (seperti warfarin)
- Pil mencegah kehamilan yang mengandungi estrogen. Anda harus mengambil langkah berjaga-jaga tambahan untuk mencegah kehamilan semasa menggunakan Enhancin Tablet
- Methotrexate (ubat yang digunakan untuk merawat barah atau penyakit keradangan sendi)

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Cara menggunakan Enhancin Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan

berhati-hati. Ianya mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat dalam risalah ini

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak Enhancin Tablet yang anda perlukan. Ianya bergantung kepada jenis jangkitan yang ada.

Tablet hendaklah ditelan kesemuanya tanpa kunyah

- Dewasa dan kanak-kanak seberat 40 kg dan lebih

Dos biasa ialah 1 biji dua kali sehari untuk diambil selang 12 jam.

Untuk jangkitan teruk dan jangkitan saluran pernafasan, dosnya adalah satu biji 625 mg setiap 8 jam.

Tablet tidak sesuai untuk kanak-kanak dengan berat badan kurang dari 40 kg.

- Individu dengan masalah buah pinggang dan hati

- Jika anda mengalami masalah buah pinggang atau hati, dos anda mungkin akan diubah oleh doktor.

- Bila perlu digunakan

Ambil Enhancin Tablet ketika mula makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Enhancin Tablet untuk jangka masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jangan ambil Enhancin Tablet untuk lebih daripada 2 minggu. Beritahu doktor anda, sekiranya anda masih tidak sihat.

Adalah penting untuk melengkapkan preskripsi doktor anda dengan penuh, walaupun anda mula berasa sihat. Jangkitan mungkin bertambah teruk atau kembali sekiranya anda tidak melengkapkan tempoh rawatan.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika hampir tiba masanya untuk dos seterusnya, tunggu sehingga kemudian untuk mengambil ubat dan langkau dos yang terlepas.

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan gejala pada sistem penghadaman, kristal dalam air kencing atau sawan.

Semasa menggunakan Enhancin Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan
Guna ubat anda mengikut arahan doktor

Beritahu pada doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Enhancin Tablet.

Beritahu doktor anda segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Ambil Enhancin Tablet hanya dengan preskripsi doktor

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Enhancin Tablets kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini membuat anda pening, memberi anda reaksi alahan atau sawan, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Ujian darah dan air kencing

Sekiranya anda perlu menjalani ujian darah (ujian Coombs atau Aspergillus EIA) atau ujian air kencing (untuk glukosa), beritahu doktor atau jururawat anda bahawa anda sedang mengambil Enhancin Tablet. Ini kerana Enhancin Tablet boleh menjejaskan keputusan jenis ujian ini.

Kesan-kesan sampingan

Cirit-birit adalah masalah biasa disebabkan oleh antibiotik yang biasanya akan berakhir apabila pengambilannya dihentikan. Individu mungkin mengalami najis berair dan berdarah (mungkin disertai dengan kekejangan perut dan demam) selewat-lewatnya dua bulan atau lebih selepas mengambil dos terakhir antibiotik. Jika ini berlaku, hubungi doctor anda.

Seperti ubat lain, Enhancin Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Enhancin Tablet boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius.

Berhenti menggunakan Enhancin Tablet dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala berikut:

- Tindak balas alahan yang serius seperti *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)*. DRESS biasanya bermula dengan simptom seperti selesema dengan ruam pada muka dan berpanjangan, suhu badan yang tinggi dan nodus limfa yang membesar.
- Kulit kemerahan, melepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Beritahu doktor anda jika anda mengalami mana-mana kesan berikut dan ia membimbangkan anda:

Sangat kerap

- cirit-birit

Kerap

- Jangkitan kulat
- merasa loya (mual),
- muntah

Tidak kerap

- Pening
- Sakit kepala
- Ketidakhadaman
- Ujian fungsi hati yang tidak normal
- Gatal
- Gegata

Kekerapan yang tidak diketahui

- Bilangan sel darah merah yang rendah
- Darah mengambil masa lebih lama untuk membeku
- Bengkak pada kulit seperti pada muka atau tekak (*angioedema*), menyebabkan kesukaran bernafas
- Radang saluran darah yang mungkin kelihatan seperti bintik merah atau ungu timbul pada kulit, tetapi boleh menjejaskan bahagian lain badan (*hypersensitivity vasculitis*)
- Aktif luar biasa
- Sawan
- Lidah menjadi gelap dan berbulu
- Radang hati (hepatitis) dan penyakit kuning
- Keradangan tiub pada buah pinggang
- Kristal dalam air kencing

Jarang

- kekurangan sel darah putih dan kiraan platelet
- Kekotoran gigi terutamanya pada kanak-kanak

Kesan sampingan yang lain

- Agitasi
- Keresahan
- Perubahan tingkah laku
- Kekeliruan
- Sukar tidur
- Darah dalam air kencing
- Jangkitan faraj

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda ada.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Enhancin Tablet

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada bungkusannya atau jika bungkusannya koyak atau menunjukkan tanda-tanda terusik. Sekiranya sudah habis atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

- Penyimpanan:

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C, dilindungi daripada kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna

Tablet berwarna putih hingga ke putih kekuningan, bersalut filem, berbentuk bujur dan dicetak timbul dengan "RX713" di satu sisi sahaja

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Amoxicillin trihydrate bersamaan dengan amoxicillin...500 mg

Potassium clavulanate bersamaan dengan asid clavulanic125 mg

Bahan tidak aktif:

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, colloidal silicon dioxide, povidone (K30), eudragit E 100, isopropyl alcohol, magnesium stearate, opadry 03B58965 white, polyethylene glycol-400, methylene chloride

- Nombor MAL:

MAL20000018AZ

Pengilang

Sun Pharmaceutical Ind. Ltd.
Industrial Area - 3
Dewas- 455001, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Ranbaxy (Malaysia) Sdn. Bhd.
(A Sun Pharma Company)
Lot 23, Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani, Kedah,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP:

15/02/2023

Nombor siri:

NPRA(R4/1)14102022/00090