

ENHANCIN SUSPENSION

Amoxicillin/clavulanic acid (312.5mg/5mL)

Apakah yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Enhancin
2. Cara Enhancin berfungsi
3. Sebelum mengambil Enhancin
4. Panduan mengambil Enhancin
5. Semasa mengambil Enhancin
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Penyimpanan dan Pelupusan Enhancin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini
11. Nombor siri

Kegunaan Enhancin

Enhancin digunakan untuk merawat jangkitan bakteria berikut di bahagian badan yang berlainan:

- jangkitan pada saluran pernafasan
- jangkitan pada saluran air kencing
- jangkitan pada kulit dan tisu lembut termasuk jangkitan gigi, gigitan haiwan
- jangkitan tulang dan sendi

Cara Enhancin berfungsi

Enhancin Suspension adalah antibiotik yang mengandungi amoxicillin dan clavulanic acid, yang berfungsi dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengambil Enhancin

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan berikan Enhancin kepada anak anda jika:

- alah terhadap amoxicillin, clavulanic acid, antibiotik lain dalam kumpulan penisilin atau yang serupa seperti cephalosporin, atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut).
- pernah mengalami masalah hati atau penyakit kuning (jaundis) apabila mengambil antibiotik.

Jika anda tidak pasti sama ada anak anda perlu mengambil Enhancin Suspension atau tidak, bincang dengan doktor atau ahli farmasi mereka sebelum memberikan Enhancin kepada mereka.

- Sebelum mula menggunakan Enhancin

Beritahu doktor anda jika anak anda:

- mempunyai sebarang jangkitan virus (contoh, selsema biasa)
- sedang dirawat untuk masalah hati atau buah pinggang
- tidak kerap membuang air kecil.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anak anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk apa-apa ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anak anda mengambil:

- probenecid, allopurinol (ubat untuk merawat gout/penyakit sendi)
- warfarin (untuk mengelakkan pembekuan darah)
- methotrexate (ubat yang digunakan untuk merawat kanser atau penyakit keradangan sendi)
- mycophenolate mofetil (ubat yang digunakan untuk menghalang penolakan organ yang selepas pemindahan organ)

Cara menggunakan Enhancin

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa berikan ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Goncangkan botol untuk meleraikan serbuk, tambah air rebus yang telah sejuk hingga paras penanda pada botol atau seperti yang diarahkan, terbalikkan dan goncang.

Enhancin Suspension tidak sesuai untuk orang dewasa dan kanak-kanak dengan berat lebih daripada 40 kg.

Kanak-kanak dengan berat badan kurang daripada 40 kg

Doktor anda akan menentukan dos berdasarkan jenis jangkitan anak anda dan juga berat badan mereka (dalam kg):

- Cawan sukat akan disediakan kepada anda. Anda boleh menggunakan cawan sukat tersebut untuk menyukat dos yang betul kepada bayi atau anak anda.

Individu yang menghidap masalah buah pinggang dan hati

- Jika anak anda mempunyai masalah buah pinggang, dos mungkin akan direndahkan. Kekuatan dos yang berbeza atau jenis ubat yang berlainan mungkin akan digunakan oleh doktor anda.
- Jika anak anda menghidap masalah hati, mereka mungkin perlu menjalani ujian darah dengan lebih kerap untuk memantau keadaan hati mereka.

- Bila perlu digunakan

Goncangkan botol sebelum setiap penggunaan.

Berikan Enhancin Suspension tiga kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Berikan Enhancin Suspension bersama makanan

- Berapa lama perlu digunakan

Berikan Enhancin Suspension untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor.

Amat penting untuk anak anda mengambil Enhancin sehingga habis. Jangan berhenti mengambil ubat ini melainkan dinasihatkan oleh doktor anda - walaupun selepas anak anda berasa lebih sihat. Jika tidak dihabiskan, preskripsi ubat tersebut, jangkitan mungkin akan kembali.

Jangan berikan Enhancin melebihi tempoh 2 minggu. Jika anak anda masih berasa tidak sihat, bawa anak berjumpa dengan doktor semula.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk memberi anak anda ubat, berikannya sebaik sahaja anda teringat. Jika masa hampir tiba untuk dos seterusnya, tunggu sehingga hampir masanya dan langkau dos yang sudah terlepas. Jangan berikan dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anak anda atau orang lain mungkin menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Mereka mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan sakit perut, kehadiran kristal dalam air kencing atau sawan.

Semasa menggunakan Enhancin

- Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Enhancin Suspension.

Ambil Enhancin Suspension hanya dengan preskripsi doktor

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Enhancin Suspension kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anak anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ujian darah dan air kencing

Jika anak anda bakal menjalani ujian darah (seperti ujian Coombs or Aspergillus EIA) atau ujian air kencing (untuk glukosa), beritahu doktor atau jururawat bahawa mereka sedang mengambil Amoxicillin/ clavulanic acid. Ini adalah kerana Amoxicillin/ clavulanic acid boleh menjejaskan keputusan kedua-dua ujian tersebut.

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika ia membuat anda berasa pening, menyebabkan alahan atau sawan, jangan memandu atau

menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Enhancin mengandungi aspartam dan maltodekstrin

- Aspartam (E951) yang merupakan sumber phenylalanine. Kandungan ini mungkin berbahaya untuk kanak-kanak yang dilahirkan dengan keadaan yang dipanggil 'phenylketonuria'.
- Enhancin mengandungi maltodekstrin (glukosa). Hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anak anda mempunyai intolerans dengan sesetengah jenis gula.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Enhancin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kesan sampingan di bawah mungkin berlaku dengan pengambilan ubat ini.

Cirit-birit adalah masalah biasa yang disebabkan oleh antibiotik yang biasanya berakhir apabila antibiotik dihentikan. Individu mungkin mengalami najis berair dan berdarah (mungkin disertai dengan kekejangan perut dan demam) selewat-lewatnya dua bulan atau lebih selepas mengambil dos terakhir antibiotik. Jika ini berlaku, hubungi doktor anda.

Berhenti memberikan Enhancin Suspension dan hubungi doktor anda dengan segera jika anak anda mengalami mana-mana yang berikut:

- Tindak balas alahan yang serius seperti Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS). DRESS biasanya bermula dengan simptom seperti selesema dengan ruam pada muka dan kemudian dengan ruam berpanjangan, suhu badan tinggi dan nodus limfa yang membesar.
- Kulit kemerahan, melepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Kesan sampingan yang mungkin dialami oleh anak anda:

Kerap

- jangkitan kulat
- loya
- muntah

- cirit-birit

Tidak kerap

- pening
- sakit kepala
- ketidakhadaman
- ujian fungsi hati yang tidak normal
- kegatalan
- gegata

Kekerapan tidak diketahui:

- bilangan sel darah merah yang rendah
- darah mengambil masa lebih lama untuk membeku
- bengkak pada kulit, seperti di muka atau tekak (*angioedema*), menyebabkan kesukaran bernafas
- keradangan saluran darah yang mungkin kelihatan seperti bintik merah atau ungu timbul pada kulit, tetapi boleh menjejaskan bahagian lain
- keaktifan luar biasa (bersifat sementara)
- sawan
- lidah menjadi gelap dan berbulu
- keradangan hati (hepatitis)
- penyakit kuning
- keradangan tiub pada buah pinggang
- kristal dalam air kencing

Jarang

- pengurangan sel darah putih dan kiraan platelet
- perubahan warna gigi terutamanya pada kanak-kanak

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika mana-mana kesan sampingan yang disenaraikan semakin teruk atau menyukarkan, atau jika anda menyedari apa-apa kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Enhancin

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, terlindung daripada kelembapan
Selepas dibancuh dengan air, campuran suspensi perlu disimpan di dalam peti

sejuk pada suhu antara 2 hingga 8°C dan digunakan dalam masa 7 hari.

Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau sisa isi rumah. Rujuk ahli farmasi anda tentang langkah pelupusan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk putih atau hampir putih yang menghasilkan campuran berwarna putih ke kuning cair apabila ditambah air.

- Bahan-bahan

- *Bahan aktif*

Setiap 5ml larutan mengandungi 250 mg *Amoxicillin* dan 62.5 mg *Clavulanic acid*

- *Bahan tak aktif*

Butylated Hydroxytoluene, Xanthan Gum, Monosodium Citrate, Sodium Citrate, Passion Fruit Flavour, Aspartame, Sorbitol, Sodium Benzoate

- Nombor MAL:

MAL20001809AZ

Pengilang

Sun Pharmaceutical Ind. Ltd.
Kawasan Perindustrian - 3,
Dewas - 455 001 India

Pemegang Pendaftaran Produk

RANBAXY (MALAYSIA) SDN. BHD.
(A Sun Pharma Company)
Lot 23, Kawasan Perindustrian Bakar Arang
08000 Sungai Petani.
Kedah, MALAYSIA

Tarikh kemaskini

14/10/2025

Nombor siri:

NPRA(R2/2)061025/01554