

VAMLO TABLETS

Amlodipine Besilate (5 dan 10 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah **kegunaan VAMLO TABLETS**
2. Bagaimana **VAMLO TABLETS** berfungsi
3. Sebelum mengambil **VAMLO TABLETS**
4. Cara menggunakan **VAMLO TABLETS**
5. Semasa menggunakan **VAMLO TABLETS**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **VAMLO TABLETS**
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan VAMLO TABLETS

VAMLO TABLET digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) atau jenis sakit dada tertentu yang dikenali sebagai angina, satu bentuk yang jarang berlaku di mana ianya adalah *Prinzmetal* atau varian angina.

Bagaimana VAMLO TABLETS berfungsi

VAMLO TABLETS mengandungi bahan aktif *amlodipine* yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai antagonis kalsium.

Pada pesakit dengan tekanan darah tinggi, ubat anda berfungsi dengan mengendurkan saluran darah supaya darah boleh melalui nya dengan lebih mudah. Pada pesakit yang mengalami angina, *amlodipine* berfungsi dengan meningkatkan bekalan darah kepada otot jantung yang kemudiannya menerima lebih banyak oksigen dan dengan itu sakit dada akan dihalang. Ubat anda tidak memberi kelegaan yang cepat untuk sakit dada akibat daripada angina.

Doktor anda mungkin telah preskription ubat ini atas sebab-sebab yang lain. Tanya doktor anda jika anda ada sebarang soalan mengenai mengapa ubat ini telah dipreskription untuk anda.

Sebelum menggunakan VAMLO TABLETS

- Bila tidak boleh mengambil

Jika anda ada alahan (hipersensitif) kepada *amlodipine*, atau mana-mana perubatan lain dalam kelas yang sama (*dihydropyridines* contohnya *nifedipine*, *felodipine*.) atau mana-mana bahan didalam ubat ini (lihat **Maklumat Lanjut** pada akhir risalah) Beberapa gejala reaksi alahan mungkin termasuk: ruam kulit, gatal-gatal, bengkak muka, bibir, lidah dan tekak atau kesukaran bernafas.

- Sebelum mula mengambil

Anda mesti memberitahu doktor anda jika anda:

- Mengalami atau pernah mengalami kegagalan jantung
- Mengalami masalah hati

Kehamilan dan penyusuan bayi

Keselamatan *amlodipine* semasa kehamilan belum diketahui. **Jika anda hamil, anda fikir anda mungkin hamil atau anda sedang merancang untuk hamil, anda perlu memberitahu doktor anda sebelum anda mengambil VAMLO TABLETS.**

Ia tidak diketahui sama ada *amlodipine* dialirkan ke dalam susu ibu. Adalah disyorkan untuk menghentikan penyusuan bayi ketika mengambil **VAMLO TABLET.**

Jika anda belum memberitahu doktor anda tentang apa-apa perkara di atas, memberitahu mereka sebelum anda mula mengambil **VAMLO TABLETS.**

Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil **VAMLO TABLETS.**

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain termasuk apa-apa yang telah anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi,

pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

VAMLO TABLETS boleh mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ubat-ubatan lain, seperti:

- *ketoconazole*, *itraconazole* (ubat-ubatan anti-kulat)
- *ritonavir* dan perencat protease yang lain (ubat yang digunakan untuk merawat HIV)
- *rifampicin* (ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria)
- *hypericum perforatum* (*Wort St John*)
- *diltiazem* (ubat-ubatan jantung)

Cara menggunakan VAMLO TABLETS

Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Ianya mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini.

Jika anda tidak faham arahan pada risalah ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa mengambil ubat ini seperti yang diarahkan doktor anda.

Dos biasa **VAMLO TABLETS** yang disyorkan untuk tekanan darah tinggi dan angina adalah 5 mg setiap hari. Doktor anda boleh meningkatkan dos sehingga maksimum 10 mg setiap hari bergantung kepada tindak balas anda.

Untuk kanak-kanak:

VAMLO TABLETS tidak digalakkan untuk digunakan di kalangan kanak-kanak oleh kerana keselamatan dan keberkesanannya belum terbukti untuk golongan ini.

Pesakit dengan masalah hati

Jika anda mempunyai masalah hati, maka doktor anda akan menentukan dos **VAMLO TABLETS** yang betul untuk anda.

Cara mengambilnya

Ambil **VAMLO TABLETS** melalui mulut, dengan atau tanpa makanan.

Telan keseluruhan tablet dengan minum segelas air yang penuh.

Anda tidak sepatutnya mengambil **VAMLO TABLETS** dengan limau gedang atau jus limau gedang. Ini adalah kerana limau gedang atau jus limau gedang boleh membawa kepada peningkatan dalam tahap bahan aktif amlodipine dalam darah, yang boleh menyebabkan peningkatan yang tidak menentu dalam kesan penurunan tekanan darah oleh **VAMLO TABLETS**.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda pada masa yang sama setiap hari.

Mengambilnya pada masa yang sama setiap hari akan mempunyai kesan yang terbaik. Ia juga akan membantu anda ingat bila untuk mengambilnya.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda mesti mengambil **VAMLO TABLETS** setiap hari. Teruskan mengambil ubat anda untuk jangka masa seperti yang dinasihatkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Ia amatlah penting untuk anda tidak terlepas mana-mana dos. Jika anda terlepas satu dos **VAMLO TABLETS**, ambilnya secepat mungkin, dan kemudian ambil dos yang dijadualkan berikutnya pada masa yang tetap. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas itu. Tunggu dan mengambil dos seterusnya pada masa yang tetap. **Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos individu yang dilupa.**

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Segera telefon doktor anda atau Pusat Maklumat Racun untuk nasihat, atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang terdekat, jika anda berfikir bahawa anda atau sesiapa sahaja telah mengambil terlalu banyak **VAMLO TABLETS.**

Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Bawa risalah ini atau beberapa tablet dengan anda supaya doktor anda akan tahu apa yang telah anda ambil.

Semasa menggunakan **VAMLO TABLETS**

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda akan memulakan sebarang ubat baru, beritahu doktor atau ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil **VAMLO TABLETS**.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil, fikir anda mungkin mengandung atau menyusukan anak.

Simpan semua perjumpaan dengan doktor anda supaya perkembangan anda dapat di periksa.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Vamlo Tablet untuk merawat apa-apa keadaan lain kecuali doktor anda memberitahu anda.

Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diambil perhatian

Anda perlu tahu bagaimana anda bertindak balas terhadap **VAMLO TABLETS** sebelum memandu atau mengoperasikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda mempunyai sebarang masalah semasa menggunakan **VAMLO TABLETS**.

Seperti ubat-ubatan lain, **VAMLO TABLETS** boleh mempunyai kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan

berikut. Anda mungkin tidak akan mengalami apa-apa daripadanya

Kesan sampingan yang serius

Beritahu doktor anda dengan segera ataupun pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang terdekat jika anda mendapati mana-mana yang berikut:

- bengkak muka, bibir, mulut, lidah atau kerongkong yang boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas
- bintik kemerahan yang sering gatal, sama seperti ruam campak, yang bermula pada anggota badan dan kadang-kadang di muka dan seluruh badan
- rentak jantung yang tidak normal
- jantung berdegup pantas atau tidak teratur berdegup, sakit dada yang boleh merebak ke leher dan bahu
- kerap mendapat jangkitan seperti demam, seram sejuk yang teruk, sakit tekak atau ulser mulut; mudah mendapat pendarahan atau lebam daripada biasa
- Sakit perut pada bahagian atas yang teruk, selalunya dengan loya dan muntah
- loya, muntah, hilang selera makan,
- kekuningan pada kulit dan mata, berwarna kemudaan pada air besar, air kencing berwarna gelap
- pengsan, mengeletar

Kesan sampingan yang lain

Beritahu doktor anda jika anda mendapati mana-mana daripada yang berikut:

- pening, sakit kepala, mengantuk, keletihan
- gangguan penglihatan
- *flushing*, tekanan darah rendah
- pendarahan, *tender* atau pembesaran gusi
- rasa sakit, sakit perut
- bengkak pada pergelangan kaki, kaki, muka atau tangan

Keabnormalan makmal

- bilangan sel darah yang tidak normal
- peningkatan paras gula dalam darah
- peningkatan dalam enzim hati

Kesan sampingan yang lain tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada sesetengah orang. Beritahu doktor

anda jika anda mendapati apa-apa kesan yang lain.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda ada.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan VAMLO TABLETS

- Penyimpanan

VAMLO TABLETS 5 MG/10MG:

Simpan dibawah suhu 30°C,
Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Kembalikan **VAMLO TABLETS** yang tidak digunakan atau tamat tempoh kepada doktor, ahli farmasi atau pakar kesihatan untuk pelupusan.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna VAMLO TABLETS

- **VAMLO TABLET 5 MG/10MG**
Putih hingga putih kekuningan, rata, sisi tepi serong, bulat, tablet tidak bersalut dengan garis skor pada satu sisi.
5mg :Diameter = 8.0 mm
10mg :Diameter = 10.5mm

- Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif: *Amlodipine besilate BP* bersamaan dengan *Amlodipine 5 mg/10 mg*

Bahan-bahan Tidak Aktif: *Microcrystalline Cellulose, Dibasic Calcium Phosphate, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate.*

- Nombor MAL

VAMLO TABLETS 5 MG :
MAL07010992AZ

VAMLO TABLETS 10 MG :
MAL07010993AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

RANBAXY (MALAYSIA) SDN. BHD.
Lot 23, Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani,
Kedah, Malaysia.

Tarikh Dikemaskini

20 Dec 2020

Nombor Siri
NPRA(R2/1)190524/153