TALIS 20

(Tadalafil Tablet 20mg) ***Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)***

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **TALIS 20**
2. Bagaimana **TALIS 20** berfungsi
3. Sebelum mengambil **TALIS 20**
4. Cara menggunakan **TALIS 20**
5. Semasa menggunakan **TALIS 20**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **TALIS 20**
8. Produk deskripsi
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Bersiri

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan tentang ubat ini, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Simpan risalah ini dengan ubat.
Anda mungkin perlu merujuknya semula.

Apakah kegunaan TALIS 20

TALIS 20 mengandungi bahan kandungan aktif tadalafil.

Tadalafil digunakan untuk merawat orang dewasa dengan:

- disfungsi erektil, juga dikenali sebagai mati pucuk, pada lelaki. Ini adalah apabila seorang lelaki tidak boleh mendapatkan, atau mengekalkan, zakar tegang keras sesuai untuk aktiviti seksual.

Bagaimana TALIS 20 berfungsi

Disfungsi Erektil
Berikutan rangsangan seksual, tadalafil berfungsi dengan membantu saluran darah di dalam zakar anda untuk berehat, membolehkan aliran darah ke dalam zakar anda. Keputusannya adalah erektil berfungsi dengan lebih baik.

Tadalafil tidak akan membantu anda jika anda tidak mempunyai disfungsi erektil. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tadalafil untuk rawatan mati pucuk tidak akan berfungsi jika tidak ada rangsangan seksual.

Anda dan pasangan anda akan perlu melibatkan diri dalam cumbuan sebelum persetubuhan (*foreplay)*, seperti yang anda akan lakukan jika anda tidak mengambil ubat untuk disfungsi erektil.

Sebelum mengambil TALIS 20

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil TALIS 20:

- Jika anda alah kepada Tadalafil atau mana-mana bahan kandungan lain ubat ini (lihat Maklumat Lanjut di akhir risalah ini). Reaksi alahan boleh termasuk ruam kulit, gatal-gatal, bengkak pada muka, bibir, lidah dan tekak atau kesukaran untuk bernafas.
- jika anda sedang mengambil sebarang nitrat atau nitrit amyl (ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat sakit dada).
- mempunyai penyakit jantung yang serius atau baru-baru ini mengalami serangan jantung dalam tempoh 90 hari yang lepas.
- baru-baru ini mempunyai strok dalam tempoh 6 bulan yang lepas
- mempunyai tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi yang tidak terkawal.
- jika anda mempunyai kehilangan penglihatan pada sebelah mata kerana tiada arteritic dalaman neuropati optik iskemia (NAION)
- sedang mengambil riociguat, ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah rendah arteri paru-paru

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada bungkusan telah tamat atau jika pembungkusan koyak atau menunjukkan tanda-tanda telah diusik.

Jika ia telah luput atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil TALIS 20, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi.

Sebelum mula mengambil

Bercakap dengan doktor anda sebelum mengambil **TALIS 20**.

Perlu diketahui bahawa aktiviti seksual membawa risiko kepada pesakit dengan penyakit jantung kerana ia memberikan tekanan tambahan pada hati anda. Sekiranya anda mempunyai masalah jantung, anda harus memberitahu doktor anda.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan kepada apa-apa ubat, makanan, pengawet atau pewarna lain.

Sebelum mengambil tablet, beritahu doktor anda jika anda mempunyai:
- Anemia sel sabit (kelainan sel darah merah).
- pelbagai myeloma (kanser tulang sumsum).
- leukemia (kanser sel darah).
- apa-apa ubah bentuk zakar anda.
- masalah hati atau buah pinggang yang serius.

Anda tidak boleh menggunakan ubat ini jika anda mempunyai masalah keturunan yang tidak teratur intoleransi galaktosa, kekurangan Lapp laktase atau malabsorpsi glukosa-galaktosa.

Tadalafil tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh wanita.

Kanak-kanak dan remaja
TALIS 20 tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak dan remaja di bawah umur 18 tahun.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Jangan mengambil tadalafil jika anda sudah mengambil nitrat.

Sesetengah ubat mungkin terjejas oleh tadalafil atau mereka mungkin menjejaskan seberapa baik tadalafil akan berfungsi.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sudah mengambil:

- penghalang alpha (digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi atau gejala kencing yang berkaitan dengan hiperplasia prostat jinak).
- ubat lain untuk merawat tekanan darah tinggi.
- riociguat.
- perencat 5 alpha reductase (digunakan untuk merawat hiperplasia prostatic benign).
- ketoconazole, itraconazole (digunakan untuk merawat jangkitan kulat)
- ritonavir, saquinavir (inhibitor protease untuk rawatan jangkitan HIV).
- phenobarbital, phenytoin dan carbamazepine (untuk rawatan sesuai dan syarat-syarat CNS yang lain).
- Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (untuk rawatan jangkitan bakteria).
- Rawatan lain untuk disfungsi erektil.

Jus limau gedang boleh menjejaskan bagaimana tadalafil akan berfungsi dan perlu diambil dengan berhati-hati. Bincang dengan doktor anda untuk maklumat lanjut.

Cara menggunakan TALIS 20

Berapa banyak harus digunakan

Berapa banyak yang perlu digunakan
Sentiasa ambil ubat ini dengan tepat seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

TALIS 20 adalah untuk kegunaan lisan pada lelaki sahaja.

- Dos permulaan yang disyorkan ialah 10 atau 20 mg diambil sebelum aktiviti seksual. Doktor anda akan menentukan dos yang sesuai untuk anda.
- Jika anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang, doktor anda akan menyesuaikan dos anda dengan sewajarnya.

Bagaimana untuk mengambilnya
TALIS 20 boleh diambil dengan atau tanpa makanan. Swallow TALIS 20 dengan segelas air.

Bila hendak menggunakannya
Anda mungkin mengambil tablet sekurang-kurangnya 30 minit sebelum aktiviti seksual. TALIS 20 mungkin masih berkesan sehingga 36 jam selepas mengambil tablet.

Berapa lama untuk menggunakannya
Jangan ambil TALIS 20 (tadalafil) lebih daripada sekali sehari. Tadalafil bertujuan untuk digunakan sebelum aktiviti seksual yang dijangkakan dan tidak digalakkan untuk penggunaan harian yang berterusan.

Sekiranya anda terlupa menggunakannya
Ambil dos anda sebaik sahaja anda ingat tetapi tidak mengambil dos berganda untuk membuat tablet terlupa. Anda tidak boleh mengambil TALIS 20 lebih daripada sekali sehari.

Sekiranya anda menggunakan terlalu banyak (terlebih dos)
Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Ambil risalah ini atau kotak TALIS 20 dengan anda supaya doktor anda akan tahu apa yang telah anda ambil.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

5. Semasa menggunakan TALIS 20

Perkara yang perlu dilakukan

Sebelum memulakan sebarang ubat-ubatan baru, beritahu doktor atau ahli farmasi yang anda mengambil **TALIS 20.**

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun simptom- simptom mereka kelihatan serupa dengan anda.

Minum alkohol mungkin menurunkan tekanan darah anda buat sementara waktu. Jika anda telah mengambil atau merancang untuk mengambil tadalafil, elakkan minum berlebihan kerana ini boleh meningkatkan risiko pening apabila berdiri.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Sesetengah lelaki yang mengambil tadalafil telah melaporkan rasa pening. Periksa dengan teliti bagaimana anda bertindak balas kepada tablet sebelum memandu atau mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Sekiranya anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut, berhenti menggunakan ubat dan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta:

Kesan sampingan yang serius (jarang berlaku)
- reaksi alergi termasuk ruam, bengkak muka, bibir, mulut, lidah atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran menelan dan pernafasan
- Keadaan kulit yang langka dengan lepuh yang teruk dan pendarahan di bibir, mata, mulut, hidung dan alat kelamin
- sakit dada (jangan gunakan nitrat tetapi dapatkan bantuan perubatan segera)
- pendarahan yang berpanjangan dan mungkin menyakitkan selepas mengambil TALIS 20, yang berterusan selama lebih dari 4 jam, anda perlu menghubungi doktor dengan serta-merta
- kehilangan penglihatan secara tiba-tiba
- kehilangan pendengaran secara mendadak yang mungkin disertai dengan berdering di telinga dan pening
- Serangan jantung, degupan jantung yang tidak normal
- serangan strok, pengsan atau penyitaan

Kesan sampingan yang lain:

Biasa
- sakit kepala dan tidak berjangkit (senak).
- penyembuhan, sakit belakang, sakit otot, kesesakan hidung

Jika anda mendapat apa-apa kesan sampingan, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuk apa-apa kesan sampingan yang mungkin tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my *[Consumers →Reporting*

Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan TALIS 20

Penyimpanan:
Simpan di bawah 30°C, dilindungi dari cahaya.

Pelupusan
Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Produk deskripsi

Rupa dan warna

TALIS 20 adalah tablet berwarna kuning, berbentuk bujur. Dwi-cembung, bersalut filem, tidak dicetak di kedua-dua sisi.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif :
Tadalafil

Bahan tidak aktif :
Poloxamer (188) (Lutrol F 68), Hydroxy Propyl cellulose, Lactose Monohydrate, Crosspovidone, Microcrystalline cellulose, Crosspovidone, Microcrystalline cellulose, Colloidal Anhydrous Silica, Magnesium Stearate

9. Pengilang

Sun Pharma Laboratories Limited,
6-9, EPIP, Kartholi, Bari Brahmana,
Jammu 181 133, India

Pemegang Pendaftaran Produk

RANBAXY (MALAYSIA) SDN. BHD.
Lot 23, Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Nombor MAL:
MAL20016137AZ

Tarikh kemaskini RiMUP
Mei 2024

Nombor siri:
NPRA (R2) 19/120