

RANOZYP TABLET

Olanzapine Tablet 5/10 mg

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **RANOZYP TABLET**
2. Bagaimana **RANOZYP TABLET** berfungsi
3. Sebelum mengambil **RANOZYP TABLET**
4. Cara menggunakan **RANOZYP TABLET**
5. Semasa menggunakan **RANOZYP TABLET**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **RANOZYP TABLET**
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP
12. Nombor Bersiri

Risalah ini menjelaskan beberapa persoalan biasa tentang **RANOZYP TABLET**.

Risalah ini tidak mengandungi semua maklumat yang sedia ada. Ia juga tidak menggantikan perbincangan di antara anda dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Semua ubat-ubatan mempunyai risiko dan faedah. Doktor anda boleh menimbangkan risiko anda mengambil **Tarlonib** disamping faedah yang diharapkan pada anda.

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan tentang ubat ini, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Simpan risalah ini dengan ubat. Anda mungkin perlu merujuknya semula.

1. Apakah kegunaan **RANOZYP TABLET**

RANOZYP TABLET tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil antipsikotik. Ini membantu untuk membetulkan ketidakseimbangan kimia di dalam otak, yang boleh menyebabkan penyakit mental.

RANOZYP TABLET digunakan untuk merawat penyakit dengan

simptom seperti pendengaran, melihat atau merasa perkara yang tidak wujud, salah tafsir, kecurigaan yang luar biasa dan memencilkan diri. Orang dengan penyakit ini juga mungkin berasa tertekan, cemas atau tegang.

RANOZYP TABLET digunakan untuk merawat keadaan dengan simtom seperti rasa "seronok", mempunyai jumlah tenaga yang berlebihan, memerlukan kurang tidur daripada biasa, bercakap dengan cepat dengan idea-idea yang meluru dan kadang-kadang dengan kemarahan yang teruk. Ia juga merupakan penstabil mood yang menghalang kejadian selanjutnya kelompok mood melampau yang tinggi dan rendah (tertekan) yang berkaitan dengan keadaan ini.

Doktor anda mungkin telah preskrikan **RANOZYP TABLET** untuk sebab lain.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai mengapa **RANOZYP TABLET telah dipreskrikan untuk anda.**

Ubat ini hanya boleh di dapat dengan preskripsi doktor.

2. Bagaimana **RANOZYP TABLET** berfungsi

RANOZYP TABLET mengandungi bahan aktif, olanzapine yang merupakan sejenis ubat yang dipanggil antipsikotik.

RANOZYP TABLET membantu untuk membetulkan ketidakseimbangan kimia di dalam otak, yang boleh menyebabkan penyakit mental.

3. Sebelum mengambil **RANOZYP TABLET**

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil **RANOZYP TABLET**

jika anda alah (hipersensitif) kepada olanzapine atau mana-mana bahan kandungan lain **RANOZYP TABLET** yang disenaraikan di akhir risalah ini.

Beberapa simtom tindak balas alergi termasuk:

Sesak nafas, berdehidat atau kesukaran untuk bernafas, bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian lain badan, ruam, gatal-gatal atau kulit merah dan menaik.

- jika anda sebelum ini didiagnosis dengan masalah mata seperti beberapa jenis glaukoma (peningkatan tekanan pada mata).

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada bungkusan atau jika bungkusan itu koyak atau menunjukkan tanda-tanda telah diusik.

Tarikh luput merujuk pada hari terakhir bulan itu. Jika ia telah tamat tempoh atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mula mengambil **RANOZYP TABLET, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda**

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan kepada ubat, makanan, pengawet atau pewarna lain.

Beritahu doktor anda jika anda ada atau mempunyai mana-mana keadaan perubatan yang berikut:

- penyakit darah dengan bilangan sel darah putih yang berkurangan
- penyakit saluran darah otak, termasuk strok
- masalah prostat
- penyakit hati
- penyakit Parkinson
- gula darah tinggi, kencing manis atau sejarah keluarga untuk kencing manis (doktor anda akan menasihatkan anda

untuk memantau tahap gula darah dan berat badan dengan kerap)

- ileus paralitik, keadaan di mana usus kecil tidak berfungsi dengan baik
- epilepsi (sawan)
- penyakit jantung, termasuk irama jantung yang tidak teratur (pemanjangan - QT).
- sindrom malignan neuroleptik, satu tindak balas terhadap beberapa ubat-ubatan dengan peningkatan suhu badan secara tiba-tiba, tekanan darah tinggi yang melampau dan konvulsi teruk
- dyskinesia tardive, tindak balas kepada beberapa ubat-ubatan dengan pergerakan berkerengat atau sentakan tangan dan kaki yang tidak terkawal. Sekiranya ini berlaku selepas anda diberi **RANOZYP TABLET** beritahu doktor anda

Penggunaan **RANOZYP TABLET** pada orang berusia dengan demensia tidak digalakkan kerana ia mungkin mempunyai kesan sampingan yang serius.

Mengambil **RANOZYP TABLET** boleh menyebabkan peningkatan berat badan. Doktor anda akan menasihati anda untuk memantau berat badan anda dengan kerap.

Sekiranya anda berisiko tinggi untuk mendapat tromboembolisme (penyumbatan saluran darah dengan pembekuan darah yang terbentuk di tempat lain di dalam badan) kerana terlanjar dikatil dan sebagainya, Doktor anda akan menasihati anda untuk mengambil langkah pencegahan tertentu.

Penggunaan **RANOZYP TABLET** boleh menghasilkan simptom yang berkaitan dengan kesukaran untuk menelan (dysphagia) dan keradangan paru-paru akibat bernafas masuk bahan asing (aspirasi pneumonia). Aspirasi pneumonia adalah komplikasi yang dikaitkan dengan penyakit Alzheimer (demensia dengan kehilangan ingatan dan kebolehan mental yang lain). Aspirasi pneumonia adalah punca biasa kematian dan morbiditi pada pesakit

yang ada penyakit Alzheimer pada tahap maju. Penggunaan **RANOZYP TABLET** tidak disyorkan pada pesakit dengan penyakit Alzheimer.

Penggunaan **RANOZYP TABLET** boleh menghasilkan tahap prolaktin yang tinggi (satu kimia yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari) dalam darah. Tahap prolaktin yang tinggi dalam darah boleh menyebabkan:

- rembesan susu dari payudara yang tidak biasa (galactorrhea)
- tiada kitaran haid
- pembesaran payudara pada lelaki (gynecomastia)
- mati pucuk
- penurunan ketumpatan tulang

Sekiranya anda berusia lebih 65 tahun, tekanan darah anda perlu dipantau dengan kerap kerana **RANOZYP TABLET** boleh menyebabkan penurunan tekanan darah.

Doktor anda akan menasihati anda mengenai penjagaan yang sesuai untuk mengelakkan terlebih panas dan dehidrasi. Anda dinasihatkan untuk menghubungi doktor anda dengan segera jika anda sakit teruk dan mempunyai beberapa atau semua simptom dehidrasi: berpeluh keterlaluan atau tidak sama sekali, mulut kering, merasa sangat panas, berasa dahaga, tidak dapat menghasilkan air kencing

Sekiranya anda tidak memberitahu doktor mengenai perkara di atas, beritahu mereka sebelum anda mula mengambil RANOZYP TABLET.

Mengambil RANOZYP TABLET dengan minuman

Jangan minum alkohol jika anda diberi **RANOZYP TABLET** sebab **RANOZYP TABLET** bersama-sama dengan alkohol boleh membuat anda merasa mengantuk.

Kehamilan dan menyusui

Beritahu doktor anda secepat mungkin jika anda hamil atau fikir anda mungkin mengandung. Anda tidak boleh mengambil ubat ini semasa hamil, melainkan anda telah membincangkannya dengan doktor anda. Anda tidak boleh diberikan ubat

ini semasa memberi susu ibu kepada anak, sebab jumlah **RANOZYP TABLET** yang kecil boleh melalui susu ibu.

Simptom-simptom berikut boleh berlaku pada bayi yang baru lahir, ibu-ibu yang telah menggunakan **RANOZYP TABLET** pada trimester terakhir (tiga bulan terakhir kehamilan mereka): kegoyangan, kekejangan otot dan/atau kelemahan, mengantuk, agitasi, masalah pernafasan, dan kesukaran untuk menyusu anak. Jika bayi anda mengalami simptom-simptom ini, anda mungkin perlu menghubungi doktor anda.

Maklumat penting mengenai beberapa bahan kandungan RANOZYP TABLET

RANOZYP TABLET mengandungi laktosa. Sekiranya anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anda mempunyai sikap tidak toleran terhadap beberapa gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil produk perubatan ini.

Beritahu doktor anda jika anda merokok.

Merokok boleh menjejaskan **RANOZYP TABLET** atau mungkin menjejaskan cara ianya berfungsi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan **RANOZYP TABLET** boleh mengganggu antara satu sama lain. Ini termasuk:

- fluvoxamine (ubat yang digunakan untuk kemurungan)
- carbamazepine, ubat yang digunakan untuk penstabilan mood dan merawat epilepsi
- ubat-ubatan lain yang bertindak secara berpusat (contohnya, ubat penenang)
- diazepam (ubat yang digunakan untuk merawat kecemasan)

- ciprofloxacin, ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria
- ketoconazole, ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat
- ubat-ubatan yang menurunkan tekanan darah
- ubat yang digunakan untuk penyakit Parkinson
- ubat-ubatan yang boleh mengubah aktiviti elektrik jantung atau menjadikannya lebih cenderung untuk berubah
- arang yang diaktifkan
- omeprazole, ubat yang digunakan untuk merawat keasidan
- rifampin, ubat yang digunakan untuk merawat batuk kering

Anda harus tahu bahawa alkohol boleh menambah kesan hipotensi ortostatik (pening semasa berdiri, terutamanya apabila bangun dari posisi duduk atau berbaring) yang disebabkan oleh ubat ini. Jangan minum alkohol semasa mengambil RANOZYP TABLET.

Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat mengenai ubat untuk anda berhati-hati dengan atau dielakkan semasa mengambil RANOZYP TABLET.

4. Cara menggunakan RANOZYP TABLET

Ikuti semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan berhati-hati.

Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Jika anda tidak memahami arahan pada kotak, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan.

Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak RANOZYP TABLET anda patut ambil. Dos yang doktor anda akan preskription untuk anda adalah seperti berikut:

Schizophrenia

Dos permulaan biasa untuk rawatan adalah 10 mg setiap hari.

Episod manik

Dos permulaan yang biasa untuk rawatan episod manik adalah 15 mg setiap hari apabila digunakan secara bersendirian dan 10 mg setiap hari apabila digunakan bersama dengan ubat-ubatan lain yang digunakan untuk merawat episod manik.

Mencegah gangguan bipolar dari berulang

Dos permulaan biasa ialah 10 mg setiap hari.

Semasa rawatan untuk penyakit yang disebutkan di atas, doktor anda boleh meningkatkan atau mengurangkan dos anda untuk mencari dos yang tepat untuk keadaan anda dan ini biasanya boleh berada dalam lingkungan 5 mg hingga 20 mg sehari.

Warga Emas

Satu dos permulaan yang lebih rendah boleh dipreskription untuk pesakit-pesakit yang berusia (lebih daripada 65 tahun).

Kanak-kanak

RANOZYP TABLET tidak disyorkan untuk digunakan pada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun kerana tidak ada maklumat yang mencukupi mengenai kesannya dalam kumpulan umur ini.

Masalah buah pinggang / hati

Pada pesakit dengan penyakit ginjal atau hati, dos yang lebih rendah (5 mg) boleh dipreskription.

Cara digunakan

RANOZYP TABLET harus ditelan keseluruhan dengan segelas air.

Bila perlu digunakan

RANOZYP TABLET perlu diambil sekali sehari seperti yang dinasihatkan oleh doktor anda.

Ambil dos yang dipreskription pada masa yang sama setiap hari.

RANOZYP TABLET boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti mengambil RANOZYP TABLET hanya kerana

anda berasa lebih baik. Adalah penting bahawa anda TIDAK berhenti mengambil RANOZYP TABLET melainkan doktor anda memberitahu anda.

Jika terlupa menggunakan

Sekiranya ia hampir masa untuk dos anda yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan ambil dos seterusnya apabila anda sepatutnya

Jika tidak, ambilnya sebaik sahaja anda ingat, dan kemudian kembali untuk mengambil tablet anda seperti biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Segera hubungi doktor anda untuk nasihat, atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat, jika anda berfikir bahawa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak RANOZYP TABLET. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Sekiranya anda mengambil terlalu banyak RANOZYP TABLET, tanda-tanda yang paling biasa adalah denyutan jantung cepat, agitasi / agresif, kesukaran untuk bercakap, pergerakan yang tidak terkawal dan tahap kesedaran yang dikurangkan dari penenang kepada koma.

Simptom-simptom lain yang mungkin: kekeliruan akut, sawan (epilepsi), koma, satu gabungan demam, pernafasan yang lebih cepat, berpeluh, kekakuan otot dan mengantuk atau rasa tidur, memperlancarkan kadar pernafasan, aspirasi, tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, irama jantung yang tidak normal.

5. Semasa menggunakan RANOZYP TABLET

Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya anda akan memulakan sebarang ubat baru, ingatkan doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda

sedang mengambil **RANOZYP TABLET**.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil RANOZYP TABLET.

Sekiranya anda mengandung semasa mengambil ubat ini, beritahu doktor anda dengan serta-merta.

Tepati semua temu janji dengan doktor anda supaya kemajuan anda dapat diperiksa.

- Doktor anda harus memantau berat badan semasa anda mengambil **RANOZYP TABLET**.
- Pesakit kencing manis atau yang mempunyai peluang lebih tinggi untuk mendapat kencing manis harus membuat pemeriksaan gula darah mereka dengan kerap.
- **RANOZYP TABLET** boleh mengubah profil lipid, jika anda gunakan **RANOZYP TABLET** doktor anda akan memantau profil lipid anda dari semasa ke semasa
- Sekiranya anda berusia lebih 65 tahun, doktor anda boleh menyukat tekanan darah anda dari semasa ke semasa.

Bercakap dengan doktor atau profesional kesihatan mental jika anda berfikir atau bercakap tentang kematian atau membunuh diri; atau berfikir atau bercakap tentang kemudaratan diri atau membahayakan orang lain.

Ini mungkin tanda-tanda yang penyakit mental anda ada perubahan atau semakin memburuk.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil **RANOZYP TABLET** dengan tiba-tiba. Ini boleh mengakibatkan berpeluh, kesukaran untuk tidur, gegaran, ketakutan, rasa sakit (mual) atau sakit (muntah). Doktor anda mungkin mencadangkan anda mengurangkan dos secara beransur-ansur sebelum menghentikan rawatan.

Jangan berikan **RANOZYP TABLET** kepada orang lain walaupun simptom mereka kelihatan sama atau mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Doktor anda telah preskrikan **RANOZYP TABLET** untuk anda dan keadaan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila meminum alkohol semasa mengambil RANOZYP TABLET.

Kesan alkohol boleh menjadi lebih buruk semasa mengambil **RANOZYP TABLET**.

Doktor anda mungkin mencadangkan anda mengelakkan alkohol semasa anda dirawat dengan **RANOZYP TABLET**.

Sekiranya **RANOZYP TABLET** membuat anda berasa ringan kepala, pening atau pengsan, berhati-hati apabila bangun dari posisi duduk atau berbaring. Membangun dengan perlahan boleh membantu. Kesan ini boleh meningkat sekiranya anda menggunakannya bersama dengan diazepam (ubat yang digunakan untuk merawat kecemasan) atau alkohol.

Berhati-hati ketika memandu atau mengendalikan mesin

Terdapat risiko merasa mengantuk atau pening apabila anda diberi **RANOZYP TABLET**. Jika ini berlaku jangan memandu atau mengendalikan sebarang alat atau mesin. Beritahu doktor anda.

6. Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, RANOZYP TABLET boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan yang tidak diingini.

Kadang-kadang ada yang serius, tetapi pada kebanyakan masanya mereka tidak. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan jika anda mendapat beberapa kesan sampingan.

Jangan terkejut dengan senarai kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak akan mengalami mana-mana daripadanya.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda ada.

Kesan-kesan sampingan yang serius

Beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat jika anda nampak mana-mana yang berikut

- Tanda-tanda tindak balas alahan secara tiba-tiba seperti ruam kulit, gatal-gatal, sesak nafas atau bengkak muka, bibir atau lidah.
- Sangat jarang: Reaksi alergi yang serius seperti Reaksi Dadah dengan Eosinophilia dan Simptom Sistemik (DRESS). DRESS muncul pada mulanya sebagai simptom seperti selesema dengan ruam di muka dan kemudian dengan ruam yang dilanjutkan, suhu tinggi, nodus limfa yang diperbesarkan, peningkatan tahap enzim hati yang dilihat dalam ujian darah dan peningkatan dalam sel darah putih (eosinophilia).
- Tahap gula darah yang sangat tinggi yang boleh mengakibatkan kedahagaan yang berlebihan, sakit (muntah), kesukaran untuk bernafas, kekeliruan dan ketidaksedaran (ketoacidosis diabetik atau koma).
- Peningkatan suhu badan dengan tiba-tiba, berpeluh, denyutan jantung yang cepat, kekakuan otot, tekanan darah tinggi dan sawan
- Irama jantung yang tidak normal
- Percubaan untuk bunuh diri
- Kekejangan otot yang tidak terkawal
- Pergerakan lidah seperti cacing atau pergerakan lain yang tidak terkawal pada lidah, mulut, pipi atau rahang yang mungkin boleh maju ke lengan dan kaki
- Gegaran, postur tegar, pergerakan yang perlahan dan berjalan tidak seimbang sambil mengheret kaki (Parkinsonisme)
- Jangkitan yang kerap seperti demam, menggigil teruk, sakit tekak atau ulser mulut, pendarahan atau lebam lebih mudah daripada biasa
- Sawan
- Reaksi berikut apabila diberhentikan dengan tiba-tiba (berpeluh berlebihan, mual atau muntah)
- Penyakit hati muncul seperti kekuningan kulit dan bahagian putih mata

- Sakit perut yang teruk, sering dengan mual dan muntah (keradangan pankreas)
- Lumpuh sementara atau kelemahan otot
- Gumpalan darah dalam urat terutama pada kaki (simptom termasuk kebengkakan, sakit, dan kemerahan di kaki), yang mungkin melalui saluran darah ke paru-paru menyebabkan kesakitan dada dan kesukaran untuk bernafas.

Kematian dengan tiba-tiba akibat gangguan jantung juga pernah dilaporkan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda nampak mana-mana yang berikut dan mereka membimbangkan anda:

- Berat badan naik
- Mengantuk
- Rasa lebih lapar, sembelit, mulut kering, kehausan meningkatkan, senak
- Pengekalan air yang membawa kepada pembengkakan tangan, pergelangan kaki atau kaki
- Pening, kegelisahan
- Keletihan atau kelemahan yang luar biasa
- Pening bila berdiri, terutamanya apabila bangun dari posisi duduk atau berbaring
- Sensitiviti terhadap cahaya matahari
- Kehilangan atau penipisan rambut yang luar biasa
- Perubahan pada suhu badan
- Kesukaran untuk bermula kencing, pembuangan air kencing yang tidak terkawal
- Ereksi yang berpanjangan dan / atau yang menyakitkan
- Kehilangan ingatan
- Merasa kebahagiaan yang melampau
- Tempoh haid yang menyakitkan, tiada tempoh haid
- Jangkitan vagina
- Kekurangan emosi atau perasaan;
- Gangguan pertuturan
- Kekeliruan, tiada kordinasi
- Tekanan darah meningkat
- Tingkah laku luar biasa
- Sakit belakang, sakit dada, sakit pada kaki dan tangan, sakit sendi
- Penglihatan yang tidak normal
- Hidung berdarah

- Batuk, kesukaran untuk bernafas
- Sakit tekak dan ketidakselesaian apabila menelan
- Peningkatan air liur
- Jerawat, kulit kering, ruam
- Titisan dari hidung
- Rasa ketegangan atau kekenyahan di hidung
- Sesemut atau rasa kebas di tangan atau kaki (paraesthesia)
- Kecederaan tidak sengaja
- Perubahan warna ungu pada kulit

Kesan sampingan tambahan yang dilaporkan pada pesakit yang berusia termasuk strok, radang paru-paru, jatuh dan halusinasi visual,

Kesan ke atas ujian makmal

- Peningkatan tahap prolactin
- Perubahan dalam tahap beberapa sel darah dan lemak yang beredar
- Peningkatan tahap glukosa dalam darah dan air kencing
- Jumlah bilirubin yang tidak normal (ujian hati)
- Peningkatan enzim hati

Beritahu doktor anda jika anda nampak apa-apa yang tidak biasa atau jika anda prihatin terhadap sebarang aspek kesihatan anda, walaupun anda fikir masalahnya tidak berkaitan dengan ubat ini dan tidak dirujuk di risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my (Public->Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

7. Cara penyimpanan dan pelupusan RANOZYP TABLET

Penyimpanan:

Simpan di bawah 30°C, dilindungi daripada kelembapan

Pelupusan

Kembalikan apa-apa ubat yang tidak digunakan atau telah tamat tempoh kepada doktor, ahli farmasi atau penjagaan kesihatan profesional untuk pelupusan yang selamat.

8. Maklumat Lanjut

Rupa dan warna RANOZYP TABLET Untuk kekuatan 5 mg : Tablet berwarna dari kuning ringan ke kuning, bulat, dwicembung dicetak timbul dengan 'O5' di satu sisi dan tidak dicetak di sisi lain.

Untuk kekuatan 10 mg: Tablet berwarna dari kuning ringan ke kuning, bulat, dwicembung dicetak timbul dengan 'O7' di satu sisi dan tidak dicetak di sisi lain.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif :

Ranozyp Tablet 5 mg
Setiap tablet mengandungi:
Olanzapine 5 mg
Ranozyp Tablet 10 mg
Setiap tablet mengandungi:
Olanzapine 10 mg

Bahan tidak aktif :

RANOZYP TABLET mengandungi:
Laktosa anhydrous (PharmatoseDCL 21)
Selulosa Mikrokristal (PH 112)
L-Hydroxy propyl selulosa (LH 21)
Magnesium Stearat (Veg)

Number MAL:

10 mg: MAL14035011AZ
5 mg: MAL14035010AZ

9. Pengilang

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
Paonta Sahib, Dist. Sirmour,
Himachal Pradesh – 173 025

10. Pemegang Pendaftaran Produk

RANBAXY (MALAYSIA) SDN. BHD.

Lot 23, Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani, Kedah

11. Tarikh kemaskini RiMUP

October 2018

12. Nombor Bersiri

Nombor Bersiri :