

DEMEALRAN TABLET

Donepezil Hydrochloride (5mg, 10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **DEMEALRAN TABLET**
2. Bagaimana **DEMEALRAN TABLET** berfungsi
3. Sebelum menggunakan **DEMEALRAN TABLET**
4. Cara menggunakan **DEMEALRAN TABLET**
5. Semasa menggunakan **DEMEALRAN TABLET**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **DEMEALRAN TABLET**
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan **DEMEALRAN TABLET**

DEMEALRAN TABLET adalah ubat preskripsi untuk merawat demensia akibat penyakit Alzheimer. Gejala termasuk peningkatan kehilangan ingatan, kekeliruan dan perubahan tingkah laku. Akibatnya, penghidap penyakit Alzheimer mendapati lebih sukar untuk menjalankan aktiviti harian mereka

Bagaimana **DEMEALRAN TABLET** Berfungsi

DEMEALRAN TABLET tidak akan menyembuhkan penyakit ini, tetapi akan membantu ingatan anda dan meningkatkan keupayaan anda untuk berfikir lebih jelas.

Ubat ini tergolong dalam kumpulan ubat dipanggil perencat *acetylcholinesterase*. Ia berfungsi dengan meningkatkan tahap bahan (*acetylcholine*) di otak yang terlibat dalam fungsi ingatan dengan melambatkan pemecahan *acetylcholine*.

DEMEALRAN TABLET belum diluluskan sebagai rawatan untuk sebarang keadaan perubatan pada kanak-kanak.

Sebelum menggunakan **DEMEALRAN TABLET**

- Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak harus mengambil **DEMEALRAN TABLET** sekiranya:

- terdapat sebarang alahan terhadap Donepezil Hydrochloride atau bahan ramuan dalam **DEMEALRAN TABLET** atau ubat yang mengandungi piperidines.
- jika anda tidak pasti, sila lihat akhir risalah ini untuk senarai bahan-bahan dalam **DEMEALRAN TABLET**.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil **DEMEALRAN TABLET** jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil **DEMEALRAN TABLET** jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakan **DEMEALRAN TABLET**

Beritahu doktor mengenai semua masalah kesihatan yang anda hadapi sekarang dan pada masa lalu. Termasuk:

- Apa-apa masalah jantung termasuk masalah dengan degupan jantung yang tidak teratur, lambat, atau cepat
- Keadaan jantung yang dipanggil 'selang QT yang berpanjangan' atau sejarah irama jantung yang tidak normal yang tertentu dipanggil Torsade de Pointes atau jika sesiapa dalam keluarga anda mempunyai 'selang QT yang berpanjangan'
- Tahap magnesium atau potassium yang rendah dalam darah anda
- Asma atau masalah paru-paru
- Sawan atau konvulsi
- lain-lain jenis gangguan ingatan
- sebarang masalah pergerakan seperti kekejangan otot atau pergerakan yang tidak terkawal
- Ulser perut atau usus
- Kesukaran membuang air kecil
- Masalah dengan hati

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda sedang

menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Pastikan anda memberitahu doktor jika anda mengambil ubat yang berikut:

- Ubat penahan sakit seperti *nonsteroidal anti-inflammatory drugs* (NSAIDs).
- Ubat untuk masalah irama jantung seperti amiodarone, sotalol
- Ubat kemurungan seperti *citalopram, escitalopram, amitriptyline, fluoxetine*
- Ubat untuk psikosis seperti *pimozide, sertindole, ziprasidone*
- Ubat untuk jangkitan bakteria seperti *clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, rifampicin*
- Ubat antikulat seperti *ketoconazole*
- Ubat sawan seperti phenytoin, carbamazepine
- Ubat untuk jantung seperti quinidine, beta-blockers
- Ubat relaks otot seperti succinylcholine

Cara menggunakan **DEMEALRAN TABLET**

- Berapa banyak harus digunakan

Kekuatan tablet yang anda ambil mungkin berubah bergantung pada tempoh masa yang telah anda ambil ubat dan apa yang disarankan oleh doktor anda. Dos rawatan bermula pada 5mg sehari (dos sekali sehari). Maksimum dos yang disyorkan adalah 10mg setiap malam. Sentiasa ikut nasihat doktor atau ahli farmasi mengenai bagaimana dan bila untuk mengambil ubat anda.

- Bila perlu digunakan

Biasanya, **DEMEALRAN TABLET** diambil satu tablet setiap malam sebelum anda tidur. Tablet harus diletakkan di atas lidah dan dibenarkan untuk hancur sebelum menelan, dengan atau tanpa air, mengikut pilihan anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan **DEMEALRAN**

DEMEALRAN TABLET

Donepezil Hydrochloride (5mg, 10mg)

TABLET untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Gejala berlebihan boleh merangkumi rasa loya dan muntah, air liur meleleh, berpeluh, kadar jantung yang rendah, tekanan darah rendah, masalah pernafasan, kehilangan kesedaran atau sawan.

Semasa menggunakan DEMEALRAN TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan **DEMEALRAN TABLET**.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi **DEMEALRAN TABLET** dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Dementia boleh menyebabkan kemerosotan prestasi memandu atau berkompromi keupayaan untuk menggunakan jentera. Semak dengan doktor atau ahli farmasi.

DEMEALRAN TABLET tidak boleh diambil dengan alkohol. Ubat anda juga boleh menyebabkan keletihan, pening kepala dan kekejangan otot, terutamanya apabila memulakan atau meningkatkan dos. Jika anda mengalami sebarang kesan ini, jangan memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, **DEMEALRAN TABLET** boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

DEMEALRAN TABLET mungkin menyebabkan kesan sampingan yang serius seperti berikut:

- Denyutan jantung perlahan dan pengsan. Ini berlaku lebih kerap pada orang yang mempunyai masalah jantung. Hubungi doktor dengan segera jika anda pengsan semasa mengambil **DEMEALRAN TABLET**.
- Lebih asid perut. Ini meningkatkan kecenderungan mendapat ulser dan pendarahan, terutamanya apabila mengambil **DEMEALRAN TABLET**.
- Risiko adalah lebih tinggi pada orang yang mempunyai ulser, atau mengambil NSAID lain.

- Kemerosotan hati seperti keradangan hati
- Sawan
- Demam dengan kekejangan otot, berpeluh atau tahap
- kesedaran berkurang (keadaan yang dipanggil “*Neuroleptic Malignant Syndrome*”)

Kesan sampingan paling biasa

DEMEALRAN TABLET:

- loya
- cirit-birit
- tidak tidur dengan baik
- muntah
- kekejangan otot
- perasaan letih
- tiada selera makan
- sakit kepala
- khayalan
- selsema
- mimpi yang aneh dan buruk
- gangguan abdomen
- ruam
- gatal-gatal
- tingkah laku agresif
- membuang air kencing secara tidak terkawal
- agitasi
- pening

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan DEMEALRAN TABLET

-Penyimpanan

Jangan simpan di atas suhu 30°C

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

DEMEALTRAN TABLET

Donepezil Hydrochloride (5mg, 10mg)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

DEMEALTRAN TABLET 5 mg

Berwarna kuning, berbentuk bulat, tablet bersalut filem *bioconvex* dinyahbos dengan 'RC25' pada satu sisi.

DEMEALTRAN TABLET 10 mg

Berwarna kuning, berbentuk kapsul, tablet bersalut filem dinyahbos dengan 'RC' & '26' pada kedua-dua belah garis putus pada satu sisi dan garis putus pada sebelah lagi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: Donepezil hydrochloride
- Bahan tidak aktif: Lactose monohydrate, maize starch, hydroxypropyl cellulose, purified water, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, opadry 02b52480 yello (hypromellose 5 cp, titanium dioxide, macrogol (400), talc, iron oxideyellow (E172)

-Nombor MAL

DEMEALTRAN TABLETS 5 mg
(MAL13055059AZ)

DEMEALTRAN TABLETS 10 mg
(MAL13055053AZ)

Pengilang

Sun Pharmaceutical Ind. Ltd.
Paonta Sahib, Dist. Sirmour
Himachal Pradesh – 173 025
INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

RANBAXY (MALAYSIA) SDN. BHD.
Lot 23, Bakar Arang Industrial Estate,
108000 Sungai Petani, Kedah,
MALAYSIA

Tarikh kemaskini RiMUP

May 2024

Nombor siri:

NPRA(R2/2) 240117/1197