

AXCEL MEFENAMIC ACID CAPSULE

Mefenamic Acid (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Axcel Mefenamic Acid Capsule
2. Bagaimana Axcel Mefenamic Acid Capsule berfungsi
3. Sebelum menggunakan Axcel Mefenamic Acid Capsule
4. Cara menggunakan Axcel Mefenamic Acid Capsule
5. Semasa menggunakan Axcel Mefenamic Acid Capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Mefenamic Acid Capsule
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Axcel Mefenamic Acid Capsule

Axcel Mefenamic Acid Capsule digunakan untuk melegakan kesakitan ringan hingga sederhana, termasuk:

- Kesakitan otot.
- Kesakitan trauma.
- Sakit kepala.
- Sakit gigi.
- Kesakitan selepas pembedahan dan selepas bersalin.
- Arthritis reumatoid (gangguan keradangan yang teruk).
- Dysmenorrhoea (kesakitan semasa haid)

Bagaimana Axcel Mefenamic Acid Capsule berfungsi

Mefenamic Acid adalah ubat analgesik (ubat yang mengurangkan kesakitan) bersama dengan sifat anti-radang. Ia sesuai digunakan untuk merawat pelbagai kesakitan akibat amalan perubatan.

Sebelum menggunakan Axcel Mefenamic Acid Capsule

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Axcel Mefenamic Acid Capsule jika:

- Anda alergi pada kandungan produk ini.
- Anda menghadapi penyakit radang usus.
- Anda menghadapi ulser atau radang pada saluran gastrointestinal.

- Anda menghadapi kerosakan buah pinggang atau hati.
- Ia tidak dipreskripsikan oleh doktor atau ahli farmasi bertauliah kepada anda.
- Anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.
- Anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

-Sebelum menggunakan Axcel Mefenamic Acid Capsule

Maklumkan kepada doktor anda jika:

- Anda mempunyai asma.
- Anda mengalami serangan jantung atau angin ahmar.
- Anda mengalami tekanan darah tinggi.
- Anda mempunyai kegagalan jantung.
- Anda mengalami masalah berkaitan dengan perut dan usus.
- Anda mempunyai reaksi kulit yang serius.
- Hamil dan menyusukan bayi.
- Anda mengambil ubatan lain (termasuk yang tidak dipreskripsikan oleh doktor anda).

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan tersebut kerana ia mungkin berinteraksi dengan Axcel Mefenamic Acid Capsule anda:

- Coumarin anticoagulants (ubat yang menghalang pembekuan darah).

Ia mungkin masih selamat bagi anda untuk mengambil Axcel Mefenamic Acid Capsule dan doktor akan menentukan apa yang sesuai untuk anda.

Cara menggunakan Axcel Mefenamic Acid Capsule

-Berapa banyak harus digunakan

Untuk penggunaan oral sahaja.

Dewasa: 2 kapsul, 3 kali sehari.

Selain daripada rawatan bagi *Still's Disease*, rawatan tidak harus melebihi 7 hari.

-Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan bila anda perlu mengambil Axcel Mefenamic Acid Capsule mengikut keadaan anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang disarankan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terguna dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Axcel Mefenamic Acid Capsule

-Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Axcel Mefenamic Acid Capsule.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa

AXCEL MEFENAMIC ACID CAPSULE

Mefenamic Acid (250mg)

berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jangan berkongsi Axccl Mefenamic Acid Capsule dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Elakkan penggunaan berterusan dalam dos yang tinggi.
- Kesesuaian pengambilan semasa hamil dan pada kanak-kanak bawah 14 tahun.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Axccl Mefenamic Acid Capsule boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- Gangguan gastrointestinal.
- Sakit kepala.
- Mengantuk.
- Gementar.
- Gangguan penglihatan.
- Sel darah merah rendah.
- Cirit-birit.
- Ruam pada kulit.
- Bronchospasm (pengetatan otot-otot saluran pernafasan pada paru-paru).

Ini bukanlah satu senarai lengkap semua kesan sampingan yang mungkin. Yang lain mungkin berlaku pada sesetengah orang dan mungkin terdapat beberapa kesan sampingan yang belum diketahui.

Beritahu doktor anda jika anda mendapati kesan sampingan yang membuat anda merasa kurang sihat, walaupun ia tidak dalam senarai ini. Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak faham apa-apa dalam senarai ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects

to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Axccl Mefenamic Acid Capsule

-Penyimpanan

Jauhkan Axccl Mefenamic Acid Capsule dari jangkauan kanak-kanak.

Simpan pada suhu bawah 30°C.

Pastikan bekas tertutup dan lindungi daripada cahaya.

-Pelupusan

Jangan guna Axccl Mefenamic Acid Capsule yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Axccl Mefenamic Acid Capsule ialah gelatin kapsul berwarna serbuk cap biru telus pada penutup dan badan telus ivory, saiz 1.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif:

Mefenamic Acid

- Bahan Tidak Aktif:

DSS, isopropyl Alcohol, Povidone K90, Magnesium Stearate, Lactose, Purified Water.

-Nombor MAL

MAL19872189AZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Kotra Pharma (M) Sdn Bhd
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

08/08/2023

Nombor siri

NPRA(R2/2)230704/1095