

DIPRODIN ELIXIR

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

Diphenhydramine HCl (12.5mg/5ml)

Ephedrine HCl (6mg/5ml)

APAKAH YANG ADA PADA RISALAH INI

1. Apakah kegunaan Diprodin Elixir.
2. Bagaimana Diprodin Elixir berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Diprodin Elixir.
4. Cara menggunakan Diprodin Elixir.
5. Semasa menggunakan Diprodin Elixir.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Diprodin Elixir.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

APAKAH KEGUNAAN DIPRODIN ELIXIR

Diprodin Elixir digunakan bagi melegakan kesesakan saluran pernafasan buat sementara waktu yang berkaitan dengan:

- Batuk.
- Selsema.
- Alergi rinitis (keradangan membran mukus di dalam hidung).

BAGAIMANA DIPRODIN ELIXIR BERFUNGSI

Diphenhydramine hydrochloride merupakan sejenis antihistamina dan ia memiliki ciri-ciri antikolinergik.

Ephedrine hydrochloride merupakan agen simpatomimetik dan memiliki kesan rangsangan ketara pada sistem saraf pusat. Ia mendorong pengecutan saluran darah dan menyebabkan pengembangan ruang udara bronkus. Ia juga mempunyai tindakan rangsangan terhadap pusatpernafasan.

SEBELUM MENGGUNAKAN DIPRODIN ELIXIR

Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alergi atau hipersensitif pada mana-mana bahan kandungan ubat ini.
- Jika ia tidak dipreskripsikan oleh doktor atau ahli farmasibertauliah kepada anda.
- Jangan ambil Diprodin Elixirjika anda mengandung, sedang

merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

- Jangan ambil Diprodin Elixirjika anda menyusukan anak.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Sebelum mula mengambil

Sebelum anda mengambil Diprodin Elixir anda perlu memaklumkan kepada doktor anda:

- Jika anda alergi pada ubat-ubatan, makanan dan pewarna.
- Jika anda mengambil ubat-ubatan lain (termasuk yang tidak dipreskripsikan oleh doktor anda).
- Jika anda menghadapi glaukoma sudut sempit (peningkatan tekanan dalam mata).
- Jika anda menghadapi obstruksi *pyloroduodenal* (penyumbatan pilorik).
- Jika anda menghadapi hipertrofi prostat (pembesaran kelenjar prostat)
- Jika anda menghadapi hipertiroidisma (kelenjar tiroid terlalu aktif).
- Jika anda menghadapi penyakit kardiovaskular (jantung) atau tekanan darah tinggi.
- Jika anda pernah menghadapi asma bronkial.
- Hamil atau menyusukan bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda perlu beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain, terutamanya:

- Ubat-ubat depresi sistem saraf pusat seperti barbiturat, hipnotik, analgesik narkotik, alkohol dan penenang.

CARA MENGGUNAKAN DIPRODIN ELIXIR

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

10ml, setiap 4-6 jam, tidak melebihi 60ml dalam 24 jam.

Kanak-kanak:

6-12 tahun: 5ml, setiap 4-6 jam, tidak melebihi 30ml dalam 24 jam.

2-6 tahun: 2.5ml, setiap 4-6 jam, tidak melebihi 15ml dalam 24 jam.

Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan sekiranya anda perlu mengambil Diprodin Elixir.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahlifarmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Simptom terlebih dos:

- Sawan

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

SEMASA MENGGUNAKAN DIPRODIN ELIXIR

Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Diprodin Elixir.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

DIPRODIN ELIXIR

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

Diphenhydramine HCl (12.5mg/5ml)

Ephedrine HCl (6mg/5ml)

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Diprodin Elixir dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hindari dari melakukan aktiviti yang memerlukan penumpuan jika ubat ini menyebabkan rasa mengantuk.
- Tidak dicadangkan untuk kanak-kanak bawah 2 tahun.
- Dapatkan nasihat daripada doktor/ahli farmasi bagi kanak-kanak umur di antara 2 hingga 6 tahun.

KESAN-KESAN SAMPINGAN

Seperti semua ubat-ubatan, Diprodin Elixir boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan biasa berikut telah dilaporkan:

Diphenhydramine hydrochloride mungkin menyebabkan:

- Kelalian.
 - Kelesuan.
 - Kepeningan.
 - Tekanan darah rendah.
 - Kelemahan otot.
 - Gangguan gastrousus seperti rasa loya, muntah-muntah, cirit-birit atau sembelit dan sakit pada epigastrik.
 - Sakit kepala.
 - Kekaburan penglihatan.
 - Tinitus (bunyi berdering di dalam telinga).
 - Tekanan atau keriangangan.
 - Kerengsaan.
 - Kekeringan mulut.
- Berasa lemah atau berat pada tangan.

Ephedrine hydrochloride mungkin menyebabkan:

- Gayat.
- Berpeluh.
- Kehausan.
- Denyutan jantung menjadi pantas/ tidak normal.
- Sakit prekordial (sakit pada dinding dada di bahagian atas jantung).
- Berdebar.
- Kesukaran membuang air kecil.
- Kelemahan otot dan getaran.
- Kebimbangan.
- Kegelisahan.
- Keresahan.
- Sukar tidur.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

PENYIMPANAN DAN PELUPUSAN DIPRODIN ELIXIR

Penyimpanan

Jauhkan Diprodin Elixir dari jangkauan kanak-kanak.

Pastikan bekas ubat tertutup rapat dan lindungi dari cahaya. Simpan pada suhu bawah 30°C.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

MAKLUMAT LANJUT

Rupa dan warna produk

Diprodin Elixir merupakan eliksir berwarna merah dengan perisa strawberi.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:

Diphenhydramine HCL

Ephedrine HCL

Bahan Tidak Aktif:

Refined Sugar, Glycerin, Ammonium Chloride, Citric Acid Anhydrous, Methylparaben, Propylene Glycol, Strawberry Flavor, Ponceau 4R, Sodium Saccharin, Sorbitol, Sodium Citrate dan Purified Water.

Nombor MAL

MAL 19910073AZ

PENGILANG DAN PEMEGANG PENDAFTARAN PRODUK

KOTRA PHARMA (M) SDN BHD
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

TARIKH KEMASKINI RiMUP

29/08/2022

NOMBOR SIRI

BPFK(R4/1)041214/00072