

AXCEL EVILINE TABLET

Magnesium Hydroxide/ Aluminium Hydroxide/ Simethicone (200mg/ 200mg/ 20mg)

Apalah yang ada apda risalah ini

1. Apakah kegunaan Axcil Eviline Tablet
2. Bagaimana Axcil Eviline Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Axcil Eviline Tablet
4. Cara menggunakan Axcil Eviline Tablet
5. Semasa menggunakan Axcil Eviline Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Axcil Eviline Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Axcil Eviline Tablet

Axcil Eviline Tablet merupakan anti-asid/pengeluar gas dari saluran pencernaan untuk merawat:

- Ulser perut.
- Gangguan pada pencernaan atau asal organik.
- Pedih ulu hati dalam *hiatus hernia* atau kehamilan.
- Perut kembung.
- Gastritis esofagitis (keradangan lapisan esofagus).
- Situasi lain di mana hiperkeasidan atau kembung mungkin berlaku.

Bagaimana Axcil Eviline Tablet berfungsi

Axcil Eviline Tablet adalah anti-asid berfungsi untuk mengelakkan dan melegakan kesakitan dalam kawalan simptomatik gastrik dan ulser duodenum dan refluks gastrointestinal dengan meneutralkan asid hidroklorik dalam rembesan gastrik.

Sebelum menggunakan Axcil Eviline Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

- Hipersensitiviti terhadap bahan aktif atau mana-mana eksipien. Tanda-tanda tindak balas Alahan ialah ruam kulit, bengkak pada bibir, lidah, muka dan tekak; dan masalah pernafasan.
- Porfiria

- Masalah buah pinggang yang serius
- Kanak-kanak
- Cachexia

- Sebelum menggunakan Axcil Eviline Tablet

- Axcil Eviline Tablet tidak digalakkan untuk kegunaan kanak-kanak.
- Maklumkan doktor jika anda mempunyai masalah buah pinggang.

Kehamilan

- Axcil Eviline Tablet hanya boleh digunakan apabila benar-benar diperlukan. Dapatkan nasihat doktor untuk membandingkan manfaat yang dijangkakan pada ibu terhadap risiko pada janin atau bayi.

Penyusuan

- Axcil Eviline Tablet dianggap serasi dengan penyusuan susu ibu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan pada doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil ubat-ubatan lain termasuk ubat-ubatan yang dibeli tanpa preskripsi di farmasi, pasaraya ataupun kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat mungkin dipengaruhi oleh magnesium hidroksida atau boleh menjejaskan cara ia berfungsi.

Ubat ini boleh mengganggu kesan:

- Ubat yang digunakan untuk mengawal keasidan perut (antagonis H₂);
- Ubat untuk jantung dan tekanan darah (atenolol, digoxin, metoprolol dan propranolol);
- Ubat anti-jangkitan (cefдинир, cefpodoxime, tetracyclines, etambutol, fluoroquinolones, isoniazid, lincosamides, penicillamine, ketoconazole);
- Ubat antimalaria (chloroquine);
- Ubat anti-radang (diflunisal, glucocorticoids, indomethacin);

- Ubat untuk penyakit tulang (bifosfonat);
- Ubat untuk tiroid (levothyroxine);
- Ubat-ubatan terhadap skizofrenia (phenothiazine neuroleptik);
- Ubat untuk menurunkan kolesterol (rosuvastatin).

Tunggu sekurang-kurangnya dua jam (4 jam untuk fluoroquinolones), sebelum mengambil Axcil Eviline Tablet untuk mengelakkan interaksi dengan ubat-ubatan lain.

Anda juga mesti memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- Ubat yang mengandungi polistirena sulfonat (Kayexalate), disebabkan oleh risiko masalah metabolic dan usus.
- Ubat yang mengandungi aluminium hidroksida dan sitrat, disebabkan oleh risiko peningkatan aluminium dalam darah.
- Quinidine (ubat untuk jantung) disebabkan oleh risiko peningkatan paras quinidine.
- Salisilat.

Cara menggunakan Axcil Eviline Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dua hingga empat tablet, dikunyah, empat kali sehari.

Jangan mengambil lebih daripada 16 biji pil dalam tempoh 24 jm.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat dua puluh minit hingga satu jam selepas makan dan sebelum tidur, atau seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang disarankan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu

AXCEL EVILINE TABLET

Magnesium Hydroxide/ Aluminium Hydroxide/ Simethicone (200mg/ 200mg/ 20mg)

dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terguna dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Jika anda mengambil ubat ini dalam dos yang tinggi, perkara berikut mungkin berlaku:

- Cirit-birit, sakit perut dan muntah
- Masalah usus bertambah teruk jika anda mengalami sembelit, mempunyai masalah buah pinggang yang tidak serius atau sudah tua.

Semasa menggunakan Axcil Eviline Tablets

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Axcil Eviline Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda disahkan hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jangan berkongsi Axcil Eviline Tablets dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Axcil Eviline Tablet.

- Jika anda mempunyai masalah usus atau sembelit, jika anda mempunyai masalah buah pinggang yang tidak serius, atau jika anda ialah warga emas, kerana ubat ini boleh bertambah teruk masalah usus.
- Jika anda mengikuti diet rendah fosforus, jika anda mempunyai tahap fosfat yang rendah dalam darah (hypophosphatemia) atau jika anda sedang menerima rawatan jangka panjang. Ubat ini mengurangkan tahap fosfat dalam darah dan boleh menyebabkan masalah tulang.
- Jika anda mengambil ubat ini dalam dos yang tinggi atau jika anda mengalami cirit-birit, beri perhatian yang teliti kerana ubat ini boleh menyebabkan cirit-birit.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Axcil Eviline Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

Kesan sampingan yang jarang berlaku:

- Cirit-cirit dan sembelit

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku

- Hipermaagnesemia

Kesan sampingan kekerapan tidak diketahui:

- Tindak balas badan yang berlebihan kepada bahan asing (tindak balas hipersensitiviti, termasuk yang serius), ruam kulit yang mungkin gatal, dicirikan oleh bengkak pada kulit (hives), gatal-gatal.
- Perubahan paras aluminium dan fosfat dalam darah, yang boleh menyebabkan masalah tulang.
- Sakit perut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccine (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Axcil Eviline Tablet

- Penyimpanan

Jauhkan Axcil Eviline Tablet dari jangkauan kanak-kanak. Simpan pada suhu bawah 30°C. Pastikan bekas tertutup rapat dan lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Jangan guna Axcil Eviline Tablet yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak. Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Axcil Eviline Tablet adalah tablet berwarna putih, rata, berbentuk bulat, berdiameter 12.9mm, dan ditandakan dengan logo KOTRA pada satu permukaan.

AXCEL EVILINE TABLET

Magnesium Hydroxide/ Aluminium Hydroxide/ Simethicone (200mg/ 200mg/ 20mg)

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif:

Magnesium Hydroxide,
Aluminium Hydroxide dan
Simethicone.

- Bahan Tidak Aktif:

PVP K90, Corn Starch,
Magnesium Stearate, Purified
water, Saccharin Sodium,
Peppermint Oil, Lactose, Icing
Sugar, dan Mannitol.

- Nombor MAL

MAL19911458X

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**

Kotra Pharma (M) Sdn Bhd
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/01/2024

Nombor siri

NPRA(R2/1)231215/1185