

AXCEL BROMHEXINE (CHILDREN) SYRUP

Bromhexine Hydrochloride (4mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah Kegunaan Axcel Bromhexine (Children) Syrup.
2. Bagaimana Axcel Bromhexine (Children) Syrup Berfungsi.
3. Sebelum Mengambil Axcel Bromhexine (Children) Syrup.
4. Cara Menggunakan Axcel Bromhexine (Children) Syrup.
5. Semasa Menggunakan Axcel Bromhexine (Children) Syrup.
6. Kesan- Kesan Sampingan.
7. Cara Penyimpanan Dan Pelupusan Axcel Bromhexine (Children) Syrup.
8. Maklumat Lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh Kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Axcel Bromhexine (Children) Syrup

Axcel Bromhexine (Children) Syrup adalah ekspektoran mukolitik (agen yang melarutkan kahak tebal) yang digunakan dalam rawatan gangguan pernafasan yang berkaitan dengan batuk yang kerap.

Bagaimana Axcel Bromhexine (Children) Syrup berfungsi

Bromhexine (Children) Syrup adalah ekspektoran mukolitik (agen yang melarutkan kahak tebal) yang berfungsi memecahkan kahak agar lebih mudah dibatuk keluar.

Sebelum mengambil Axcel Bromhexine (Children) Syrup

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil Axcel Bromhexine (Children) Syrup jika:

- Ia tidak diprekripsikan oleh doktor atau ahli farmasi bertaualiah kepada anda.

-Sebelum mula mengambil

Maklumkan kepada doktor anda jika:

- Anda alergi pada ubat- ubatan.
- Anda menghidapi ulser gastrik.
- Anda mengandung atau menyusukan bayi.

-Jika mengambil ubat- ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan berikut kerana ia mungkin berinteraksi dengan Axcel Bromhexine (Children) Syrup anda:

- *Erythromycin*, *Cephalexin* dan *Amoxicillin*

Ia mungkin masih selamat bagi anda untuk mengambil Axcel Bromhexine (Children) Syrup dan doktor anda akan menentukan apa yang sesuai untuk anda.

Cara menggunakan Axcel Bromhexine (Children) Syrup

-Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan oral sahaja.

Kanak- kanak di bawah 2 tahun: 1.25ml (1mg)

Kanak- kanak 2-6 tahun: 2.5ml (2mg)

Kanak- kanak 7-12 tahun: 5ml (4mg)

Dewasa & kanak- kanak lebih 12 tahun: 10ml (8mg)

-Bila perlu digunakan

Anda perlu mengambil ubat itu pada tempoh masa yang sama dalam sehari.

Doktor anda akan menentukan bila anda perlu mengambil Axcel Bromhexine (Children) Syrup mengikut keadaan anda.

-Berapa lama perlu digunakan

- Ambil ubat ini seperti yang dicatatkan di dalam risalah ini tanpa melebihi sukatan.
- Ikut saranan dan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa menggunakan

- Jangan menggandakan sukatan kerana Axcel Bromhexine (Children) Syrup mungkin akan memberikan kesan sampingan yang merbahaya.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- Dos berlebihan perlu diuruskan secara simptomatik.
- Dinasihatkan supaya anda hubungi dan maklumkan doktor anda jika anda mengambil Axcel Bromhexine (Children) Syrup berlebihan.

Semasa menggunakan Axcel Bromhexine (Children) Syrup

-Perkara yang perlu dilakukan

- Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang patut dan tidak patut anda lakukan semasa mengambil ubat ini.
- Maklumkan kepada doktor anda jika tanpa diduga anda perlu mengambil ubatan lain.
- Ambil Axcel Bromhexine (Children) Syrup mengikut dos yang disarankan.
- Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil Axcel Bromhexine (Children) Syrup lebih daripada kekerapan yang dicadangkan dalam satu hari.
- Jangan melebihi dos pada setiap satu masa pengambilan.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hindari penggunaan berterusan dengan dos tinggi.

Kesan- kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Axcel Bromhexine (Children) Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doctor/ ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan umum berikut telah dilaporkan:

- Gangguan perut dan usus.
- Keputusan ujian hati yang tidak normal.

Axcel Bromhexine (Children) Syrup boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius. Berhenti menggunakan Axcel Bromhexine (Children) Syrup dan dapatkan bantuan perubatan dengan segala sekiranya anda mengalami mana-mana simptom berikut:

- Alahan yang teruk: sukar bernafas, sakit kepala ringan, kulit bengkak atau ruam.

AXCEL BROMHEXINE (CHILDREN) SYRUP

Bromhexine Hydrochloride (4mg/5ml)

- Tindak balas kulit yang teruk: kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau iritasi mata.

Nombor siri

NPRA(R4/1)180418/00110

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.moh.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Bromhexine (Children) Syrup

-Penyimpanan

Jauhkan Axcel Bromhexine (Children) Syrup dari jangkauan kanak-kanak.

Simpan di bawah 30°C.

Pastikan bekas ubat tertutup rapat dan lindungi daripada cahaya.

-Pelupusan

Jangan guna Axcel Bromhexine (Children) Syrup yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Axcel Bromhexine (Children) Syrup ialah sejenis sirap tidak berwarna hingga kuning pucat dengan perisa buah-buahan.

Bahan- bahan kandungan

- Bahan Aktif:

Bromhexine Hydrochloride

- Bahan Tidak Aktif:

*Carboxymethylcellulose Sodium,
Citric Acid Anhydrous, Maltitol,
Sodium Chloride, Polysorbate 80,
Glycerin, Sorbitol, Sodium Benzoate,
Cherry Flavour, Purified Water*

Nombor MAL

MAL19911419XZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Kotra Pharma (M) Sdn Bhd
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

01/06/2020