

CREOBIC CREAM

COMPOSITION:

Clotrimazole (micronised) 1% w/w
Benzyl Alcohol 1% w/w as preservative.

PRESENTATION:

A white, water-miscible cream.

INDICATIONS:

All fungal skin infections due to dermatophytes (e.g. *Trichophyton* species), yeast (e.g. *Candida* species), moulds and other fungi. These include ringworm (tinea) infections, athlete's foot, paronychia, pityriasis versicolor, erythrasma, intertrigo, fungal nappy rash, candida vulvitis and candida balanitis.

MECHANISMS OF ACTION:

Clotrimazole is a broad-spectrum antifungal. It also exhibits activity against *trichomonas*, *staphylococci*, *streptococci* and *bacteroides*.

DIRECTION:

FOR EXTERNAL USE ONLY.

Apply thinly and evenly to the affected area two to three times daily, and rubbed gently. Treatment should be continued for at least one month or for at least two weeks after the disappearance of all signs of infection to prevent relapse. If the feet are infected, they should be thoroughly washed and dried, especially between the toes, before applying the cream. Consult doctors if no improvement in 4 weeks (for athlete's foot) or 2 weeks (for jock itch).

CONTRAINDICATIONS:

No known contraindication. However, treatment should be discontinued if signs of hypersensitivity appears.

SIDE EFFECTS:

Local irritation and mild burning sensation may occur when apply topically.

PRECAUTIONS:

Avoid contact with eyes, ears or mucous membranes. Do not use on children under 2 years of age except under the advice and supervision of a doctor.

STORAGE:

Keep container well closed. Store below 30°C. Protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PACKAGE QUANTITIES:

Available in aluminium tube of 5gm, 10gm, 15gm and 20gm.

Further information can be obtained from pharmacist, physician or the manufacturer.

KRIM CREOBIC

KANDUNGAN :

Clotrimazole (micronised) 1% w/w
Benzyl Alcohol 1% w/w sebagai bahan pengawet.

CIRI-CIRI FIZIKAL :

Krim berwarna putih.

INDIKASI :

Semua jangkitan fungus pada kulit yang disebabkan oleh dermatophytes (contoh: jenis *Trichophyton*), yis (contoh : jenis *Candida*), moulds dan fungi lain. Ini termasuk jangkitan kurap (tinea), kaki berair (ulat air), paronychia, pityriasis versicolor, (panau) erythrasma, intertrigo, fungal nappy rash, candida vulvitis dan candida balanitis.

TINDAK BALAS MEKANISMA :

Clotrimazole merupakan sejenis antifungal yang spektrumnya luas. Ia akan merencatkan *Trichomonas*, *staphylococci*, *streptococci* and *bacteroides*.

CARA PENGGUNAAN :

UNTUK KEGUNAAN LUAR SAHAJA.

Sapukan dengan rata pada tempat yang berkenaan 2 - 3 kali sehari, sapu perlahan-lahan. Penggunaan hendaklah diteruskan selama sebulan atau sekurang-kurangnya dua minggu selepas jangkitan kulat sembuh. Ini adalah untuk menghalang jangkitan daripada berulang. Jika jangkitan pada kaki, anda perlu membasuh dan mengeringkan kaki, terutamanya di celah-celah jari kaki sebelum menyapu krim. Anda disyorkan berjumpa dengan doktor jika keadaan tidak berubah selepas 4 minggu (bagi kaki berair) atau 2 minggu (bagi jock itch).

KONTRAINDIKASI :

Tiada kontraindikasi dengan penggunaan produk ini. Jika tanda-tanda hypersensitif berlaku rawatan tersebut harus dihentikan.

KESAN SAMPINGAN :

Pedih dan kesan kemerahan di tempat yang disapukan.

PERHATIAN :

Elakkan daripada terkena mata, telinga atau mukus membran. Jangan digunakan pada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun kecuali atas nasihat doktor.

PENYIMPANAN :

Bekas mesti ditutup rapi. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

JAUHI DARI KANAK-KANAK

Kuantiti pembungkusan :

Terdapat dalam tiub aluminium 5gm, 10gm, 15gm dan 20gm.

MAL19921472XZ

Keterangan lanjut boleh diperolehi daripada doktor, pengawai farmasi atau pengilang.

癬笔软膏

成份:

Clotrimazole (micronised) 1% w/w
Benzyl Alcohol 1% w/w为防腐剂。

外观:

白色软膏。

适应:

能治疗真菌感染（如Trichophyton的种类），酵母菌（如Candida的种类），霉菌及其它的霉。这也包括癬，香港脚，甲沟炎，花斑癬疹（汗斑），红癬，擦疹，尿布疹等。

作用过程:

Clotrimazole 是一种广泛性的抗真菌。它也能抵抗毛滴虫，staphylococci，streptococci及bacteroides感染菌。

用法:

适合外用。

将薄薄的药膏均衡的擦在患处，每日二至三次。当情况有所改善时，切勿停止采用，反之应该继续使用至少一个月或二个星期以避免重患。如果患处是在脚部特别是在脚指之间，必须在涂擦前清洗干净，等至全干了再涂擦药膏。如果香港脚在四个星期内或股癬在两个星期内没有改善，请找医生治疗。

禁忌:

尚无禁忌，若出现皮肤过敏，必须停止治疗。

副作用:

有轻微的刺激及烧伤症状。

注意:

避免涂擦于眼睛，耳朵或粘处膜。避免用于两岁以下儿童，除非获得医生批准。

贮藏:

瓶盖盖紧。贮藏于 30°C以下。避免阳光照射。

置於小孩取不到之处。

包装:

5克, 10克, 15克及20克在铝管装。

欲知詳情，請詢問医生，药剂师或制造商。



Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.
No.1,2&3, Jalan TTC 12, (90082-V)
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.
Tel +606 336 2222

Regn - 200513