

AXCEL CEFUROXIME-500MG TABLET

Cefuroxime Axetil equivalent to Cefuroxime 500mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet.
2. Bagaimana Axccl Cefuroxime-500mg Tablet berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet.
4. Cara menggunakan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet.
5. Semasa menggunakan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet

Axccl Cefuroxime-500mg Tablet digunakan untuk:

- Jangkitan saluran pernafasan bahagian atas, sebagai contoh jangkitan telinga, hidung dan tekak, seperti otitis media, sinusitis, tonsillitis dan sakit tekak.
- Jangkitan saluran pernafasan bahagian bawah, sebagai contoh; *pneumonia* (jangkitan paru-paru), bronchitis akut, dan *acute exacerbation of chronic bronchitis*.
- Jangkitan saluran kencing, contohnya; *pyelonephritis* (radang buah pinggang), *cystitis* (radang pundi kencing) dan *urethritis* (radang uretra).
- Jangkitan pada kulit dan tisu lembut, contohnya; *furunculosis*, *pyoderma* dan *impetigo*.
- *Gonorrhoea* (jangkitan kelamin), *gonococcal urethritis* akut tidak rumit, and *cervicitis* (keradangan serviks).

Bagaimana Axccl Cefuroxime-500mg Tablet berfungsi

Cefuroxime menghalang sintesis dinding sel bakteria berikutan pelekatan pada *penicillin binding proteins* (PBP). Ini mengakibatkan gangguan biosintesis dinding sel (peptidoglycan), yang menyebabkan lisis dan kematian sel bakteria.

Sebelum menggunakan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet

– Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Axccl Cefuroxime-500mg Tablet:

- Jika anda alergi terhadap antibiotik cephalosporin.

Beberapa gejala tindak balas alahan mungkin termasuk ruam kulit, gatal, sesak nafas, bengkak pada muka, bibir atau lidah.

Perhatian khusus perlu diberikan apabila mengambil Axccl Cefuroxime-500mg Tablet jika:

- Anda alergi terhadap penisilin atau antibiotik beta lactam yang lain.
- Anda mengandung
- Anda sedang menyusukan anak.

– Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda sekiranya:

- Anda alah terhadap sebarang ubat.
- Anda mengalami reaksi alergi yang serius terhadap penisilin. Risiko alergi terhadap Cefuroxime meningkat jika anda alah kepada penisilin.
- Dalam masa yang sama anda menerima rawatan *potent diuretics*.

Sila berjumpa dengan doktor anda sebelum mula menggunakan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet jika anda hamil, merancang untuk hamil, menyusu atau berhasrat untuk menyusu. Doktor anda akan mempertimbangkan risiko anda mengambil Axccl Cefuroxime-500mg Tablet berbanding faedah yang mereka harapkan untuk anda.

– Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor anda jika anda mengambil ubat berikut kerana ia boleh berinteraksi dengan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet anda:

- Frusemide (*water pills*)
- Probenecid untuk gout
- Ubat yang mengurangkan keasidan gastrik
- Cephalosporins

Anda perlu memberitahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain kerana ia mungkin akan bertindak balas dengan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet anda.

Cara menggunakan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet

– Berapa banyak harus digunakan

Untuk pengambilan oral sahaja.

Axccl Cefuroxime-500mg perlu diambil selepas makanan untuk penyerapan yang optimum.

Dewasa

Disease	Dose
Kebanyakan jangkitan	250mg dua kali sehari
Jangkitan saluran kencing	250mg dua kali sehari
Jangkitan saluran pernafasan bahagian bawah yang ringan dan sederhana	250mg dua kali sehari
Jangkitan saluran pernafasan bahagian bawah yang lebih teruk, atau jika <i>pneumonia</i> (jangkitan paru-paru) disyaki	500mg dua kali sehari
<i>Pyelonephritis</i> (jangkitan buah pinggang)	250mg dua kali sehari
Gonorrhoea tidak rumit (jangkitan kelamin)	Dos tunggal 1g

Terapi berturutan

Pneumonia (jangkitan paru-paru):

1.5g cefuroxime injection (cefuroxime sodium) perlu diambil dua kali sehari untuk 48-72 jam, diikuti dengan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet dua kali sehari untuk 7 – 10 hari.

Acute exacerbation of chronic bronchitis:

750mg cefuroxime injection (cefuroxime sodium) perlu diambil dua kali sehari untuk 48-72 jam, diikuti dengan Axccl Cefuroxime-500mg Tablet dua kali sehari untuk 5 – 10 hari.

AXCEL CEFUROXIME-500MG TABLET

Cefuroxime Axetil equivalent to Cefuroxime 500mg

Kanak-kanak

Kebanyakan jangkitan	125 mg (1 x 125 mg tablet) dua kali sehari
Kanak-kanak dengan otitis media (keradangan telinga tengah) atau jangkitan yang lebih teruk	250 mg (1 x 250 mg tablet or 2 x 125 mg tablet) dua kali sehari

Sekiranya anda mempunyai masalah buah pinggang doktor mungkin mengurangkan kekerapan anda.

Tiada pengalaman menggunakan Axcel Cefuroxime Tablet pada kanak-kanak di bawah usia 3 bulan.

– Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan waktu yang sesuai untuk anda mengambil Axcel Cefuroxime-500mg Tablet, mengikut jenis keadaan yang anda hadapi.

– Berapa lama perlu digunakan

Terapi perjalanan biasa adalah 7 hari (lingkungan 5 ke 10 hari). Teruskan penggunaan Axcel Cefuroxime-500mg Tablet untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

– Jika terlupa menggunakan

- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.
- Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

– Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Anda dinasihatkan supaya menghubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda mengambil Axcel Cefuroxime-500mg Tablet secara berlebihan.

Pengambilan tablet yang terlalu banyak boleh menyebabkan sawan.

Semasa menggunakan Axcel Cefuroxime-500mg Tablet

– Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Axcel Cefuroxime-500mg Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda disahkan hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Beritahu doktor anda sekiranya anda perlu mengambil ubat lain secara tidak dijangka.
- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.
- Sekiranya anda mengalami cirit-birit yang teruk, segera beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

– Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berkongsi Axcel Cefuroxime-500mg Tablet dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom-simptom atau keadaan yang sama dengan anda.
- Jangan mengambil ubat anda lebih daripada kekerapan yang disarankan dalam sehari.
- Jangan mengambil ubat secara berlebihan dalam satu masa.

– Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hamil dan menyusukan bayi.
- Berhati-hati memandu atau mengoperasikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Axcel Cefuroxime-500mg Tablet mempengaruhi anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Axcel Cefuroxime-500mg Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan biasa berikut telah dilaporkan:

- **Jangkitan dan infestasi:** pertumbuhan candida yang terlalu banyak.
- **Gangguan sistem darah dan limfa:** Pertambahan eosinofil dalam darah, positif ujian Coombs, kekurangan platelet, kekurangan sel-sel darah putih dan kekurangan sel darah merah.
- Gangguan sistem imunisasi: Ruam kulit, urtikaria (ruam gatal yang timbul pada kulit), pruritus (gatal-gatal yang teruk pada kulit), demam ubat (demam selepas pengambilan ubat), penyakit serum (reaksi alergi) dan anafilaksis (reaksi alahan akut).
- Gangguan sistem saraf: Sakit kepala, pening.
- Gangguan gastrousus: Cirit-birit, loya, sakit perut, muntah, dan kolitis pseudomembranous (keradangan kolon)
- Gangguan hepatobiliari: Peningkatan sementara tahap enzim hepatic, penyakit kuning dan hepatitis (radang hati)
- Gangguan kulit dan tisu subkutaneus: *Erythema multiforme*, *Stevens-Johnson syndrome*, *toxic epidermal necrolysis* (ruam kulit dan tindak balas akibat hipersensitiviti)

Axcel Cefuroxime-500mg Tablet boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius. Berhenti menggunakan Axcel Cefuroxime-500mg Tablet dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera sekiranya anda mengalami mana-mana simptom berikut:

- kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau iritasi mata.

AXCEL CEFUROXIME-500MG TABLET

Cefuroxime Axetil equivalent to Cefuroxime 500mg

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.moh.gov.my (*Public→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines(AEFI)*).

Tarikh kemaskini RiMUP

14/10/2022

Nombor Siri

NPRA(R2)19/185

Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Cefuroxime-500mg Tablet

– Penyimpanan

Jauhkan Axcel Cefuroxime-500mg Tablet dari jangkauan kanak-kanak. Simpan pada suhu bawah 30°C. Lindungi dari cahaya dan kelembapan.

– Pelupusan

Jangan guna Axcel Cefuroxime-500mg Tablet yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

– Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih ke putih kekuningan, dwicembung, berbentuk kapsul, dengan garisan pada satu permukaan dan B032 pada satu permukaan lagi.

– Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:

Cefuroxime Axetil

Bahan Tidak Aktif:

Croscarmellose Sodium, Sodium Lauryl Sulphate, Magnesium Stearate, Opadry II White YS-1-7040, Purified Water.

– Nombor MAL

MAL21036034AZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

KOTRA PHARMA (M) SDN BHD
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.