

AXCEL CEFUROXIME-125 FOR ORAL SUSPENSION

Cefuroxime (125mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension.
2. Bagaimana Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension.
4. Cara menggunakan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension.
5. Semasa menggunakan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension.
6. Kesan- kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension

Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension digunakan untuk merawat:

- Jangkitan saluran pernafasan atas (sebagai contoh: jangkitan telinga, hidung dan kerongkong, seperti keradangan bahagian tengah telinga, resdung, keradangan tonsil dan sakit tekak).
- Jangkitan saluran pernafasan bawah (sebagai contoh: jangkitan paru-paru, radang tiub bronkial dan penyakit paru-paru obstruktif semakin teruk secara mendadak).
- Jangkitan saluran 'genito-urinary' (sebagai contoh: jangkitan buah pinggang, keradangan pundi kencing dan keradangan uretra).
- *Gonorrhoea, acute uncomplicated gonococcal urethritis* dan keradangan serviks uterus.
- Jangkitan kulit dan tisu lembut (sebagai contoh: bisul berlaku secara serentak pada kulit, jangkitan kulit dengan pembentukan nanah dan impetigo – jangkitan kulit bakteria berjangkit membentuk pustul dan luka yang kuning dan berkerak).

Bagaimana Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension berfungsi

Cefuroxime merupakan ejen anti-bakteria efektif yang mempunyai aktiviti bakterisidal untuk membunuh bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan. *Cefuroxime* mengganggu proses pembentukan dan pembaikan dinding sel bakteria dengan menjejaskan bon yang memegang dinding sel bakteria bersama-sama. Ini menyebabkan lubang muncul dalam dinding sel dan membunuh bakteria, kerana dinding sel adalah penting bagi kelangsungan hidup bakteria.

Sebelum menggunakan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension jika:

- Anda alergi atau hipersensitif pada antibiotik cephalosporin.

- Sebelum mula mengambil

Memaklumkan kepada doktor anda jika

- Anda pernah mengalami reaksi alergi pada penicillin atau beta-lactam yang lain.
- Anda hamil atau menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat- ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain kerana ia mungkin berinteraksi dengan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension.

Cara menggunakan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension

- Berapa banyak harus digunakan

- Ikut saranan dan nasihat dari doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan bila anda perlu mengambil Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension, mengikut keadaan anda.

- Berapa lama perlu digunakan

- Ikut saranan dan nasihat dari doktor atau ahli farmasi tentang berapa lama anda perlu mengambil ubat anda.

- Jika terlupa menggunakan

- Jangan menggandakan sukatan kerana Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension mungkin akan memberikan kesan sampingan yang merbahaya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Anda perlu menghubungi doktor anda dengan segera jika anda mengambil Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension berlebihan.

Semasa menggunakan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

- Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang patut dan tidak patut anda lakukan semasa mengambil ubat ini.
- Maklumkan kepada doktor anda jika tanpa diduga anda perlu mengambil ubatan lain.
- Ambil Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension mengikut dos yang disarankan.
- Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension lebih daripada kekerapan yang dicadangkan dalam satu hari.
- Jangan melebihi dos pada setiap satu masa pengambilan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hindari penggunaan berterusan dengan dos tinggi.
- Disebabkan ubat ini boleh menyebabkan pening, jangan memandu atau mengendalikan mesin jika rasa mengantuk.

Kesan- kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ ahli farmasi untuk maklumat

AXCEL CEFUROXIME-125 FOR ORAL SUSPENSION

Cefuroxime (125mg/5ml)

lanjut. Kesan-kesan sampingan yang berlaku berikut telah dilaporkan:

- *Erythema multiforme* (kemerahan dan keradangan yang tidak normal terhadap kulit)
- Sindrom *Steven-Johnson* (*erythema multiforme* yang lebih serius dan kadang-kadang membawa maut)
- *Toxic epidermal necrolysis* (keadaan kulit yang jarang berlaku dan boleh mengancam nyawa, disebabkan oleh reaksi terhadap ubat-ubatan, di mana lapisan atas kulit tertanggal daripada lapisan bawah kulit di seluruh badan)
- Reaksi hipersensitiviti termasuk ruam kulit (keradangan), urtikaria (sejenis ruam kulit dengan bintik-bintik merah dan gatal), *pruritus* (gatal-gatal), *drug fever*, *serum sickness* (tindak balas alahan yang tertangguh selepas terdedah kepada antibiotik atau antiserum) dan anafilaksis (reaksi alahan yang serius dan berpotensi mengancam nyawa).
- Gangguan gastrousus termasuk cirit-birit, rasa loya dan muntah-muntah
- *Pseudomembranous colitis* (Keradangan usus besar)
- Sakit kepala
- Bilangan eosinofil (sejenis sel darah putih) yang tinggi secara tidak normal dalam darah
- Peningkatan tahap enzim buah pinggang secara sementara
- Trombositopenia (penurunan platelet dalam darah)
- Leukopeni (penurunan bilangan sel-sel darah putih)
- Anemia hemolitik (penurunan bilangan sel-sel darah merah akibat penguraian yang tidak normal terhadap sel-sel darah merah)

Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius.

Berhenti menggunakan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera sekiranya anda

mengalami mana-mana simptom berikut:

- Kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau iritasi mata.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda menyedari sesuatu yang membuat anda berasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web laman web np.ra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting Side Effects to Medicines* (*ConSERF*) or *Vaccines* (*AEFI*)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension

- Penyimpanan

Jauhkan Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension dari jangkauan kanak-kanak.

Simpan di bawah 30°C.

Pastikan bekas ubat tertutup rapat dan lindungi daripada cahaya.

Selepas dilarutkan, menyejukkan diantara suhu 2-8°C dan guna dalam lingkungan 10 hari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Axcel Cefuroxime-125 For Oral Suspension ialah granul berwarna putih pucat hingga kuning pucat yang menghasilkan larutan seragam berwarna putih pucat hingga kuning pucat berperisa buah-buahan setelah dilarutkan.

- Bahan- bahan kandungan

- Bahan Aktif:
Cefuroxime Axetil

- Bahan Tidak Aktif:
Refined Sugar, Aerosil 200, Crospovidone, Lemon Flavour dan Aromatic Flavour

- Nombor MAL

MAL14095051AZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Kotra Pharma (M) SDN BHD
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
03/10/2019

Nombor siri
NPRA(R2/1)190516/148