

AXCEL PHENTERMINE-30MG TABLETS

Phentermine (30mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Axcel Phentermine-30mg Tablets.
2. Bagaimana Axcel Phentermine-30mg Tablets berfungsi.
3. Sebelum mengambil Axcel Phentermine-30mg Tablets.
4. Cara menggunakan Axcel Phentermine-30mg Tablets.
5. Semasa menggunakan Axcel Phentermine-30mg Tablets.
6. Kesan- kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Axcel Phentermine-30mg Tablets.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini.

Apakah kegunaan Axcel Phentermine-30mg Tablets

Axcel Phentermine-30mg Tablets digunakan sebagai terapi tambahan kepada diet untuk mereka yang menghidap obesiti dan mempunyai indeks jisim badan (BMI) ≥ 30 , yang tidak tidak mendapat respons yang memberangsangkan kepada rawatan pengurangan berat badan sahaja.

Bagaimana Axcel Phentermine-30mg Tablets berfungsi

Phentermine Hydrochloride digunakan untuk menyekat selera makan untuk mengurangkan berat badan pada pesakit yang mengalami obesiti.

Sebelum mengambil Axcel Phentermine-30mg Tablets

- Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda mempunyai hipersensitiviti untuk amina sympathomimetic
- Jika anda sedang atau pernah mengalami penyakit kardiovaskular
- Jika anda mempunyai hyperthyroidism

- Jika anda sedang atau pernah mengambil perencat monoamine oxidase (MAOI) dalam tempoh 14 hari.
- Jika anda mempunyai glaukoma (penyakit mata yang menyebabkan kerosakan pada saraf optik dan kehilangan penglihatan)
- Jika anda dalam keadaan gelisah.
- Jika anda berusia di bawah 16 tahun atau warga tua.
- Jika anda mempunyai sejarah penyalahgunaan dadah.
- Jika anda mengandung atau menyusukan bayi.

- Sebelum mula mengambil

Maklumkan kepada doktor anda jika:

- Anda mengambil ubat-ubatan lain.
- Anda sedang mengandung atau menyusukan bayi.
- Anda mempunyai tekanan darah tinggi atau kencing manis.
- Anda mempunyai penyakit buah pinggang.

- Jika mengambil ubat- ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan. Axcel Phentermine-30mg Tablets berinteraksi dengan ubat-ubatan ini apabila diambil bersama-sama:

- Monoamine Oxidase Inhibitors
- Alkohol
- Insulin dan Oral Hypoglycemic Medications
- Adrenergic Neuron Blocking Drugs

Doktor atau ahli farmasi anda mungkin mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan yang perlu diberikan perhatian atau

dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Axcel Phentermine-30mg Tablets

- Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan oral sahaja.

Dos perlu diambil secara individu bagi mendapatkan tindak balas yang mencukupi dengan pengambilan dos terendah. Dos dewasa biasa adalah satu tablet setiap hari, yang diambil sebelum sarapan pagi atau 1-2 jam selepas sarapan pagi.

- Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan apabila masanya sesuai untuk anda mengambil Axcel Phentermine-30mg Tablets, mengikut jenis keadaan yang anda alami.

- Berapa lama perlu digunakan

- Ambil ubat ini seperti yang dicatatkan di dalam risalah ini tanpa melebihi sukatan.
- Ikut saranan dan nasihat dari doktor atau ahli farmasi tentang berapa lama anda perlu mengambil ubat anda.

- Jika terlupa menggunakan

- Jangan menggandakan sukatan kerana Axcel Phentermine-30mg Tablets mungkin akan memberikan kesan sampingan yang merbahaya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Anda perlu hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengambil Axcel Phentermine-30mg Tablets berlebihan.

Semasa menggunakan Axcel Phentermine-30mg Tablets

- Perkara yang perlu dilakukan

- Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda tentang

AXCEL PHENTERMINE-30MG TABLETS

Phentermine (30mg)

- perkara yang mesti dan tidak patut anda lakukan semasa mengambil ubat ini.
- Maklumkan doktor anda jika tanpa diduga anda perlu mengambil ubatan lain.
- Ambil Axcel Phentermine-30mg Tablets mengikut dos yang disarankan.
- Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil Axcel Phentermine-30mg Tablets lebih daripada frekuensi yang dicadangkan dalam satu hari.
- Jangan melebihi dos tablet pada setiap satu masa pengambilan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hindari penggunaan berterusan dengan dos tinggi.
- Berhati-hati semasa mengendalikan jentera atau memandu selepas mengambil ubat.
- Elakkan penggunaan seiring dengan alkohol.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Axcel Phentermine-30mg Tablets boleh memberikan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mendapatnya. Anda dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- Tekanan darah tinggi
- Kebocoran injap jantung (keadaan di mana jantung tidak dapat mengepam darah yang mencukupi untuk memenuhi keperluan badan)

- Debaran jantung (denyutan jantung yang cepat dan tidak teratur)
- *Tachycardia* (kadar jantung yang luar biasa cepat)
- *Ischemic events* (sekatan bekalan darah ke tisu badan)
- *Overstimulation*
- Kegelisahan (rasa tidak selesa)
- Pening
- Insomnia (Gangguan tidur)
- Euforia (rasa kegembiraan yang kuat)
- Dysphoria (ketidakselesaan atau kesusahan)
- Tremor (pergerakan otot yang tidak sengaja dan berirama)
- Sakit kepala
- Psikosis (gangguan mental)
- Kekeringan mulut
- Nafas berbau
- Cirit-birit
- Sembelit
- Gangguan gastrousus yang lain
- Urtikaria (ruam-ruam)
- Disfungsi erektel
- Perubahan dalam keinginan seks

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Axcel Phentermine-30mg Tablets

- Penyimpanan

Jauhkan Axcel Phentermine-30mg Tablets dari jangkauan kanak-kanak. Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan

atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Axcel Phentermine-30mg Tablets berwarna biru, *biconvex*, berbentuk bujur, bercetak kotra logo pada satu bahagian dan *score line* pada sebelah bahagian.

- Bahan- bahan kandungan

-Bahan Aktif:

Phentermine Hydrochloride

-Bahan Tidak Aktif:

Microcrystalline Cellulose, Lactose Monohydrate, Corn Starch, FD&C Blue, Colloidal Silicon Dioxide dan Magnesium Stearate.

- Nombor MAL

MAL16105033AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

KOTRA PHARMA (M) SDN BHD

No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12, Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini

27/07/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230619/1086